第2報

〈 新型コロナワクチン接種 〉

オミクロン株に対応した 2価ワクチンの接種が開始されました。



2022年10月〇日



【第2報】

ワクチンの種類が増えました。
BA.1かBA4-5の
いずれか早く打てるワクチンで
1回接種をしましょう。





接種の対象と使用するワクチン



- 新型コロナの従来株とオミクロン株に対応したワクチン(「オミクロン株対応2価ワクチン」)の接種は、<mark>初回接種</mark> (1・2回目接種)を完了した12歳以上の全ての方が対象で、一人1回接種できます。
- 1・2回目接種を完了した12歳以上で最終接種から5か月(※)以上経過している方は接種可能です。 (※)2022年10月7日時点。接種間隔の短縮等について検討し、10月下旬までに結論を得る予定です。
- 詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。

〈オミクロン株対応2価ワクチンの種類〉	1・2回目接種対象者	3回目以降の接種対象者		
ファイザー社ワクチン			12歳以上	18歳以上
【BA.1対応型/BA.4-5対応型】	★(使用不可)	12歳以上 	0	0
モデルナ社ワクチン 【BA.1対応型】	★ (使用不可)	18歳以上	×	0

(※)2022年10月時点では、オミクロン株対応2価ワクチンは、11歳以下は接種対象となりません。

# BA.1


## オミクロン株対応2価ワクチンの種類と特徴



2種類の2価ワクチン(BA.1対応型/BA.4-5対応型)が使用可能ですが、いずれも従来型ワクチン(※)を上回る効果が期待されます。(※)新型コロナの従来株に対応した1価ワクチン

- 2価ワクチンは、従来株の成分に加え、オミクロン株の成分が含まれています。オミクロン株の成分に2つの種類 (BA.1とBA.4-5)があるため、2種類のワクチンがあります。その効果は以下の通りです。
  - BA.1、BA.4-5 は、いずれもオミクロン株の種類(亜系統)です(右図参照)。そのため、BA.1 対応型であっても、BA.4-5 対応型であっても、現在流行の中心であるオミクロン株に対しては、1価の従来型ワクチンを上回る効果が期待されています。
  - ○また、BA.1 対応型であっても、BA.4-5 対応型であっても、 従来株とオミクロン株の2種類の成分があることにより、 誘導される免疫も、より多様な新型コロナウイルスに反応 すると考えられます。

〈新型コロナウイルスの変異株の枝分かれ(系統樹)〉



(※)出典をもとに改変


出典:Wang, Q., Guo, Y., Iketani, S. et al. Antibody evasion by SARS-CoV-2 Omicron subvariants BA.2.12.1. BA.4 and BA.5. Nature 608. 603-608 (2022).

### 以下、「オミクロン株に対応した2価ワクチンの接種が開始されます【第1報】」の再掲です。

【第1報】はこちらから→



これまで2年間、年末年始に新型コロナは流行しています。2022年の年末までに、重症化リスクの高い 高齢者等はもとより、若い方にもオミクロン株対応2価ワクチンによる接種を完了するようおすすめします。



出典:厚生労働省ホームページ 「国内の発生状況 | をもとに作成



## オミクロン株対応2価ワクチンの 効果

### ■従来型ワクチンを上回るオミクロン株への効果が期待されています。

オミクロン株対応2価ワクチンの追加接種には、オミクロン株の成分が含まれるため、従来型ワクチンと比較した場合、オミクロン株に対する重症化予防効果、感染予防効果、発症予防効果それぞれに寄与する免疫をより強く誘導します。


そのため、オミクロン株に対して、従来型ワクチンを上回る**重症化予防効果**とともに、持続期間が短い可能性があるものの、 **感染予防効果**や発症予防効果も期待されています。

## ■2価のワクチンであることにより、様々な新型コロナウイルスに反応します。

異なる2種類の抗原があることにより、誘導される免疫も、より多様な新型コロナウイルスに反応すると考えられます。

そのため、今後の変異株に対して有効である可能性がより高いことが期待されています。

(※4)2022年8月現在の科学的知見を踏まえた専門家の議論をもとに記載しています。今後、知見の蓄積等によりアップデートされる可能性があります。



# オミクロン株対応2価ワクチンの 安全性

ファイザー社及びモデルナ 社の2価ワクチンの薬事承認 において、どちらのワクチンも 従来型ワクチンとおおむね同 様の症状が見られました。 〈接種後7日間に現れた症状〉

出典:特例承認に係る報告書より改編

SK TE OIL	ない ないしゅう ないしゅん ないしゅん こうしゅん ないしゅん はんしゅん はんしゅん はんしゅん しゅうしゅん しゅうしゅん しゅうしゅん しゅうしゅん しゅうしゅう しゅう			
発現割合	ファイザー社	モデルナ社		
50%以上	注射部位疼痛	注射部位疼痛、疲労		
10~50%	疲労、筋肉痛、頭痛、悪寒、関節痛	頭痛、筋肉痛、関節痛、リンパ節症、悪寒、悪心・嘔吐		
1~10%	下痢、発赤、腫脹、発熱、嘔吐	紅斑・発赤、腫脹・硬結、発熱		

#### ◎ワクチンを受けるにはご本人の同意が必要です。

ワクチンを受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持っていただいた上で、ご本人の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いします。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。

職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に対して差別的な対応をすることはあってはなりません。

#### ○予防接種健康被害救済制度があります。

予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、 救済制度が設けられています。申請に必要となる手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

新型コロナワクチンの有効性・安全性などの詳しい情報については、厚生労働省ホームページの「新型コロナワクチンについて」のページをご覧ください。

厚労 コロナ ワクチン

検 索



ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。