

患者さまが受けられた医療に関するご遺族の方への調査 2019-2020年調査 結果概要

国立がん研究センター がん対策研究所
がん医療支援部

背景

第3期がん対策推進基本計画


3. 尊厳をもって安心して暮らせる社会の構築

(1) がんと診断された時からの緩和ケアの推進 取り組むべき施策

国は、**実地調査や遺族調査等を定期的かつ継続的に実施し、評価結果に基づき、緩和ケアの質の向上策の立案に努める**

背景

- 人生の最終段階で利用した医療の質の評価
患者の直接評価は病状の悪化等により困難
遺族の代理評価が用いられる
- 患者の療養プロセスに合わせた調査方法



目的

- 国のがん対策 緩和ケアの評価
(厚生労働省委託事業)
 - 人生の最終段階で患者が受けた医療の質や療養生活の質の実態把握
- ▼
- 全国の死亡患者を代表する対象者を選定するため、
人口動態調査 死亡票情報を利用した質問紙調査

調査の概要

がん患者の実態把握のため、2019と2020の回答を統合して集計

実施時期	2019年1-3月	2020年3-5月
実施方法	郵送による質問紙調査	
対象者数	25,000	85,000
抽出方法	人口動態調査 死亡票情報 2017年死亡 死因 がん 年齢 20歳以上 層化（グループ別）無作為抽出 都道府県＞ 死亡場所 病院・施設・自宅	人口動態調査 死亡票情報 2018年死亡 死因 がん 年齢 20歳以上 層化（グループ別）無作為抽出 都道府県＞ 死亡場所 病院・自宅*

*2020年は病院・自宅死亡の実態把握に重点を置くため、施設死亡を除外

調査項目

医療の質	死亡場所で受けた医療の構造プロセス・満足度
療養生活の質	死亡前1カ月間の療養生活の質
死亡前の苦痛症状	死亡前1週間の症状の有無 痛みがあった場合は、その理由
患者の希望など話し合い	療養場所や蘇生処置の希望に関する 医師と患者の話し合い
家族の介護負担	家族の介護負担感
遺族の抑うつ症状	最近2週間の遺族の抑うつ症状
遺族の強い悲嘆	最近1カ月間の遺族の強い悲嘆

質問票

・原則は主介護者であった成人の遺族に回答依頼

患者さまが受けられた医療に関するご遺族の方への調査 皆様のご意見を伺い、わが国の医療の改善に役立てます ご回答をお願い申し上げます	以降は、封筒の宛名に記載された患者さまについてお伺いします																																		
<p>ご記入に関するお願い</p> <ul style="list-style-type: none">アンケートは、「がん」「心疾患」「脳血管疾患」「肺炎」「腎不全」のいずれかのご病気でお亡くなりなされた患者さま（封筒に記載された宛名）のご遺族の方を対象としていますアンケートへの回答は、患者さまを主に介護されていた成人の方 にお願いたします選択式の質問は、最もあてはまると思われる番号に○をお付けください回答しにくい、回答がづらいと感じられた質問は、無理に回答せず、次の質問にお進みくださいアンケートおよび返信用封筒に住所・氏名のご記入や切手は不要です <p>設問における用語の説明</p> <ul style="list-style-type: none">このアンケートで用いる「医療者」とは、医師・看護師・介護施設のスタッフなど、お亡くなりになられた患者さまの医療やケアを主に担当した者となります	<p>問2. お亡くなりになった年齢（おおよそで結構です）</p> <p>() 歳</p> <p>問3. 患者さまがお亡くなりになるとき、同居していた方はいましたか</p> <p>1. あり 2. なし</p> <p>問4. お亡くなりになる原因となった病気を診断されてから、実際にお亡くなりになるまでの期間は、おおよそどのくらいでしたか（○は1つ）</p> <table border="1"><tr><td>1. 24時間以内</td><td>2. 1週間以内</td><td>3. 1カ月以内</td></tr><tr><td>4. 3カ月以内</td><td>5. 1年以内</td><td>6. 5年以内</td></tr><tr><td>7. 10年以内</td><td>8. 10年より長い</td><td>9. わからない</td></tr></table> <p>問5. 患者さまがお亡くなりになるおおよそ 1カ月前の生活の様子について、もっとも近い番号に○を付けてください（○は1つ）</p> <table border="1"><tr><td>1. 生活は自立していた</td><td>2. 一部介助が必要だった</td><td>3. ほぼ全般的に介助が必要だった</td><td>4. わからない</td></tr></table> <p>問6. 患者さまがお亡くなりになる 1カ月前頃の、意思の伝達能力について、もっとも近い番号に○を付けてください（会話・筆談・手話など伝達手段は問いません）（○は1つ）</p> <table border="1"><tr><td>1. 問題なく意思を他者に伝えられた</td><td>2. 多少の困難はあったが、意思を他者に伝えられた</td><td>3. ほとんど意思を他者に伝えられなかった</td><td>4. 全く意思を他者に伝えられなかった</td><td>5. わからない</td></tr></table> <p>問7. 患者さまは認知症[※]と医師から言われていましたか（○は1つ） ※認知症とは、脳や身体の疾患が原因で、記憶・判断力などの障害が起り、日常生活に支障をきたした状態のことです</p> <table border="1"><tr><td>1. はい</td><td>2. いいえ</td><td>3. わからない</td></tr></table> <p>問8. 患者様はお亡くなりになる 3カ月前頃、認知症のために、自分で適切な服を選べないことや[※]、着替えや入浴を嫌がることはありましたか（○は1つ） ※適切な服を選べないとは、例えば、季節や気温に合わせた服を選べない、など</p> <table border="1"><tr><td>1. はい</td><td>2. いいえ</td><td>3. わからない</td></tr></table> <p>問9. 患者様がお亡くなりになる 3カ月前頃、食事の量はおおよそどの程度でしたか（○は1つ）</p> <table border="1"><tr><td>1. いつも通りだった</td><td>2. 少し減少していた（数口より多い）</td><td>3. 減少していた（数口程度）</td><td>4. 食べられなかった</td><td>5. わからない</td></tr></table> <p>問10. 患者さまがお亡くなりになる 3カ月前の時点で、定期的に透析を受けていましたか（○は1つ）</p> <table border="1"><tr><td>1. 受けていない</td><td>2. 血液透析を受けていた</td><td>3. 腹膜透析を受けていた</td><td>4. 血液透析と腹膜透析を併用で受けていた</td><td>5. わからない</td></tr></table>	1. 24時間以内	2. 1週間以内	3. 1カ月以内	4. 3カ月以内	5. 1年以内	6. 5年以内	7. 10年以内	8. 10年より長い	9. わからない	1. 生活は自立していた	2. 一部介助が必要だった	3. ほぼ全般的に介助が必要だった	4. わからない	1. 問題なく意思を他者に伝えられた	2. 多少の困難はあったが、意思を他者に伝えられた	3. ほとんど意思を他者に伝えられなかった	4. 全く意思を他者に伝えられなかった	5. わからない	1. はい	2. いいえ	3. わからない	1. はい	2. いいえ	3. わからない	1. いつも通りだった	2. 少し減少していた（数口より多い）	3. 減少していた（数口程度）	4. 食べられなかった	5. わからない	1. 受けていない	2. 血液透析を受けていた	3. 腹膜透析を受けていた	4. 血液透析と腹膜透析を併用で受けていた	5. わからない
1. 24時間以内	2. 1週間以内	3. 1カ月以内																																	
4. 3カ月以内	5. 1年以内	6. 5年以内																																	
7. 10年以内	8. 10年より長い	9. わからない																																	
1. 生活は自立していた	2. 一部介助が必要だった	3. ほぼ全般的に介助が必要だった	4. わからない																																
1. 問題なく意思を他者に伝えられた	2. 多少の困難はあったが、意思を他者に伝えられた	3. ほとんど意思を他者に伝えられなかった	4. 全く意思を他者に伝えられなかった	5. わからない																															
1. はい	2. いいえ	3. わからない																																	
1. はい	2. いいえ	3. わからない																																	
1. いつも通りだった	2. 少し減少していた（数口より多い）	3. 減少していた（数口程度）	4. 食べられなかった	5. わからない																															
1. 受けていない	2. 血液透析を受けていた	3. 腹膜透析を受けていた	4. 血液透析と腹膜透析を併用で受けていた	5. わからない																															
<p>まず、アンケートへのご協力についてお伺いします</p>																																			
<p>問1. アンケートへのご協力についてご回答ください（○は1つ）</p> <table border="1"><tr><td>1. 協力します ⇒ 次ページにお進みください</td></tr><tr><td>2. 協力しません（ご回答されない場合でも、アンケートをご返送下さい）</td></tr></table> <p>その主な理由に○を付けてください（複数回答可）</p> <table border="1"><tr><td>1. 患者さまがお亡くなりになった当時のことを思い出すのがつらい</td></tr><tr><td>2. 患者さまが診療を受けていた期間が短いので、回答できない</td></tr><tr><td>3. 患者さまがお亡くなりになった場所（病院や自宅など）で受けた医療・ケアに対して不満がある ⇒ 医療の改善すべき点を明らかにするためのアンケートですので、よろしければご回答いただき、ご意見を聞かせください</td></tr><tr><td>4. 患者さまがお亡くなりになった当時のことをよく知らない</td></tr><tr><td>5. 体調が悪くて回答できない</td></tr><tr><td>6. アンケートに慣れていない</td></tr><tr><td>7. その他 ()</td></tr></table>	1. 協力します ⇒ 次ページにお進みください	2. 協力しません（ご回答されない場合でも、アンケートをご返送下さい）	1. 患者さまがお亡くなりになった当時のことを思い出すのがつらい	2. 患者さまが診療を受けていた期間が短いので、回答できない	3. 患者さまがお亡くなりになった場所（病院や自宅など）で受けた医療・ケアに対して不満がある ⇒ 医療の改善すべき点を明らかにするためのアンケートですので、よろしければご回答いただき、ご意見を聞かせください	4. 患者さまがお亡くなりになった当時のことをよく知らない	5. 体調が悪くて回答できない	6. アンケートに慣れていない	7. その他 ()																										
1. 協力します ⇒ 次ページにお進みください																																			
2. 協力しません（ご回答されない場合でも、アンケートをご返送下さい）																																			
1. 患者さまがお亡くなりになった当時のことを思い出すのがつらい																																			
2. 患者さまが診療を受けていた期間が短いので、回答できない																																			
3. 患者さまがお亡くなりになった場所（病院や自宅など）で受けた医療・ケアに対して不満がある ⇒ 医療の改善すべき点を明らかにするためのアンケートですので、よろしければご回答いただき、ご意見を聞かせください																																			
4. 患者さまがお亡くなりになった当時のことをよく知らない																																			
5. 体調が悪くて回答できない																																			
6. アンケートに慣れていない																																			
7. その他 ()																																			

集計方法

主解析	全体値	補正值 母集団の都道府県×死亡場所別 死亡数比率で重み付け
副次解析	死亡場所 別	補正值 母集団の都道府県別の死亡数比 率で重み付け
	一般病院 がん診療連携拠点病院 別	粗集計値 回答そのまま
	都道府県別	補正值 母集団の死亡場所別の死亡数比 率で重み付け

全体・死亡場所別 結果

結果 留意点

- 本結果は、人生の最終段階の療養生活をどのように過ごしたか、がん患者の全体像の把握を主目的とし、全体値を重視して解釈する
- 最期の療養場所として、どこで死亡することが良い・悪いと単純に判断することは困難である
- 死亡場所別の違いを考察する際は、患者の病状や治療への希望などの背景に留意し、注意深く考察することが必要である
 - ▶ 施設や自宅で死亡したがん患者は、他の場所と比べて症状が比較的落ち着いているため、施設や自宅での療養が可能になる
 - ▶ 施設で死亡したがん患者は、他の場所と比べて高齢のため、日常生活動作の低下や認知症を併存していた割合が高かった

2019-2020合計 回答数

	全体	病院	施設	自宅
発送数				
No	110,990	70,782	6,950	33,258
調査票到達数*				
No	96,332	60,546	5,581	30,205
有効回答数				
No	54,167	32,656	2,824	18,687
%	56.2	53.9	50.6	61.9

*発送数から宛先不明による返送数を除いた数

回答者背景 %


			全体 N=54,167	病院 n=25,436	施設 n=2,824	自宅 n=18,687	PCU n=7,220
患者	年齢*	(平均値)	(78.0)	(77.8)	(87.3)	(77.9)	(75.3)
		20-50代	6.2	6.3	0.4	6.2	8.4
		60-70代	43.5	44.1	13.4	43.8	52.4
		80代以上	50.2	49.5	86.3	50.0	39.2
	日常生活動作	一部介助	34.2	33.6	22.1	36.4	35.7
		ほぼ全介助	44.2	39.2	74.2	47.2	42.5
	認知症	有	13.3	12.5	45.7	11.5	8.6
遺族	年齢	(平均値)	(65.0)	(64.8)	(65.0)	(65.5)	(64.3)
		50代以下	30.8	31.4	28.1	29.4	33.7
		60-70代	57.1	56.5	61.0	57.7	56.0
		80代以上	10.8	10.7	8.9	11.7	9.6
	続柄	配偶者	44.1	43.1	14.2	48.1	48.8
		子	39.7	40.0	61.7	37.3	36.4
		嫁・婿	8.1	8.1	12.6	8.1	6.5

*厚生労働省 人口動態調査死亡票情報を用いて再集計した

PCU: Palliative Care Unit ホスピス緩和ケア病棟

死亡場所で受けた医療の質

ややそう思う-非常にそう思う割合 補正值% (95%信頼区間)




全体

医療者への評価は概ね良好だった
がん対策：基本的な緩和ケアの普及啓発の結果が表れている

死亡前1カ月間の療養生活の質

ややそう思う-とてもそう思う 補正值% (95%信頼区間)



全体

医療者は、基本的な対応だけでは十分に症状を緩和することが難しい場合などに対応できるようにする必要がある

場所

病院の割合の低さは、患者の年齢が若年であるため、積極的治療を希望し、治療や処置による避けられない苦痛を感じていたことや、就労などの心理社会的な課題を負う など複合的な理由が潜在すると考えられる

死亡前1カ月間の療養生活の質 痛みが少なく過ごせた 回答分布 補正值%

	全体	病院	施設	自宅	PCU
1 全くそう思わない	7.5	8.1	3.1	6.5	6.5
2 そう思わない	11.6	12.4	7.2	10.3	10.3
3 あまりそう思わない	9.3	10.0	6.6	8.7	7.2
4 どちらとも言えない	11.4	11.6	11.6	11.2	10.5
痛みあり 合計	39.7	42.1	28.5	36.8	34.5
5 ややそう思う	17.1	16.2	16.9	18.1	20.0
6 そう思う	24.9	23.0	32.2	28.0	29.0
7 とてもそう思う	5.1	4.2	5.9	7.6	7.3
痛みなし 合計	47.2	43.4	55.0	53.8	56.2
欠損	4.5	5.0	3.7	3.8	3.1
わからない	8.6	9.5	12.8	5.7	6.2

死亡前1カ月間の療養生活の質 からだの苦痛が少なく過ごせた 回答分布 補正值%

	全体	病院	施設	自宅	PCU
1 全くそう思わない	8.3	9.0	3.1	7.3	7.1
2 そう思わない	14.0	15.1	8.3	12.2	12.1
3 あまりそう思わない	12.1	13.0	8.8	11.1	10.0
4 どちらとも言えない	12.5	12.7	11.6	12.9	11.6
苦痛あり 合計	46.9	49.8	31.8	43.5	40.8
5 ややそう思う	17.6	16.4	19.5	19.8	20.2
6 そう思う	20.3	18.1	29.6	23.1	25.5
7 とてもそう思う	3.6	2.9	4.6	4.9	5.0
苦痛なし 合計	41.5	37.5	53.8	47.8	50.8
欠損	4.5	5.0	3.5	3.9	3.2
わからない	7.1	7.7	11.0	4.8	5.2

死亡前1カ月間の療養生活の質 おだやかな気持ちで過ごせた 回答分布 補正值%


	全体	病院	施設	自宅	PCU
1 全くそう思わない	6.3	7.3	3.3	3.6	4.8
2 そう思わない	10.2	11.5	6.1	5.9	8.6
3 あまりそう思わない	10.2	11.6	6.4	6.0	8.5
4 どちらとも言えない	15.4	16.2	13.7	12.2	14.8
気持ちのつらさあり合計	42.1	46.6	29.4	27.7	36.7
5 ややそう思う	18.1	17.0	20.1	20.8	20.4
6 そう思う	21.4	18.6	31.0	30.4	24.4
7 とてもそう思う	5.7	3.8	6.5	12.8	8.0
穏やかに過ごせた合計	45.2	39.4	57.6	64.0	52.8
欠損	4.5	4.9	4.1	3.5	3.4
わからない	8.2	9.0	8.9	4.8	7.1

死亡前1カ月間の療養生活の質 望んだ場所で過ごせた 回答分布 補正值%

	全体	病院	施設	自宅	PCU
1 全くそう思わない	8.5	10.2	9.1	1.5	6.2
2 そう思わない	11.4	13.4	13.9	2.1	9.1
3 あまりそう思わない	6.9	7.8	9.5	1.7	6.6
4 どちらとも言えない	11.7	12.4	14.8	3.0	14.4
過ごせなかった 合計	38.4	43.8	47.4	8.2	36.3
5 ややそう思う	11.4	11.4	10.8	7.7	14.3
6 そう思う	23.6	21.5	18.5	35.1	25.5
7 とてもそう思う	12.8	8.3	4.9	44.0	10.6
過せた 合計	47.9	41.2	34.2	86.8	50.4
欠損	4.3	4.9	3.9	2.5	3.3
わからない	9.4	10.2	14.5	2.4	10.1

死亡前1週間の苦痛症状

ひどい-とてもひどい 補正值% (95%信頼区間)



全体

痛みの理由には、医療者は対処したが十分に緩和できなかった、認知機能の低下により痛みの評価が難しい、褥瘡や骨折・腰痛などの併存症 など複数の要因が考えられる

場所

施設の割合の低さは、患者が高齢のため、認知機能の低下を併存し、症状が非定型的だったことや、患者の症状が落ち着いているため、施設で療養できた可能性がある


死亡前1週間の「痛み」の主な理由

痛みの理由（複数選択可） n=15,270	%
苦痛に対処してくれたが不十分だった	28.4
診察回数や診察時間が不十分だった	9.7
苦痛を伝えたが対処してくれなかった	3.2
担当医が定まらず、その場での対処だった	3.1
話しにくい雰囲気があった	2.3
苦痛について質問されなかった	2.3
その他（自由記述）	37.5
わからない	13.8

主な自由記述内容 n=5,592	No
医療従事者の疼痛管理の問題	
医療者是对処したが、薬の効果が切れてしまった	1763
医療者の治療や対処が十分ではなかった	318
医療者に症状を伝えたが対処してもらえなかった	90
病気の進行に対する患者・家族のあきらめ	
病状が悪化していったため	530
痛みは仕方がないものだと思った	219
患者や家族の意思	
患者本人が痛みを我慢して医療者に伝えなかった	287
患者本人が薬を服用しようとしなかった	191
併存症や医療処置の痛み	
褥瘡や骨折、腰痛などの併存症による痛みがあった	128
認知機能の低下等による痛みの評価の問題	
意識がなく、痛みについて意思表示できない状況だった	124
患者本人が医療者に痛みの状況を正確に伝えられなかった	71
医療へのアクセスの問題	
自宅や施設で療養しており、診療がすぐに受けられなかった	52
医療従事者の対処により改善した痛み	
痛みはあったが、医療者の対処によって改善した	1468

療養場所の希望などの話し合い

そう思う-とてもそう思う 補正值% (95%信頼区間)



全体


患者と医師の間で話し合いがあった割合は35.7%であった
話し合いが十分にできていないことによる影響を調査し、対策を検討することが必要である

場所

病院の割合の低さは、治療や治癒に対する希望があり話し合いに至らなかった可能性がある
施設の場合、患者が高齢のため、認知症を併存していたなど、話し合いが難しかった可能性がある

家族の介護負担感，遺族の抑うつ症状

補正值%（95%信頼区間）



全体

介護負担は、患者の高齢化による認知機能の低下や、日常生活動作の低下により増加する可能性があるため、介護者を支援する体制の整備が必要である

場所

施設の介護負担の高さは、患者が高齢であるため、病気の進行が緩やかで療養期間が長期化した，日常生活動作や認知機能の低下，主介護者が子が多い など複合的な理由が考えられる

病院死亡：

一般病院・がん診療連携拠点病院別 結果

一般病院・がん診療連携拠点病院別 結果 留意点

- 一般病院は、がん診療連携拠点病院等の急性期病院での治療が終了した方や、症状が安定した方へ継続的な治療を提供する、後方連携の役割を担う
- 一般病院は、一般病床だけでなく療養病床を有する病院が含まれる
- 一般病院で死亡したがん患者は、がん診療連携拠点病院と比べて患者が高齢で、入院が長期間にわたっていた
- がん診療連携拠点病院で死亡したがん患者の回答遺族は、一般病院と比べて配偶者が多かった

回答者背景 回答割合%


			一般病院 n=17,058	拠点病院 n=8,378	
患者	年齢	(平均値)	79.9	73.4	
		20-50代	4.2	10.7	
		60-70代	38.0	56.7	
		80代以上	57.8	32.7	
	日常生活動作	一部介助	32.2	36.3	
		ほぼ全介助	45.2	26.8	
	認知症	有	16.1	4.9	
遺族	年齢	(平均値)	65.2	63.9	
		続柄	配偶者	38.0	53.5
			子	43.9	31.9
			嫁・婿	8.9	6.4

一般病院：がん診療連携拠点病院以外の病院

拠点病院：がん診療連携拠点病院

死亡場所で受けた医療の質

ややそう思う-非常にそう思う割合 補正值% (95%信頼区間)




病院

医療者への評価は、いずれも概ね良好だった

死亡前1カ月間の療養生活の質

やや思う-とても思う 補正值% (95%信頼区間)




病院

拠点病院の割合の低さは、一般病院より患者が若年であるため、積極的な治療を希望することが多く、治療や処置に伴う避けられない苦痛をより感じていたことが考えられる

死亡前1週間の苦痛症状

ひどい-とてもひどい 補正值% (95%信頼区間)




病院

拠点病院の割合の高さは、一般病院より患者の病状が重いため、他の療養場所に移ることが難しかったことが影響している可能性がある

療養場所の希望などの話し合い

そう思う-とてもそう思う 補正值% (95%信頼区間)




病院

患者と医師の間で話し合いがあったと回答した割合は、いずれも低かった

家族の介護負担感，遺族の抑うつ症状

補正值%（95%信頼区間）



病院

拠点病院の遺族で強い悲嘆の割合の高さは、一般病院より患者が若年であるため、遺族の続柄に配偶者が多いことが影響している可能性がある

調査結果のポイント

- 今回の調査では、がん患者の人生の最終段階における療養生活の全体像の把握、痛み等の苦痛に対する医療者の対応に関する検討、一般病院とがん診療連携拠点病院の療養生活の実態把握を行った

【全体像の把握】

- がん患者の人生の最終段階では、症状の重さや、日常生活動作・認知機能の低下の有無など、患者の状況によって、患者・家族が最期の療養場所を選択していたことが示唆された
- がん患者の遺族の82%は、医療者は患者の苦痛症状によく対応していたと感じていたことから、医療者への評価は概ね良好だった
- がん患者の遺族において、患者と主治医の間で最期の療養場所や医療について話し合いがあったと回答した割合は36%だった、今後、話し合いが十分にできていないことで生じる影響を明らかにし、具体的な対策を検討する必要がある

調査結果のポイント

【痛み等の苦痛への対応】

- がん患者の遺族において、患者が死亡前にからだの苦痛がなく過ごせたと感じていた割合は42%であることから、医療者は、基本的な対応だけでは十分に症状を緩和することが難しい複雑な場合などに、対応できるようにすることが必要である

【一般病院とがん診療連携拠点病院の療養生活の実態】

- 一般病院とがん診療連携拠点病院では、一般病院の患者がより高齢であり、入院が長期間にわたっていたがん患者の遺族において、患者が死亡前にからだの苦痛が少なく過ごせたと感じていた割合は、一般病院41% がん診療連携拠点病院34%であった
- がん診療連携拠点病院の患者は、より若年であることなど、入院患者の背景の違いが影響していることが示唆された

調査の展望

- 今後はさらにこの調査を発展させ、以下のような調査研究を行うことで、わが国の現状をさらに精密に把握し、具体的な政策の提言につなげることができると考える
 - 本調査結果の推移を把握するための定期的な継続調査
 - 患者と医療者の間での療養場所や医療に関する情報提供や意思決定支援の把握
 - 多死社会を踏まえた、がん以外の疾患も含めた遺族を対象とする調査
 - 認知機能低下等の高齢者特有の併存症をもつ高齢・超高齢者への望ましい医療提供体制の把握

調査に関する問い合わせ先

国立がん研究センター

先端医療センター 精神腫瘍学開発分野 小川

がん対策研究所 がん医療支援部（併任）

がん対策研究所 がん医療支援部 中澤

E-mail: mfs@ml.res.ncc.go.jp