

■ 調査概要

■ 調査結果


I. アンケート回答者

1. 接種1回目当日
2. 接種1回目1週目
3. 接種1回目2週目
4. 接種2回目当日
5. 接種2回目1週目
6. 接種2回目2週目
7. 接種3回目当日
8. 接種3回目1週目
9. 接種3回目2週目
10. 接種4回目当日
11. 接種4回目1週目
12. 接種4回目2週目
13. 接種5回目当日
14. 接種5回目1週目
15. 接種5回目2週目
16. 接種6回目当日
17. 接種6回目1週目
18. 接種6回目2週目
19. 接種7回目当日
20. 接種7回目1週目
21. 接種7回目2週目
22. 接種回数不明当日
23. 接種回数不明1週目
24. 接種回数不明2週目

II. 症状別


25-2.症状_性別（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=2 男性:1 女性:1 その他:0

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=0 男性:0 女性:0 その他:0

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=2 男性:2 女性:0 その他:0


接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=0 男性:0 女性:0 その他:0

25-3.症状_性別（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-4.症状_性別（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=15 男性:7 女性:8 その他:0


接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=14 男性:8 女性:6 その他:0


25-5.症状_性別（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=420 男性:243 女性:177 その他:0


接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=401 男性:231 女性:170 その他:0


25-6.症状_性別（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=128 男性:82 女性:45 その他:1


接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=131 男性:85 女性:45 その他:1


25-7.症状_性別（接種7回目）

接種7回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=219 男性:157 女性:62 その他:0


接種7回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=213 男性:154 女性:59 その他:0

25-8.症状_性別（接種回数不明）

接種回数不明1週間後（接種日～7日目まで）




接種回数不明2週間後（8日目～14日目まで）




25-9.症状_性別：乳幼児（6ヶ月~4歳）（接種1・2回目）


接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-10.症状_性別：乳幼児（6ヶ月~4歳）（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-11.症状_性別：乳幼児（6ヶ月~4歳）（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-12.症状_性別：小児（5~11歳）（接種1・2回目）


接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-13.症状_性別：小児（5~11歳）（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-14.症状_性別：小児（5~11歳）（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-15.症状_性別：小児（5~11歳）（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-16.症状_性別：小児（5~11歳）（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-17.症状_性別：小児（5~11歳）（接種7回目）

接種7回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種7回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-18.症状_性別：小児（5~11歳）（接種回数不明）

接種回数不明1週間後（接種日～7日目まで）




接種回数不明2週間後（8日目～14日目まで）




25-19.症状_性別：10代（12～19歳）（接種1・2回目）


接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-20.症状_性別：10代（12～19歳）（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-21.症状_性別：10代（12～19歳）（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-22.症状_性別：10代（12～19歳）（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=9 男性:5 女性:4 その他:0


接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=7 男性:5 女性:2 その他:0

25-23.症状_性別：10代（12～19歳）（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-24.症状_性別：10代（12～19歳）（接種7回目）

接種7回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種7回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-25.症状_性別：10代（12～19歳）（接種回数不明）

接種回数不明1週間後（接種日～7日目まで）




接種回数不明2週間後（8日目～14日目まで）




25-26.症状_性別：20代（接種1・2回目）


接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-27.症状_性別：20代（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-28.症状_性別：20代（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=2 男性:2 女性:0 その他:0


接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=1 男性:1 女性:0 その他:0


25-29.症状_性別：20代（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=23 男性:18 女性:5 その他:0


接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=21 男性:17 女性:4 その他:0

25-30.症状_性別：20代（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-31.症状_性別：20代（接種7回目）

接種7回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=4 男性:3 女性:1 その他:0


接種7回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=5 男性:4 女性:1 その他:0

25-32.症状_性別：20代（接種回数不明）

接種回数不明1週間後（接種日～7日目まで）




接種回数不明2週間後（8日目～14日目まで）




25-33.症状_性別：30代（接種1・2回目）


接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-34.症状_性別：30代（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=1 男性:1 女性:0 その他:0


接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=1 男性:1 女性:0 その他:0

25-35.症状_性別：30代（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-36.症状_性別：30代（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=61 男性:32 女性:29 その他:0


接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=60 男性:31 女性:29 その他:0


25-37.症状_性別：30代（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=7 男性:3 女性:3 その他:1


接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=8 男性:4 女性:3 その他:1


25-38.症状_性別：30代（接種7回目）

接種7回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=5 男性:0 女性:5 その他:0


接種7回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=4 男性:0 女性:4 その他:0

25-39.症状_性別：30代（接種回数不明）

接種回数不明1週間後（接種日～7日目まで）




接種回数不明2週間後（8日目～14日目まで）




25-40.症状_性別：40代（接種1・2回目）


接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-41.症状_性別：40代（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=1 男性:0 女性:1 その他:0


接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=1 男性:0 女性:1 その他:0


25-42.症状_性別：40代（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=4 男性:2 女性:2 その他:0


接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=5 男性:3 女性:2 その他:0


25-43.症状_性別：40代（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=113 男性:63 女性:50 その他:0


接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=112 男性:64 女性:48 その他:0


25-44.症状_性別：40代（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=13 男性:4 女性:9 その他:0


接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=14 男性:4 女性:10 その他:0


25-45.症状_性別：40代（接種7回目）

接種7回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=29 男性:17 女性:12 その他:0


接種7回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=30 男性:17 女性:13 その他:0

25-46.症状_性別：40代（接種回数不明）

接種回数不明1週間後（接種日～7日目まで）




接種回数不明2週間後（8日目～14日目まで）




25-47.症状_性別：50代（接種1・2回目）


接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-48.症状_性別：50代（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=1 男性:1 女性:0 その他:0


接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=1 男性:1 女性:0 その他:0


25-49.症状_性別：50代（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=2 男性:1 女性:1 その他:0


接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=2 男性:1 女性:1 その他:0


25-50.症状_性別：50代（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=188 男性:108 女性:80 その他:0


接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=174 男性:95 女性:79 その他:0


25-51.症状_性別：50代（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=30 男性:17 女性:13 その他:0


接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=31 男性:17 女性:14 その他:0


25-52.症状_性別：50代（接種7回目）

接種7回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=50 男性:30 女性:20 その他:0


接種7回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=55 男性:34 女性:21 その他:0

25-53.症状_性別：50代（接種回数不明）

接種回数不明1週間後（接種日～7日目まで）




接種回数不明2週間後（8日目～14日目まで）




25-54.症状_性別：60代（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=1 男性:1 女性:0 その他:0

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=0 男性:0 女性:0 その他:0

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=2 男性:2 女性:0 その他:0


接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=0 男性:0 女性:0 その他:0


25-55.症状_性別：60代（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=1 男性:1 女性:0 その他:0


接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=0 男性:0 女性:0 その他:0

25-56.症状_性別：60代（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-57.症状_性別：60代（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=25 男性:16 女性:9 その他:0


接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=27 男性:19 女性:8 その他:0


25-58.症状_性別：60代（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=73 男性:54 女性:19 その他:0


接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=72 男性:55 女性:17 その他:0


25-59.症状_性別：60代（接種7回目）

接種7回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=81 男性:63 女性:18 その他:0


接種7回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=80 男性:65 女性:15 その他:0

25-60.症状_性別：60代（接種回数不明）

接種回数不明1週間後（接種日～7日目まで）




接種回数不明2週間後（8日目～14日目まで）




25-61.症状_性別：70代（接種1・2回目）


接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-62.症状_性別：70代（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-63.症状_性別：70代（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-64.症状_性別：70代（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-65.症状_性別：70代（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=5 男性:4 女性:1 その他:0


接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=6 男性:5 女性:1 その他:0


25-66.症状_性別：70代（接種7回目）

接種7回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=46 男性:41 女性:5 その他:0


接種7回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=37 男性:32 女性:5 その他:0

25-67.症状_性別：70代（接種回数不明）

接種回数不明1週間後（接種日～7日目まで）




接種回数不明2週間後（8日目～14日目まで）




25-68.症状_性別：80代（接種1・2回目）


接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-69.症状_性別：80代（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-70.症状_性別：80代（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-71.症状_性別：80代（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-72.症状_性別：80代（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-73.症状_性別：80代（接種7回目）

接種7回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=4 男性:3 女性:1 その他:0


接種7回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=2 男性:2 女性:0 その他:0

25-74.症状_性別：80代（接種不明）

接種回数不明1週間後（接種日～7日目まで）




接種回数不明2週間後（8日目～14日目まで）




25-75.症状_メーカー別①（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=2 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):2 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=2 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):1 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):1 武田(ノババックス):0

接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

25-76.症状_メーカー別②（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5) ■ モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)
■ 武田(ノババックス)



全体:N=2 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):2 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5) ■ モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)
■ 武田(ノババックス)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5) ■ モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)
■ 武田(ノババックス)



全体:N=2 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):1 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):1 武田(ノババックス):0

接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5) ■ モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)
■ 武田(ノババックス)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0


25-77.症状_メーカー別①（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=5 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):3 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):2 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=4 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):2 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):2 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


25-78.症状_メーカー別②（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=5 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):3 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):2 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=4 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):2 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):2 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


25-79.症状_メーカー別①（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=15 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):10 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):4 武田(ノババックス):1 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=14 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):10 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):3 武田(ノババックス):1 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


25-80.症状_メーカー別②（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=15 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):10 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):4 武田(ノババックス):1 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=14 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):10 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):3 武田(ノババックス):1 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


25-81.症状_メーカー別①（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体: N=420 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5): 236 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5): 164 武田(ノババックス): 16 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5): 4


接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体: N=401 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5): 232 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5): 147 武田(ノババックス): 18 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5): 4


25-82.症状_メーカー別②（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=420 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):236 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):164 武田(ノババックス):16 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):4


接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=401 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):232 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):147 武田(ノババックス):18 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):4


25-83.症状_メーカー別①（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=128 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):62 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):63 武田(ノババックス):1 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):2


接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=131 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):66 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):62 武田(ノババックス):1 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):2


25-84.症状_メーカー別②（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=128 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):62 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):63 武田(ノババックス):1 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):2


接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=131 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):66 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):62 武田(ノババックス):1 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):2


25-85.症状_メーカー別①（接種7回目）

接種7回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=219 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):108 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):109 武田(ノババックス):1 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):1


接種7回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=213 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):108 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):103 武田(ノババックス):1 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):1


25-86.症状_メーカー別②（接種7回目）

接種7回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体: N=219 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):108 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):109 武田(ノババックス):1 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):1


接種7回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体: N=213 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):108 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):103 武田(ノババックス):1 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):1


25-87.症状_メーカー別①（接種回数不明）

接種回数不明1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


接種回数不明2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


25-88.症状_メーカー別②（接種回数不明）

接種回数不明1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0

接種回数不明2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0

25-89.症状_メーカーの組み合わせ別①（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）

前回	今回	接種人数	37.5℃以上の発熱	注射部位の腫れ	じんましん	けん怠感	頭痛
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	100%(1人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
アストラゼネカ	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
アストラゼネカ	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
アストラゼネカ	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	武田(ノババックス)	2	100%(2人)	50%(1人)	0%(0人)	100%(2人)	50%(1人)
その他	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA1)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA4-5)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
アストラゼネカ	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)

25-90.症状_メーカーの組み合わせ別②（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）

前回	今回	接種人数	リンパ節の腫れ	関節の痛み	おう吐	下痢	胸の痛み
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)
アストラゼネカ	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)
武田(ノババックス)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)
その他	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)
アストラゼネカ	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)
武田(ノババックス)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)
その他	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)
アストラゼネカ	武田(ノババックス)	0	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)
武田(ノババックス)	武田(ノババックス)	2	0% (0人)	50% (1人)	0% (0人)	50% (1人)	50% (1人)
その他	武田(ノババックス)	0	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)
ファイザー	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA1)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA4-5)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)
モデルナ	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)
アストラゼネカ	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)
武田(ノババックス)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)
その他	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)

25-91.症状_メーカーの組み合わせ別①（接種3回目）

接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）

前回	今回	接種人数	37.5℃以上の発熱	注射部位の腫れ	じんましん	けん怠感	頭痛
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
アストラゼネカ	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
アストラゼネカ	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
アストラゼネカ	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	武田(ノババックス)	2	0%(0人)	50%(1人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA1)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA4-5)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
アストラゼネカ	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)

25-92.症状_メーカーの組み合わせ別②（接種3回目）

接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）

前回	今回	接種人数	リンパ節の腫れ	関節の痛み	おう吐	下痢	胸の痛み
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
アストラゼネカ	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
アストラゼネカ	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
アストラゼネカ	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	武田(ノババックス)	2	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA1)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA4-5)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
アストラゼネカ	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)

25-93.症状_メーカーの組み合わせ別①（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）

前回	今回	接種人数	37.5℃以上の発熱	注射部位の腫れ	じんましん	けん怠感	頭痛
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	2	50%(1人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	50%(1人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	3	33.3%(1人)	66.7%(2人)	0%(0人)	0%(0人)	66.7%(2人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	100%(1人)	100%(1人)	0%(0人)	100%(1人)	100%(1人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	2	100%(2人)	50%(1人)	0%(0人)	100%(2人)	100%(2人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	武田(ノババックス)	1	0%(0人)	100%(1人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)

25-94.症状_メーカーの組み合わせ別②（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）

前回	今回	接種人数	リンパ節の腫れ	関節の痛み	おう吐	下痢	胸の痛み
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	2	0%(0人)	50%(1人)	0%(0人)	0%(0人)	50%(1人)
ファイザー社2価ワクチン(BA4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	3	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	100%(1人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	2	0%(0人)	50%(1人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA4-5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA4-5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	武田(ノババックス)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA1)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA4-5)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA1)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA4-5)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)

25-95.症状_メーカーの組み合わせ別①（接種4回目）

接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）

前回	今回	接種人数	37.5℃以上の発熱	注射部位の腫れ	じんましん	けん怠感	頭痛
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	2	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	3	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	100%(1人)
モデルナ社2価ワクチン(BA4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	100%(1人)	0%(0人)	0%(0人)	100%(1人)	100%(1人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	2	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	50%(1人)
モデルナ社2価ワクチン(BA4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA4-5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA4-5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	武田(ノババックス)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA1)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA4-5)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA1)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA4-5)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)

25-96.症状_メーカーの組み合わせ別②（接種4回目）

接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）

前回	今回	接種人数	リンパ節の腫れ	関節の痛み	おう吐	下痢	胸の痛み
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	2	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	3	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	100%(1人)	100%(1人)	100%(1人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	2	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA4-5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA4-5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	武田(ノババックス)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA1)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA4-5)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA1)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA4-5)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)

25-97.症状_メーカーの組み合わせ別①（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）

前回	今回	接種人数	37.5℃以上の発熱	注射部位の腫れ	じんましん	けん怠感	頭痛
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	2	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	50%(1人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	52	21.2%(11人)	44.2%(23人)	0%(0人)	63.5%(33人)	30.8%(16人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	87	19.5%(17人)	33.3%(29人)	0%(0人)	43.7%(38人)	20.7%(18人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	25	16%(4人)	40%(10人)	0%(0人)	56%(14人)	32%(8人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	12	25%(3人)	58.3%(7人)	16.7%(2人)	66.7%(8人)	50%(6人)
武田(ノババックス)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	3	33.3%(1人)	33.3%(1人)	0%(0人)	66.7%(2人)	33.3%(1人)
その他	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	10	20%(2人)	60%(6人)	0%(0人)	30%(3人)	10%(1人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	100%(1人)	0%(0人)	0%(0人)	100%(1人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	22	45.5%(10人)	50%(11人)	0%(0人)	63.6%(14人)	50%(11人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	28	39.3%(11人)	39.3%(11人)	3.6%(1人)	53.6%(15人)	42.9%(12人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	45	46.7%(21人)	44.4%(20人)	0%(0人)	66.7%(30人)	35.6%(16人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	19	36.8%(7人)	52.6%(10人)	0%(0人)	73.7%(14人)	36.8%(7人)
武田(ノババックス)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	100%(1人)	0%(0人)	0%(0人)	100%(1人)	0%(0人)
その他	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	13	69.2%(9人)	46.2%(6人)	0%(0人)	76.9%(10人)	38.5%(5人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	100%(1人)	100%(1人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	3	0%(0人)	33.3%(1人)	0%(0人)	33.3%(1人)	33.3%(1人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	3	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	33.3%(1人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	2	50%(1人)	50%(1人)	50%(1人)	50%(1人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	武田(ノババックス)	3	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	33.3%(1人)
その他	武田(ノババックス)	1	0%(0人)	100%(1人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	2	50%(1人)	50%(1人)	0%(0人)	50%(1人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	100%(1人)	0%(0人)	100%(1人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)

25-98.症状_メーカーの組み合わせ別②（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）

前回	今回	接種人数	リンパ節の腫れ	関節の痛み	おう吐	下痢	胸の痛み
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	2	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	52	9.6%(5人)	32.7%(17人)	0%(0人)	5.8%(3人)	9.6%(5人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	87	5.7%(5人)	14.9%(13人)	1.1%(1人)	6.9%(6人)	4.6%(4人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	25	4%(1人)	12%(3人)	0%(0人)	12%(3人)	4%(1人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	12	33.3%(4人)	41.7%(5人)	0%(0人)	8.3%(1人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	3	0%(0人)	66.7%(2人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	10	0%(0人)	10%(1人)	0%(0人)	20%(2人)	10%(1人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	22	4.5%(1人)	22.7%(5人)	0%(0人)	9.1%(2人)	9.1%(2人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	28	0%(0人)	21.4%(6人)	0%(0人)	10.7%(3人)	3.6%(1人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	45	2.2%(1人)	31.1%(14人)	0%(0人)	2.2%(1人)	6.7%(3人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	19	5.3%(1人)	31.6%(6人)	5.3%(1人)	5.3%(1人)	5.3%(1人)
武田(ノババックス)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	13	0%(0人)	38.5%(5人)	0%(0人)	7.7%(1人)	23.1%(3人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	1	0%(0人)	100%(1人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	3	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	3	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	2	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	武田(ノババックス)	3	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	武田(ノババックス)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	100%(1人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	2	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)

25-99.症状_メーカーの組み合わせ別①（接種5回目）

接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）

前回	今回	接種人数	37.5℃以上の発熱	注射部位の腫れ	じんましん	けん怠感	頭痛
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	2	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	52	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	9.6%(5人)	9.6%(5人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	87	0%(0人)	2.3%(2人)	0%(0人)	5.7%(5人)	10.3%(9人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	25	4%(1人)	0%(0人)	4%(1人)	12%(3人)	4%(1人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	12	0%(0人)	8.3%(1人)	8.3%(1人)	8.3%(1人)	8.3%(1人)
武田(ノババックス)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	3	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	10	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	22	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	4.5%(1人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	28	0%(0人)	0%(0人)	7.1%(2人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	45	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	4.4%(2人)	11.1%(5人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	19	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	10.5%(2人)
武田(ノババックス)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	13	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	7.7%(1人)	7.7%(1人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	3	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	3	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	2	50%(1人)	0%(0人)	50%(1人)	0%(0人)	50%(1人)
武田(ノババックス)	武田(ノババックス)	3	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	33.3%(1人)
その他	武田(ノババックス)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	2	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)

25-100.症状_メーカーの組み合わせ別②（接種5回目）

接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）

前回	今回	接種人数	リンパ節の腫れ	関節の痛み	おう吐	下痢	胸の痛み
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	2	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	52	0%(0人)	1.9%(1人)	1.9%(1人)	3.8%(2人)	5.8%(3人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	87	0%(0人)	1.1%(1人)	0%(0人)	10.3%(9人)	2.3%(2人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	25	4%(1人)	4%(1人)	0%(0人)	0%(0人)	4%(1人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	12	8.3%(1人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	8.3%(1人)
武田(ノババックス)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	3	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	10	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	10%(1人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	22	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	28	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	10.7%(3人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	45	2.2%(1人)	2.2%(1人)	0%(0人)	2.2%(1人)	2.2%(1人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	19	0%(0人)	5.3%(1人)	0%(0人)	15.8%(3人)	5.3%(1人)
武田(ノババックス)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	13	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	7.7%(1人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	3	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	3	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	33.3%(1人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	2	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	武田(ノババックス)	3	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	武田(ノババックス)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	2	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)

25-101.症状_メーカーの組み合わせ別①（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）

前回	今回	接種人数	37.5℃以上の発熱	注射部位の腫れ	じんましん	けん怠感	頭痛
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	9	22.2%(2人)	11.1%(1人)	0%(0人)	33.3%(3人)	22.2%(2人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	22	22.7%(5人)	45.5%(10人)	0%(0人)	22.7%(5人)	31.8%(7人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	3	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	33.3%(1人)	33.3%(1人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	9	44.4%(4人)	33.3%(3人)	0%(0人)	55.6%(5人)	44.4%(4人)
武田(ノババックス)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	6	33.3%(2人)	16.7%(1人)	0%(0人)	50%(3人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	6	66.7%(4人)	50%(3人)	0%(0人)	83.3%(5人)	83.3%(5人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	16	43.8%(7人)	31.3%(5人)	0%(0人)	50%(8人)	25%(4人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	6	33.3%(2人)	33.3%(2人)	0%(0人)	83.3%(5人)	33.3%(2人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	17	23.5%(4人)	47.1%(8人)	0%(0人)	58.8%(10人)	17.6%(3人)
武田(ノババックス)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	7	14.3%(1人)	42.9%(3人)	0%(0人)	42.9%(3人)	14.3%(1人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	100%(1人)	0%(0人)

25-102.症状_メーカーの組み合わせ別②（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）

前回	今回	接種人数	リンパ節の腫れ	関節の痛み	おう吐	下痢	胸の痛み
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	9	0%(0人)	11.1%(1人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	22	0%(0人)	18.2%(4人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	3	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	9	22.2%(2人)	44.4%(4人)	11.1%(1人)	11.1%(1人)	11.1%(1人)
武田(ノババックス)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	6	0%(0人)	33.3%(2人)	0%(0人)	16.7%(1人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	6	16.7%(1人)	66.7%(4人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	16	6.3%(1人)	25%(4人)	0%(0人)	6.3%(1人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	6	33.3%(2人)	66.7%(4人)	16.7%(1人)	16.7%(1人)	16.7%(1人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	17	0%(0人)	17.6%(3人)	0%(0人)	17.6%(3人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	7	0%(0人)	14.3%(1人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)

25-103.症状_メーカーの組み合わせ別①（接種6回目）

接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）

前回	今回	接種人数	37.5℃以上の発熱	注射部位の腫れ	じんましん	けん怠感	頭痛
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	9	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	11.1%(1人)	11.1%(1人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	22	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	3	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	9	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	11.1%(1人)	11.1%(1人)
武田(ノババックス)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	6	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	6	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	16.7%(1人)	16.7%(1人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	16	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	6	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	16.7%(1人)	16.7%(1人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	17	0%(0人)	5.9%(1人)	0%(0人)	17.6%(3人)	5.9%(1人)
武田(ノババックス)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	7	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	14.3%(1人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	1	0%(0人)	0%(0人)	100%(1人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)

25-104.症状_メーカーの組み合わせ別②（接種6回目）

接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）

前回	今回	接種人数	リンパ節の腫れ	関節の痛み	おう吐	下痢	胸の痛み
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	9	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	11.1%(1人)	11.1%(1人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	22	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	3	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	9	0%(0人)	11.1%(1人)	0%(0人)	11.1%(1人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	6	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	16.7%(1人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	6	0%(0人)	16.7%(1人)	0%(0人)	16.7%(1人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	16	0%(0人)	6.3%(1人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	6	0%(0人)	16.7%(1人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	17	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	5.9%(1人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	7	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)

25-105.症状_メーカーの組み合わせ別①（接種7回目）

接種7回目1週間後（接種日～7日目まで）

前回	今回	接種人数	37.5℃以上の発熱	注射部位の腫れ	じんましん	けん怠感	頭痛
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	23	8.7%(2人)	39.1%(9人)	0%(0人)	26.1%(6人)	26.1%(6人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	23	8.7%(2人)	34.8%(8人)	0%(0人)	21.7%(5人)	13%(3人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	28	14.3%(4人)	46.4%(13人)	0%(0人)	35.7%(10人)	10.7%(3人)
武田(ノババックス)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	2	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	7	57.1%(4人)	57.1%(4人)	0%(0人)	57.1%(4人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	7	0%(0人)	71.4%(5人)	0%(0人)	28.6%(2人)	28.6%(2人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	7	14.3%(1人)	42.9%(3人)	0%(0人)	42.9%(3人)	14.3%(1人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	62	37.1%(23人)	48.4%(30人)	0%(0人)	41.9%(26人)	25.8%(16人)
武田(ノババックス)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	100%(1人)	0%(0人)	100%(1人)	100%(1人)
その他	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	2	50%(1人)	100%(2人)	0%(0人)	50%(1人)	50%(1人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	武田(ノババックス)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)

25-106.症状_メーカーの組み合わせ別②（接種7回目）

接種7回目1週間後（接種日～7日目まで）

前回	今回	接種人数	リンパ節の腫れ	関節の痛み	おう吐	下痢	胸の痛み
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	23	8.7%(2人)	8.7%(2人)	0%(0人)	13%(3人)	13%(3人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	23	0%(0人)	8.7%(2人)	0%(0人)	8.7%(2人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	28	0%(0人)	17.9%(5人)	0%(0人)	7.1%(2人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	2	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	7	0%(0人)	28.6%(2人)	0%(0人)	0%(0人)	14.3%(1人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	7	0%(0人)	14.3%(1人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	7	14.3%(1人)	14.3%(1人)	0%(0人)	14.3%(1人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	62	8.1%(5人)	29%(18人)	0%(0人)	6.5%(4人)	3.2%(2人)
武田(ノババックス)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	100%(1人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	2	0%(0人)	50%(1人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	武田(ノババックス)	1	0%(0人)	0%(0人)	100%(1人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)

25-107.症状_メーカーの組み合わせ別①（接種7回目）

接種7回目2週間後（8日目～14日目まで）

前回	今回	接種人数	37.5℃以上の発熱	注射部位の腫れ	じんましん	けん怠感	頭痛
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	23	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	13%(3人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	23	4.3%(1人)	0%(0人)	0%(0人)	8.7%(2人)	8.7%(2人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	28	3.6%(1人)	0%(0人)	0%(0人)	7.1%(2人)	7.1%(2人)
武田(ノババックス)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	2	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	7	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	7	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	7	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	14.3%(1人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	62	0%(0人)	0%(0人)	1.6%(1人)	4.8%(3人)	8.1%(5人)
武田(ノババックス)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	2	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	50%(1人)	50%(1人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	武田(ノババックス)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)

25-108.症状_メーカーの組み合わせ別②（接種7回目）

接種7回目2週間後（8日目～14日目まで）

前回	今回	接種人数	リンパ節の腫れ	関節の痛み	おう吐	下痢	胸の痛み
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	23	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	4.3%(1人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	23	0%(0人)	4.3%(1人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	28	0%(0人)	3.6%(1人)	0%(0人)	10.7%(3人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	2	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	7	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	7	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	14.3%(1人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	7	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	14.3%(1人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	62	0%(0人)	1.6%(1人)	0%(0人)	8.1%(5人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	2	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	武田(ノババックス)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)

25-109.症状_メーカーの組み合わせ別①（接種回数不明）

接種回数不明1週間後（接種日～7日目まで）

前回	今回	接種人数	37.5℃以上の発熱	注射部位の腫れ	じんましん	けん怠感	頭痛
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)

25-110.症状_メーカーの組み合わせ別②（接種回数不明）

接種回数不明1週間後（接種日～7日目まで）

前回	今回	接種人数	リンパ節の腫れ	関節の痛み	おう吐	下痢	胸の痛み
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)

25-111.症状_メーカーの組み合わせ別①（接種回数不明）

接種回数不明2週間後（8日目～14日目まで）

前回	今回	接種人数	37.5℃以上の発熱	注射部位の腫れ	じんましん	けん怠感	頭痛
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)


25-112.症状_メーカーの組み合わせ別②（接種回数不明）

接種回数不明2週間後（8日目～14日目まで）


前回	今回	接種人数	リンパ節の腫れ	関節の痛み	おう吐	下痢	胸の痛み
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)

25-113.症状_メーカー別①：乳幼児（6ヶ月～4歳）（接種1・2回目）


接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-114.症状_メーカー別②：乳幼児（6ヶ月～4歳）（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0


接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0

25-115.症状_メーカー別①：乳幼児（6ヶ月~4歳）（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-116.症状_メーカー別②：乳幼児（6ヶ月~4歳）（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-117.症状_メーカー別①：乳幼児（6ヶ月~4歳）（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-118.症状_メーカー別②：乳幼児（6ヶ月~4歳）（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-119.症状_メーカー別①：小児（5~11歳）（接種1・2回目）


接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-120.症状_メーカー別②：小児（5~11歳）（接種1・2回目）


接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-121.症状_メーカー別①：小児（5~11歳）（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-122.症状_メーカー別②：小児（5~11歳）（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-123.症状_メーカー別①：小児（5~11歳）（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-124.症状_メーカー別②：小児（5~11歳）（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-125.症状_メーカー別①：小児（5~11歳）（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-126.症状_メーカー別②：小児（5~11歳）（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-127.症状_メーカー別①：小児（5~11歳）（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）




(小児)接種6回目2週間後




25-128.症状_メーカー別②：小児（5~11歳）（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0


接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0

25-129.症状_メーカー別①：小児（5~11歳）（接種7回目）

接種7回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種7回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-130.症状_メーカー別②：小児（5~11歳）（接種7回目）

接種7回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種7回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-131.症状_メーカー別①：小児（5~11歳）（接種回数不明）

接種回数不明1週間後（接種日～7日目まで）




接種回数不明2週間後（8日目～14日目まで）




25-132.症状_メーカー別②：小児（5~11歳）（接種回数不明）

接種回数不明1週間後（接種日～7日目まで）




接種回数不明2週間後（8日目～14日目まで）




25-133.症状_メーカー別①：10代（12～19歳）（接種1・2回目）


接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）



25-134.症状_メーカー別②：10代（12～19歳）（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5) ■ モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)
■ 武田(ノババックス)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5) ■ モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)
■ 武田(ノババックス)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5) ■ モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)
■ 武田(ノババックス)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5) ■ モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)
■ 武田(ノババックス)




全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

25-135.症状_メーカー別①：10代（12～19歳）（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-136.症状_メーカー別②：10代（12～19歳）（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


25-137.症状_メーカー別①：10代（12～19歳）（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


25-138.症状_メーカー別②：10代（12～19歳）（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


25-139.症状_メーカー別①：10代（12～19歳）（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=9 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):4 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):5 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=7 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):2 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):5 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


25-140.症状_メーカー別②：10代（12～19歳）（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=9 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):4 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):5 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=7 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):2 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):5 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


25-141.症状_メーカー別①：10代（12～19歳）（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


25-142.症状_メーカー別②：10代（12～19歳）（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


25-143.症状_メーカー別①：10代（12～19歳）（接種7回目）

接種7回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


接種7回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


25-144.症状_メーカー別②：10代（12～19歳）（接種7回目）

接種7回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


接種7回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


25-145.症状_メーカー別①：10代（12～19歳）（接種回数不明）

接種回数不明1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=0 ファイザー社1個ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1個ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0 第一三共社1個ワクチン(XBB.1.5):0


接種回数不明2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=0 ファイザー社1個ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1個ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0 第一三共社1個ワクチン(XBB.1.5):0


25-146.症状_メーカー別②：10代（12～19歳）（接種回数不明）

接種回数不明1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


接種回数不明2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


25-147.症状_メーカー別①：20代（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

25-148.症状_メーカー別②：20代（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5) ■ モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)
■ 武田(ノババックス)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5) ■ モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)
■ 武田(ノババックス)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5) ■ モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)
■ 武田(ノババックス)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5) ■ モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)
■ 武田(ノババックス)




全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

25-149.症状_メーカー別① : 20代 (接種3回目)

接種3回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種3回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




25-150.症状_メーカー別②：20代（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


25-151.症状_メーカー別①：20代（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=2 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):2 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=1 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):1 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


25-152.症状_メーカー別② : 20代 (接種4回目)

接種4回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



全体:N=2 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):2 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


接種4回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



全体:N=1 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):1 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


25-153.症状_メーカー別①：20代（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=23 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):14 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):8 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):1


接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=21 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):12 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):8 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):1


25-154.症状_メーカー別②：20代（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=23 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):14 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):8 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):1


接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=21 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):12 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):8 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):1

25-155.症状_メーカー別① : 20代 (接種6回目)

接種6回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種6回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




25-156.症状_メーカー別② : 20代 (接種6回目)

接種6回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種6回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




25-157.症状_メーカー別①：20代（接種7回目）

接種7回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種7回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-158.症状_メーカー別②：20代（接種7回目）

接種7回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種7回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-159.症状_メーカー別① : 20代 (接種回数不明)

接種回数不明1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種回数不明2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




25-160.症状_メーカー別②：20代（接種回数不明）

接種回数不明1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


接種回数不明2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


25-161.症状_メーカー別① : 30代 (接種1・2回目)

接種1回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

接種2回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

接種1回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

接種2回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

25-162.症状_メーカー別② : 30代 (接種1・2回目)

接種1回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5) ■ モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)
■ 武田(ノババックス)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

接種2回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5) ■ モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)
■ 武田(ノババックス)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

接種1回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5) ■ モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)
■ 武田(ノババックス)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

接種2回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5) ■ モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)
■ 武田(ノババックス)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0


25-163.症状_メーカー別① : 30代 (接種3回目)

接種3回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



全体: N=1 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):1 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


接種3回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




全体: N=1 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):1 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0

25-164.症状_メーカー別② : 30代 (接種3回目)

接種3回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種3回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




25-165.症状_メーカー別① : 30代 (接種4回目)

接種4回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種4回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




25-166.症状_メーカー別② : 30代 (接種4回目)

接種4回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



全体: N=2 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):2 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


接種4回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



全体: N=1 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):1 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


25-167.症状_メーカー別① : 30代 (接種5回目)

接種5回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



全体:N=61 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):28 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):29 武田(ノババックス):4 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


接種5回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




全体:N=60 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):29 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):27 武田(ノババックス):4 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0

25-168.症状_メーカー別② : 30代 (接種5回目)

接種5回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種5回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




25-169.症状_メーカー別① : 30代 (接種6回目)

接種6回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



全体:N=7 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):3 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):3 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):1


接種6回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



全体:N=8 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):4 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):3 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):1


25-170.症状_メーカー別② : 30代 (接種6回目)

接種6回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



全体:N=7 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):3 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):3 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):1


接種6回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




全体:N=8 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):4 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):3 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):1

25-171.症状_メーカー別①：30代（接種7回目）

接種7回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種7回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-172.症状_メーカー別②：30代（接種7回目）

接種7回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=5 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):2 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):3 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


接種7回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=4 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):1 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):3 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


25-173.症状_メーカー別① : 30代 (接種回数不明)

接種回数不明1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


接種回数不明2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


25-174.症状_メーカー別② : 30代 (接種回数不明)

接種回数不明1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


接種回数不明2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0

25-175.症状_メーカー別①：40代（接種1・2回目）


接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）



25-176.症状_メーカー別② : 40代 (接種1・2回目)

接種1回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5) ■ モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)
■ 武田(ノババックス)



全体:N=1 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):1 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

接種2回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5) ■ モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)
■ 武田(ノババックス)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

接種1回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5) ■ モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)
■ 武田(ノババックス)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

接種2回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5) ■ モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)
■ 武田(ノババックス)




全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

25-177.症状_メーカー別①：40代（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-178.症状_メーカー別②：40代（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-179.症状_メーカー別①：40代（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-180.症状_メーカー別②：40代（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-181.症状_メーカー別①：40代（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=113 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):70 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):39 武田(ノババックス):3 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):1


接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=112 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):75 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):33 武田(ノババックス):3 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):1


25-182.症状_メーカー別②：40代（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=113 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):70 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):39 武田(ノババックス):3 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):1


接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=112 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):75 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):33 武田(ノババックス):3 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):1


25-183.症状_メーカー別①：40代（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=13 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):5 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):8 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=14 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):6 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):8 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


25-184.症状_メーカー別②：40代（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=13 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):5 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):8 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=14 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):6 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):8 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


25-185.症状_メーカー別①：40代（接種7回目）

接種7回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=29 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):17 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):12 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


接種7回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=30 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):17 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):13 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


25-186.症状_メーカー別②：40代（接種7回目）

接種7回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体：N=29 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)：17 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)：12 武田(ノババックス)：0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)：0


接種7回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体：N=30 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)：17 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)：13 武田(ノババックス)：0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)：0


25-187.症状_メーカー別①：40代（接種回数不明）

接種回数不明1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


接種回数不明2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0

25-188.症状_メーカー別②：40代（接種回数不明）

接種回数不明1週間後（接種日～7日目まで）




接種回数不明2週間後（8日目～14日目まで）




25-189.症状_メーカー別① : 50代 (接種1・2回目)


接種1回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種2回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



接種1回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




接種2回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




25-190.症状_メーカー別② : 50代 (接種1・2回目)

接種1回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

接種2回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

接種1回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0


接種2回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

25-191.症状_メーカー別① : 50代 (接種3回目)

接種3回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種3回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




25-192.症状_メーカー別② : 50代 (接種3回目)

接種3回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種3回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




25-193.症状_メーカー別① : 50代 (接種4回目)

接種4回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種4回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




25-194.症状_メーカー別② : 50代 (接種4回目)

接種4回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種4回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




25-195.症状_メーカー別①：50代（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=188 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):108 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):70 武田(ノババックス):8 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):2


接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=174 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):102 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):60 武田(ノババックス):10 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):2


25-196.症状_メーカー別② : 50代 (接種5回目)

接種5回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



全体: N=188 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):108 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):70 武田(ノババックス):8 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):2


接種5回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




全体: N=174 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):102 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):60 武田(ノババックス):10 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):2

25-197.症状_メーカー別① : 50代（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-198.症状_メーカー別② : 50代 (接種6回目)

接種6回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



全体:N=30 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):17 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):13 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


接種6回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



全体:N=31 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):18 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):13 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


25-199.症状_メーカー別① : 50代 (接種7回目)

接種7回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



全体: N=50 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):23 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):25 武田(ノババックス):1 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):1


接種7回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



全体: N=55 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):28 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):25 武田(ノババックス):1 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):1


25-200.症状_メーカー別② : 50代 (接種7回目)

接種7回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



全体: N=50 ファイザー社1価ワクチン (XBB.1.5): 23 モデルナ社1価ワクチン (XBB.1.5): 25 武田 (ノババックス): 1 第一三共社1価ワクチン (XBB.1.5): 1


接種7回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




全体: N=55 ファイザー社1価ワクチン (XBB.1.5): 28 モデルナ社1価ワクチン (XBB.1.5): 25 武田 (ノババックス): 1 第一三共社1価ワクチン (XBB.1.5): 1

25-201.症状_メーカー別① : 50代 (接種回数不明)

接種回数不明1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種回数不明2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




25-202.症状_メーカー別② : 50代 (接種回数不明)

接種回数不明1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


接種回数不明2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0

25-203.症状_メーカー別①：60代（接種1・2回目）


接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）



25-204.症状_メーカー別② : 60代 (接種1・2回目)

接種1回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5) ■ モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)
■ 武田(ノババックス)



全体:N=1 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):1 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

接種2回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5) ■ モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)
■ 武田(ノババックス)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

接種1回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5) ■ モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)
■ 武田(ノババックス)



全体:N=2 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):1 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):1 武田(ノババックス):0

接種2回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5) ■ モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)
■ 武田(ノババックス)




全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

25-205.症状_メーカー別①：60代（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-206.症状_メーカー別② : 60代 (接種3回目)

接種3回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種3回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




25-207.症状_メーカー別① : 60代 (接種4回目)

接種4回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種4回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




25-208.症状_メーカー別② : 60代 (接種4回目)

接種4回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種4回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




25-209.症状_メーカー別①：60代（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=25 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):11 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):13 武田(ノババックス):1 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=27 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):12 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):14 武田(ノババックス):1 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


25-210.症状_メーカー別②：60代（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=25 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):11 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):13 武田(ノババックス):1 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=27 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):12 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):14 武田(ノババックス):1 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


25-211.症状_メーカー別①：60代（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=73 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):36 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):35 武田(ノババックス):1 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):1


接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=72 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):36 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):34 武田(ノババックス):1 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):1


25-212.症状_メーカー別② : 60代 (接種6回目)

接種6回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



全体:N=73 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):36 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):35 武田(ノババックス):1 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):1


接種6回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



全体:N=72 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):36 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):34 武田(ノババックス):1 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):1


25-213.症状_メーカー別①：60代（接種7回目）

接種7回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体：N=81 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)：41 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)：40 武田(ノババックス)：0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)：0


接種7回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体：N=80 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)：41 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)：39 武田(ノババックス)：0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)：0


25-214.症状_メーカー別② : 60代 (接種7回目)

接種7回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



全体:N=81 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):41 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):40 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


接種7回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




全体:N=80 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):41 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):39 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0

25-215.症状_メーカー別①：60代（接種回数不明）

接種回数不明1週間後（接種日～7日目まで）




接種回数不明2週間後（8日目～14日目まで）




25-216.症状_メーカー別②：60代（接種回数不明）

接種回数不明1週間後（接種日～7日目まで）




接種回数不明2週間後（8日目～14日目まで）




25-217.症状_メーカー別① : 70代 (接種1・2回目)


接種1回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種2回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



接種1回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




接種2回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




25-218.症状_メーカー別② : 70代 (接種1・2回目)

接種1回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

接種2回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

接種1回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0


接種2回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

25-219.症状_メーカー別① : 70代 (接種3回目)

接種3回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種3回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




25-220.症状_メーカー別② : 70代 (接種3回目)

接種3回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種3回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




25-221.症状_メーカー別① : 70代 (接種4回目)

接種4回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種4回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




25-222.症状_メーカー別② : 70代 (接種4回目)

接種4回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種4回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




25-223.症状_メーカー別① : 70代 (接種5回目)

接種5回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種5回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




25-224.症状_メーカー別② : 70代 (接種5回目)

接種5回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種5回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




25-225.症状_メーカー別① : 70代 (接種6回目)

接種6回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



全体:N=5 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):1 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):4 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


接種6回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



全体:N=6 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):2 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):4 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


25-226.症状_メーカー別② : 70代 (接種6回目)

接種6回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



全体:N=5 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):1 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):4 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


接種6回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



全体:N=6 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):2 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):4 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


25-227.症状_メーカー別①：70代（接種7回目）

接種7回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体：N=46 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)：22 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)：24 武田(ノババックス)：0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)：0


接種7回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体：N=37 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)：17 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)：20 武田(ノババックス)：0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5)：0


25-228.症状_メーカー別②：70代（接種7回目）

接種7回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体: N=46 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):22 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):24 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


接種7回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体: N=37 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):17 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):20 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


25-229.症状_メーカー別① : 70代 (接種回数不明)

接種回数不明1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


接種回数不明2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0

25-230.症状_メーカー別② : 70代 (接種回数不明)

接種回数不明1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種回数不明2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




25-231.症状_メーカー別①：80代（接種1・2回目）


接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-232.症状_メーカー別② : 80代 (接種1・2回目)


接種1回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種2回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



接種1回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




接種2回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




25-233.症状_メーカー別① : 80代 (接種3回目)

接種3回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種3回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




25-234.症状_メーカー別② : 80代 (接種3回目)

接種3回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種3回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




25-235.症状_メーカー別① : 80代 (接種4回目)

接種4回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種4回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




25-236.症状_メーカー別② : 80代 (接種4回目)

接種4回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種4回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




25-237.症状_メーカー別①：80代（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-238.症状_メーカー別② : 80代 (接種5回目)

接種5回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種5回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




25-239.症状_メーカー別①：80代（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0

25-240.症状_メーカー別②：80代（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-241.症状_メーカー別① : 80代 (接種7回目)

接種7回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種7回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




25-242.症状_メーカー別② : 80代 (接種7回目)

接種7回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種7回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




25-243.症状_メーカー別① : 80代 (接種回数不明)

接種回数不明1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0


接種回数不明2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0 第一三共社1価ワクチン(XBB.1.5):0

25-244.症状_メーカー別② : 80代 (接種回数不明)

接種回数不明1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



接種回数不明2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)

