DPCにおける高額な新規の医薬品等への対応について

- 1 新規に薬価収載された医薬品等については、DPC/PDPSにおける診療報酬点数表に反映されないことから、一定の基準に該当する医薬品等を使用した患者については、包括評価の対象外とし、次期診療報酬改定までの間、出来高算定することとしている。
 - 包括評価の対象外とするか否かは個別DPC(診断群分類)毎に判定し、また、前年度に使用実績のない医薬品等は、当該医薬品等の標準的な使用における薬剤費(併用する医薬品含む)の見込み額が、使用していない症例の薬剤費の84%tileを包括評価の対象外とすることとしている。
- 2 令和6年12月27日及び令和7年3月27日に新たに効能又は効果及び用法又は用量が追加された医薬品、令和7年3月6日に公知申請が受理された医薬 品並びに令和7年5月21日に薬価収載を予定している医薬品等のうち以下に掲げるものは、上記基準に該当する。よって、これらの薬剤を使用した患者 であって当該薬剤に対応する診断群分類に該当するものについては、次期診療報酬改定までの間、出来高算定することとしてはどうか。

	^2 LT 22	- <u>+</u> // /2	10 16 24 IL	- 111 / TT	効能効果	用法用量	1回投与当たりの	出来高算定対象		平均在院日数を加味した 1入院当たり標準的費用	
区分	路 柄 名	成分名	規格単位	薬価			標準的な費用 (A)	診断群分類番号(告示)	仮想投与回数 (日数)(B)	標準的費用 (A×B)	の 84%tile値
								060185 潰瘍性大腸炎			
					中等症から重症の潰瘍性大腸炎の維持療法(既存治療で効果 不十分な場合に限る)			060185xx99x0xx 1166	1.00回	325, 040円	37, 706円
								060185xx99x1xx 1167	1.00回	325, 040円	148, 114円
						通常、成人にはグセルクマブ		060185xx99x2xx 1168	1.00回	325, 040円	265, 486円
		ガムルカラブ		325, 040円		静注製剤による導入療法終了8週 後から、1回100mgを8週間隔で皮 下投与する。なお、患者の状態		060185xx99x3xx 1169	1.00回	325, 040円	226, 471円
一変	トレムフィア皮下注 100mgシリンジ	グセルクマブ (遺伝子組換					325,040円/回	060185xx99x5xx 1171	1.00回	325, 040円	208, 160円
		(え)				に応じて、点滴静注製剤による 導入療法終了4週後以降に、1回		060185xx97x0xx 1172	1.00回	325, 040円	67, 750円
						200mgを4週間隔で皮下投与することもできる。		060185xx97x1xx 1173	1.00回	325, 040円	281, 494円
								060185xx0100xx 1177	1.00回	325, 040円	39, 797円
								060185xx0101xx 1178	1.00回	325, 040円	213, 620円
								060185xx0110xx 1179	1.00回	325, 040円	78, 086円
								060185xx0111xx 1180	1.00回	325, 040円	285, 249円
					中等症から重症の活動期クローン病の治療(既存治療で効果 不十分な場合に限る)	通常、成人にはミリキズマブ (遺伝子組換え)として、1回 900mgを4週間隔で3回(初回、4 週、8週)点滴静注する。 また、ミリキズマブ(遺伝子組 換え)皮下投与用製剤による治 療中に効果が減弱した場合に は、1回900mgを4週間隔で3回点 滴静注することができる。	569, 355円/回	060180 クローン病等			
	オンボー点滴静注300mg			189, 785円				060180xx99x0xx 1153	1.00回	569, 355円	24, 012円
		mg ミリキズマブ (遺伝子組換 え)	I					060180xx99x1xx 1154	1.00回	569, 355円	134, 415円
一変								060180xx97x0xx 1156	1.00回	569, 355円	49, 517円
								060180xx97x1xx 1157	2.00回	1, 138, 710円	244, 896円
								060180xx01x0xx 1161	1.00回	569, 355円	21, 895円
								060180xx01x1xx 1162	2.00回	1, 138, 710円	206, 774円
								060180 クローン病等			
			= Z 組	ト 125, 123円 123, 952円	山等症から重症の活			060180xx99x0xx 1153	1.00回	366, 840円	24, 012円
	オンボー皮下注100mg オートインジェクター オンボー皮下注100mgシ リンジ	ミリキズマブ (遺伝子組換 え)			動期クローン病の治療(既存治療で効果 不十分な場合に限	ミリキズマブ(遺伝子組換え) 点滴静注製剤による治療終了4週 後から、通常、成人にはミリキ ズマブ(遺伝子組換え)として1 回300mgを4週間隔で皮下投与す る。	366, 840円/回	060180xx99x1xx 1154	1.00回	366, 840円	
一変								060180xx97x0xx 1156	1.00回	366, 840円	49, 517円
								060180xx97x1xx 1157	2.00回	733, 680円	
								060180xx01x0xx 1161	1.00回	366, 840円	21, 895円
								060180xx01x1xx 1162	2.00回	733, 680円	
		<u> </u>	<u> </u>	_1	<u> </u>	1				· · · ·	,

					1515 271		i 効能効果		1回投与当たりの	出来高算定法	出来高算定対象 平均在院日数を加味した 1 入院当たり標準的費用			
区分		拓	名	成分名	規格単位	薬価		用法用量	標準的な費用 (A)	診断群分類番号	(告示) 番号	仮想投与回数 (日数)(B)	標準的費用 (A×B)	の 84%tile値
									040090 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 040120 慢性閉塞性肺疾患 040310 その他の呼吸器の障害					
										040090xxxxxxxx	589	1.00回	53, 493円	8, 450円
	デュピク			デュピルマブ			慢性閉塞性肺疾患	通常、成人にはデュピルマブ		040120xx99000x	602	1.00回	53, 493円	35, 933F
一変	300mgシ デュピク	リンジ フセン	人皮下注	(遺伝子組換	300mg2mL1筒 300mg2mL1キット	53, 493円 53, 659円	(既存治療で効果不) 十分な患者に限る)	(遺伝子組換え)として1回 300mgを2週間隔で皮下投与す	53, 493円/回	040120xx99001x	603	2.00回	106, 986円	77, 325F
	300mgペ	ン		え)	g	,	十分な忠者に限る)	る。		040120xx9901xx	604	2.00回	106, 986円	79, 080円
										040120xx9902xx	605	2.00回	106, 986円	86, 482F
										040120xx97x0xx	607	2.00回	106, 986円	91, 346円
										040120xx01xxxx	609	1.00回	53, 493円	31, 147円
										040310xxxxxxxx	670	1.00回	53, 493円	35, 960F
										070560 重篤な臓器病薬	変を伴う슄	È身性自己免疫疾患		
							既存治療で効果不十	通常、カナキヌマブ(遺伝子組 換え)として1回4mg/kgを、4週 毎に皮下投与する。1回最高用量	3, 052, 150円/回	070560xxxxx00x	1465	1.00回	3, 052, 150円	46, 698F
		ス皮下注射液								070560xxxxx01x	1466	1.00回	3, 052, 150円	102, 898円
	 / = ロュロ			カナキヌマブ						070560xxxxx1xx	1467	2.00回	6, 104, 300円	364, 036円
一変	150mg	NX 17.	T 31 /1X	(遺伝子組換え)	150mg1mL1瓶	1, 526, 075円	│分な成人発症スチル │病			070560xxxxx2xx	1468	2.00回	6, 104, 300円	529, 596円
							71~3	は300mgとする。		070560xxxxx3xx	1469	2.00回	6, 104, 300円	1, 680, 036円
										070560xxxxx4xx	1470	1.00回	3, 052, 150円	363, 980円
										070560xxxxx90x	1473	1.00回	3, 052, 150円	1, 077, 682円
										070560xxxxx91x	1474	2.00回	6, 104, 300円	1, 447, 632円
一変	ベネクレクスタ錠 ベネクレクスタ錠 ベネクレクスタ錠	タ錠50mg	ベネトクラク 10mg1錠 50mg1錠 100mg1錠	50mg1錠	3, 956. 6円	再発又は難治性のマ ントル細胞リンパ腫	イブルチニブとの併用において、通常、成人にはベネトクラクスとして、用量漸増期は第1週目に20mg、第2週目に50mg、第3週目に100mg、第4週目に200mg、第5週目に400mgをそれぞれ1日1回、7日間食後に経口投与する。	第1週目 1,745.6円/回 第2週目 3,956.6円/回 第3週目 7,585.9円/回 第4週目 15,171.8円/回 第5週目 30,343.6円/回		ンパ腫				
			3			., 555. 01		その後の維持投与期は、400mgを 1日1回、食後に経口投与する。		130030xx99x7xx	2007	14.00回	535, 409円	498, 041 F
							なお、患者の状態により適宜減	1111/1.1/1.00°	130030xx97x70x	2024	34.00回	1, 584, 623円		
									量する。 	,, <u> </u>	130030xx97x71x	2025	65.00回	3, 622, 439円
一変	ライブリ 注350mg	リバン	下	アミバンタマ ブ(遺伝子組 換え)	350mg7mL1瓶	160, 014円	の切除不能な進行・	ラゼルチニブメシル酸塩との併用において、4週間を1サイクルとし、通常、成人にはアミバンタマブ(遺伝子組換え)として以下の用法及び用量で点滴静注する。なお、患者の状態により	(1日目) 160,014円/回 (2日目) 320,028円/回 (8、15、22日目) 480,042円/回 このほかに併用薬の費	040040 肺の悪性腫瘍				
								適宜減量する。	用がかかる。	040040xx9908xx	493	3.00回	1, 098, 509円	515, 655 <u>円</u>
	カムザイオスカプセ 1mg カムザイオスカプセ 2. 5mg カムザイオスカプセ 5mg	-スカプセル			g1カプセル 7,264.8円] 引 閉塞性肥大型心筋症	通常、成人にはマバカムテンと して2.5mgを1日1回経口投与から 開始し、患者の状態に応じて適 宜増減する。ただし、最大投与 量は1回15mgとする。		050060 心筋症(拡張型心筋症を含む。)					
									050060xx9900xx	737	14.00回	101, 707円	38, 990円	
新薬 (1)				1mg1カプセル ドカムテン 2.5mg1カプセル 5mg1カプセル					050060xx9901xx	738	27.00回	196, 150円	143, 090円	
		b プセル	マバカムテン						050060xx9902xx	739	19.00回	138, 031円	118, 645円	
									050060xx9910xx	740	7.00回	50, 854円	16, 797F	
									050060xx9911xx	741	29.00回	210, 679円	206, 014円	
										050060xx9912xx	742	16.00回	116, 237円	109, 624F
										050060xx9700xx	743	14.00回	101, 707円	30, 702円

	A6 17 6	D 43 E		薬価	効能効果	用法用量	1回投与当たりの 標準的な費用 (A)	出来高算定法	出来高算定対象		平均在院日数を加味した 1入院当たり標準的費用				
区分	銘 柄 名	成分名	規格単位					診断群分類番号	(告示) 番号	仮想投与回数 (日数)(B)	標準的費用 (A×B)	の 84%tile値			
						〈アラジール症候群〉		060270 劇症肝炎、急性肝不全、急性肝炎 140450 胆道の先天異常(拡張症)							
						通常、マラリキシバット塩化物		060270xx99x0xx	1205	1.00回	3, 888, 641円	26, 233円			
						として、200 μ g/kgを1日1回食前 に経口投与する。1週間後、400		060270xx99x1xx	1206	3.00回	11, 665, 922円	175, 766円			
					アラジール症候群及			060270xx99x4xx	1207	3.00回	11, 665, 922円	1, 330, 270円			
新薬 (3)	リブマーリ内用液	マラリキシ バット塩化物	1%30mL1瓶	3, 888, 640. 7	√び進行性家族性肝内 胆汁うっ滞症におけ	〈進行性家族性肝内胆汁うっ滞	3,888,640.7円/回	060270xx97x0xx	1208	3.00回	11, 665, 922円	126, 426円			
(3)	10mg/mL	ハット塩化物		円	る胆汁うっ滞に伴う	〈進行性家族性肝内胆汁うっ滞症〉 症〉 通常、マラリキシバット塩化物 として、300 μ g/kgを1日1回食前		060270xx97x1xx	1209	5.00回	19, 443, 204円	747, 889円			
					77+	として、300 μ g/kgを1日1回食前 に経口投与する。1週間後、1回		060270xx97x40x	1210	8.00回	31, 109, 126円	2, 621, 932円			
						300 μ g/kg1日2回に増量する。さ		060270xx97x41x	1211	6.00回	23, 331, 844円	2, 839, 529円			
						らに、1週間後、1回600μg/kg1 日2回に増量する。		140450xx99xxxx	2215	1.00回	3, 888, 641円	17, 572円			
								140450xx97xxxx	2216	1.00回	3, 888, 641円	25, 100円			
								140450xx01xxxx	2217	2.00回	7, 777, 281円	70, 199円			
新薬					6円 IDH1遺伝子変異陽性 の急性骨髄性白血病	アザシチジンとの併用において、通常、成人にはイボシデニブとして1日1回500mgを経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。	60,015.2円/回 このほかに併用薬の費 用がかかる。	130010 急性白血病							
(4)	ティブソボ錠250mg	イボシデニブ	シデニブ 250mg1錠	30,007.6円				130010xx99x9xx	1977	14.00回	962, 398円	692, 950 F			
								130010xx97x9xx	1990	39.00回	2, 584, 963円	1, 473, 554円			
新薬 (5)	フスクルース蜒ouling	ラゼルチニブ メシル酸塩水 和物	80mg1錠 240mg1錠	4, 403. 3円 12, 354. 7円		お、患者の状態により適宜減量	12,354.7円/回 このほかに併用薬の費 用がかかる。	040040 肺の悪性腫瘍							
						する。		040040xx9908xx	493	11.00回	1, 098, 509円	515, 655 <u>F</u>			
					中等症から重症の潰瘍性大腸炎の維持療 3円 法(既存治療で効果 3円 不十分な場合に限			060185 潰瘍性大腸炎				T			
			ブ 00001.177					060185xx99x0xx	1166	1.00回	325, 040円	·			
								060185xx99x1xx	1167	1.00回	325, 040円	148, 114円			
						通常、成人にはグセルクマブ (遺伝子組換え)として、点滴		060185xx99x2xx	1168	1.00回	325, 040円	265, 486円			
1.0-44	トレムフィア皮下注	グセルクマブ				静注製剤による導入療法終了8週 後から 1回100mgを8週間隔で皮		060185xx99x3xx	1169	1.00回	325, 040円	·			
┃ 新薬 ┃ (8)	ZUUIIIgシリンシ トルルファア内下注	()害仁之织協	/	339,733円 339,733円		下投与する。なお、患者の状態	325,040円/回	060185xx99x5xx	1171	1.00回	325, 040円	208, 160円			
	200mgペン		え)	え)	え)	(え)	5 , , ,	,	る)	に応じて、点滴静注製剤による 導入療法終了4週後以降に、1回		060185xx97x0xx	1172	1.00回	325, 040円
						200mgを4週間隔で皮下投与する		060185xx97x1xx	1173	1.00回	325, 040円	281, 494円			
								こともできる。		060185xx0100xx	1177	1.00回	325, 040円	39, 797円	
					060185xx0101xx 1178 1.0	1.00回	325, 040円	213, 620円							
								060185xx0110xx	1179	1.00回	325, 040円	78, 086円			
								060185xx0111xx	1180	1.00回	325, 040円	285, 249円			
		mg パー パー (遺伝子組換 え)			1る)	ミリキズマブ(遺伝子組換え) 点滴静注製剤による治療終了4週 後から、通常、成人にはミリキ ズマブ(遺伝子組換え)として1 回300mgを4週間隔で皮下投与する。		060180 クローン病等							
								060180xx99x0xx	1153	1.00回	366, 840円	24, 012円			
	オンボー皮下注200mg オートインジェクター		200mg2mL1キット	242 888 🗆				060180xx99x1xx	1154	1.00回	366, 840円	134, 415円			
新薬	プラル 及下圧Zooliigフ		遺伝子組換 200mg2mLTキット 200mg2mL1筒	242, 888円 242, 888円				060180xx97x0xx	1156	1.00回	366, 840円	49, 517F			
	リンジ							060180xx97x1xx	1157	2.00回	733, 680円	244, 896円			
								060180xx01x0xx	1161	1.00回	366, 840円	21,895円			
										060180xx01x1xx	1162	2.00回	733, 680円	206, 774円	

3 令和7年5月21日に薬価収載を予定している医薬品のうち、類似薬効比較方式により薬価が設定され、かつ、当該類似薬に特化した診断群分類が既に 設定されている以下に掲げるものは、当該診断群分類に反映させることとしてはどうか。

区分	銘柄名	成分名	規格単位	薬価	効能効果	用法用量	1回投与当たりの 標準的な費用 (A)	反映させる診断群分類	
新薬	全斤 港	アコラミジス			トランスサイレチン	通常、成人にはアコラミジス塩		100370 アミロイドーシス	
(2)	ビヨントラ錠400mg	塩酸塩	400mg1錠	8, 995. 9円	ス(野生型及び変異型)	通常、成人にはアコラミジス塩酸塩として1回800mgを1日2回経口投与する。	17, 991. 8円/回	本剤は類似薬効比較方式(I)により薬価が算定され、類似薬が「タファミジス」であったことから、100370 の「タファミジス」による分岐に反映させる。	
						アザシチジンとの併用におい		130010 急性白血病	
新薬 (4)	ティブソボ錠250mg	イボシデニブ	250mg1錠	30, 007. 6円	IDH1遺伝子変異陽性 の急性骨髄性白血病	て、通常、成人にはイボシデニ	60,015.2円/回 このほかに併用薬の費 用がかかる。	本剤は類似薬効比較方式(I)により薬価が算定され、類似薬が「ベネトクラクス」であったことから、130010 の「アザシチジン+ベネトクラクスあり」及び「ベネトクラクス」による分岐に反映させる。	
						アミバンタマブ(遺伝子組換 え)との併用において、通常、			
新薬 (5)	フスクルース蜒oulig ニブカルーブ約240mg	ラゼルチニブ メシル酸塩水 和物	80mg1錠 240mg1錠	4, 403. 3円 12, 354. 7円	EGFR遺伝子変異陽性 の切除不能な進行・ 再発の非小細胞肺癌	成人にはラゼルチニブとして 240mgを1日1回経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。	12,354.70円/回 このほかに併用薬の費 用がかかる。	本剤は類似薬効比較方式(II)により薬価が算定され、類似薬が「オシメルチニブメシル酸塩」であったことから、040040 の「オシメルチニブメシル酸塩」による分岐に反映させる。	
		<i>5</i> 1. 11 5 → →			中等症から重症の潰	通常、成人にはグセルクマブ (造伝ス組換え) トレア 1回		060185 潰瘍性大腸炎	
新薬 (7)	トレムフィア点滴静注 200mg	グセルクマブ (遺伝子組換 え)	200mg20mL1瓶	253, 045円	瘍性大腸炎の寛解導 入療法(既存治療で 効果不十分な場合に 限る)		253,045円/回	本剤は類似薬効比較方式(I)により薬価が算定され、類似薬が「ミリキズマブ」であったことから、060185 の「ミリキズマブ」による分岐に反映させる。	
新薬	ナレムノノ总向肝注	チスレリズマ ブ(遺伝子組	100mg10mL1瓶		根治切除不能な進	フルオロウラシル及びシスプラ チンとの併用において、通常、 成人には、チスレリズマブ(遺 伝子組換え)として、1回200mg を3週間間隔で60分かけて点滴静 注する。がん化学療法後に増悪	チンとの併用において、通常、 成人には、チスレリズマブ(遺 伝子組換え)として、1回200mg を3週間間隔で60分かけて点滴静 注する。がん化学療法後に増悪	428, 996円/回 このほかに併用薬の費	060010 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。)
(9)	100mg	換え)	Toomig Tomic Type	211, 10013	行・再発の食道癌	した根治切除不能な進行・再発 の食道癌に対しては、本剤を単 独投与することもできる。な お、初回投与の忍容性が良好で あれば、2回目以降の投与時間は 30分まで短縮できる。	用がかかる。	本剤は類似薬効比較方式(I)により薬価が算定され、類似薬が「ペムブロリズマブ」であったことから、060010 の「ペムブロリズマブ」による分岐に反映させる。	
		チソツマブ ベドチン(遺 伝子組換え)	チン(遺 40mg1瓶	1瓶 252, 241円	がん化学療法後に増 悪した進行又は再発 の子宮頸癌	通常、成人にはチソツマブ ベドチン(遺伝子組換え)として1回2mg/kg(体重)を30分以上かけて、3週間間隔で点滴静注する。ただし、1回量として200mgを超えないこと。なお、患者の状態により適宜減量する。		12002x 子宮頸・体部の悪性腫瘍	
新薬 (10)	テブダック点滴静注用 40mg						756, 723円/回	本剤は類似薬効比較方式(I)により薬価が算定され、類似薬が「セミプリマブ」であったことから、12002x の「セミプリマブ」による分岐に反映させる。	