

類似薬選定のための薬剤分類（改訂第７版）について

- １．「類似薬選定のための薬剤分類」は、平成１１年の中医協（薬価制度改革の基本方針）に基づき、類似薬効比較方式に係る類似薬選定の透明化を図るために作成されている医療用医薬品成分の分類で、薬価算定における薬理作用類似薬を判断する上での基礎資料。
- ２．今般、平成２８年５月から平成２９年２月までに薬価収載された新薬６０成分について、薬価算定組織において検討作業を進め、「類似薬選定のための薬剤分類（改訂第７版）」としてとりまとめた。

類似薬選定のための薬剤分類

(改訂第7版)

薬価算定組織

2017年5月現在
(平成29年2月15日薬価基準収載分まで)

分類表の見方

- | | |
|--------------|--|
| 1. 内注外区分 | 1:内用薬 2:注射薬 3:外用薬 |
| 2. 分類名 | 原則として、従来の薬効分類名をもとにした。 |
| 3. 主な適応症 | 薬事法上の承認に基づく「効能・効果」をもとに簡潔に記載。
但し、「効能・効果」が多岐にわたる場合は、同一「効能・効果」をもつ薬剤が比較的多い「効能・効果」をまとめて、当該「効能・効果」を「主な適応症」として代表させた。 |
| 4. 薬理作用1、2、3 | 添付文書の「薬効薬理」欄の記述をもとに、主な薬理作用を挙げた。同一の薬理作用をもつ薬剤を同一枠内に記載。 |
| 5. 組成・構造 | 添付文書等から特徴的な構造群名が用いられていれば記載。配合剤については「配合剤」と記載。 |
| 6. 成分 | 添付文書による。 |
| 7. 剤形区分、剤形 | 薬価算定上の剤形分類による。 |
| 8. 用法 | 特に必要な場合、投与回数等を参考として記載。 |
| 9. 線引き | 以上1～8の項目を勘案して、範疇が異なる領域を線により区分。これが投与経路が同じで薬理作用が類似している薬理作用類似薬の範囲を示すこととなる。 |

<追加60成分(平成28年5月～平成29年2月収載分)>

分類名	頁	成分名
113 抗てんかん剤	p.9～	ラコサミド ペランパネル水和物 ビガバトリン
116 抗パーキンソン剤	p.16～	レボドパ／カルビドパ水和物
117 精神神経用剤	p.19～	アセナビンマレイン酸塩
131 眼科用剤	p.29～	カルテオロール塩酸塩／ラタノプロスト
214 血圧降下剤	p.40～	テルミサルタン／アムロジピンベシル酸塩／ヒドロクロロチアジド セレキシパグ
218 高脂血症用剤	p.47～	ロミタピドメシル酸塩 アリロクマブ(遺伝子組換え)
235 下剤・浣腸剤	p.64～	ピコスルファートナトリウム水和物・酸化マグネシウム・無水クエン酸 リナクロチド
239 その他の消化器官用剤	p.69～	メサラジン ブデソニド
241-249 ホルモン剤・抗ホルモン剤	p.70～	ドロスピレノン／エチニルエストラジオール ペータデクス パシレオチドパモ酸塩 コリオゴナドトロピン アルファ(遺伝子組換え)
264 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	p.83～	マキサカルシトール／ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
269 その他の外皮用剤	p.92～	アブレミラスト アダパレン／過酸化ベンゾイル
270-279 歯科用薬剤	p.93～	トラフェルミン(遺伝子組換え)
290 その他の個々の器官系用医薬品	p.94～	プロプラノロール塩酸塩
333・339 血液凝固・血小板凝集阻止剤	p.106～	チカグレロル
339 その他の血液・体液用薬	p.107～	プレリキサホル イダルシズマブ(遺伝子組換え)
391 肝臓疾患用剤	p.111～	カルグルミン酸 リファキシミン
395 酵素製剤	p.116～	セベリパーゼ アルファ(遺伝子組換え)
396 糖尿病薬	p.117～	アログリプチン安息香酸塩／メトホルミン塩酸塩
244・247・248・311・398・399 骨代謝疾患用剤(カルシウム剤を除く)	p.121～	ゾレドロン酸水和物

分類名	頁	成分名
399 他に分類されない代謝性医薬品	p.123～	フマル酸ジメチル イキセキズマブ(遺伝子組換え) プロダルマブ(遺伝子組換え) エテルカルセチド塩酸塩
421-429 腫瘍用薬	p.126～	ポナチニブ水和物 オシメルチニブメシル酸塩 セリチニブ イブルチニブ ダブラフェニブメシル酸塩 トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物 エロツズマブ(遺伝子組換え) カルフィルゾミブ ペムブロリズマブ(遺伝子組換え) 塩化ラジウム(²²³ Ra)
441-449 アレルギー用薬	p.135～	デスロラタジン ビラスチン メボリズマブ(遺伝子組換え)
625 ウイルスに作用するもの	p.145～	テノホビル アラフェナミドフマル酸塩 グラゾプレビル水和物 エルバスビル ダクラタスビル塩酸塩／アスナプレビル／ベクラブビル塩酸塩 エムトリシタビン／テノホビル アラフェナミドフマル酸塩 ダルナビル エタノール付加物／コビシスタット エルビテグラビル／コビシスタット／エムトリシタビン／テノホビル アラフェナミドフマル酸塩
634 輸血用血液製剤・血漿分画製剤・血球由来製剤	p.149～	オクトコグ ベータ(遺伝子組換え) ルリオクトコグ アルファ ペゴル(遺伝子組換え) アルブトレペノナコグ アルファ(遺伝子組換え)
641 原虫に作用するもの	p.154～	アトバコン／プログアニル塩酸塩 アルテメテル／ルメファントリン プリマキンリン酸塩

111 全身麻酔剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分名	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
2	全身麻酔剤	全身麻酔の導入	麻酔作用	下行性抑制系活動の増強作用			ケタミン塩酸塩	注－1	注射薬		ケタラール	
				脳幹の網様体賦活系の抑制作用			チアミラールナトリウム	注－1	注射薬		0.5gイソゾール	
							チオペンタールナトリウム	注－1	注射薬		ラボナール注	
		全身麻酔の導入および維持	麻酔作用				プロボフォール	注－1 注－2	注射薬 キット		ディプリバン注	
		麻酔の補助	鎮痛作用	神経遮断作用			ドロペリドール	注－1	注射薬		ドロレプタン	
3	全身麻酔剤	全身麻酔	麻酔作用	上行性網様体賦活系抑制作用		ハロゲン化エーテル系	イソフルラン	外－2	吸入剤		フォーレン	
							セボフルラン	外－2	吸入剤		セボフレン	
							デスフルラン	外－2	吸入剤		スープレン吸入麻酔	
							麻酔用エーテル	外－2	吸入剤		麻酔用エーテル	
							ハロタン	外－2	吸入剤		フローセン	
							亜酸化窒素	外－2	吸入剤		亜酸化窒素、笑気ガス	

112 抗不安剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	抗不安剤	神経症、心身症における不安・緊張・抑うつ・ (睡眠障害)	抗不安作用	ベンゾジアゼピン受容体刺激作用		ベンゾジアゼピン系	フルトラゼパム	内ー1	錠剤		レスタス錠	
							ロフラゼパ酸エチル	内ー2 内ー1	細粒剤 錠剤		メイラックス細粒 メイラックス錠	
							オキサゾラム	内ー2 内ー2 内ー1	散剤 細粒剤 錠剤		セレナール散 ベルサル細粒 セレナール錠	
							クロキサゾラム	内ー2 内ー1	散剤 錠剤		セバゾン散 セバゾン錠	
							クロルジアゼボキシド	内ー2 内ー1	散剤 錠剤		コントロール散、バラン ス散 コントロール錠、バラン ス錠	
							ジアゼパム	内ー2 内ー1 内ー3	散剤 錠剤 シロップ剤		セルシン100倍散 セルシル錠 セルシンシロップ	
							メキサゾラム	内ー2 内ー1	細粒剤 錠剤		メレックス細粒 メレックス錠	
							メダゼパム	内ー1	錠剤		レスミット錠	
							プロマゼパム	内ー2 内ー1	細粒剤 錠剤		レキシタン細粒 レキシタン錠	
							ロラゼパム	内ー1	錠剤		ワイバックス錠	
							エチゾラム	内ー2 内ー1	細粒剤 錠剤		デバス細粒 デバス錠	
							クロチアゼパム	内ー2 内ー1	顆粒剤 錠剤		リーゼ顆粒 リーゼ錠	
							クロラゼパ酸ニカリウム	内ー1	カプセル剤		メンドン	
							フルタゾラム	内ー2 内ー1	細粒剤 錠剤		コレミナール細粒 コレミナール錠	
							アルプラゾラム	内ー1	錠剤		コンスタン錠	
							フルジアゼパム	内ー1	錠剤		エリスパン錠	
		不安緊張状態の鎮静	鎮静作用	セロトニン受容体刺激作用		アザピロン系	タンドスピロンクエン酸塩	内ー1	錠剤		セディール錠	
						ジフェニルメタン系	ヒドロキシジン塩酸塩	内ー1	錠剤		アタラックス	
							ヒドロキシジンパモ酸塩	内ー2 内ー1 内ー1 内ー3 内ー3	散剤 錠剤 カプセル剤 シロップ剤 ドライシロップ剤		アタラックスP10倍散 ハタナジン錠 アタラックスP アタラックスPシロップ アタラックスPドライシ	
							ガンマオリザノール	内ー2 内ー1	細粒剤 錠剤		ハイゼット細粒 ハイゼット錠	
							臭化カリウム	内ー2	末剤		臭化カリウム末	
							臭化ナトリウム	内ー2	末剤		臭化ナトリウム末	
2	抗不安剤	神経症における不安・緊張・抑うつ	抗不安作用	ベンゾジアゼピン受容体刺激作用		ベンゾジアゼピン系	ジアゼパム	注ー1	注射薬		セルシン注射液	
		麻酔前投薬、神経症における不安・緊張・抑うつ	抗不安作用			ジフェニルメタン系	ヒドロキシジン塩酸塩	注ー1	注射薬		アタラックスP注射液	
3	抗不安剤	麻酔前投薬	抗不安作用	ベンゾジアゼピン受容体刺激作用		ベンゾジアゼピン系	プロマゼパム	外ー6	坐剤		セニラン坐剤	

112 催眠鎮静剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3 (作用持続時間)	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	催眠鎮静剤	不眠症	睡眠作用	ベンゾジアゼピン受容体刺激作用	短時間作用型	ベンゾジアゼピン系	トリアゾラム	内-1	錠剤		ハルシオン	
							リルマザホン塩酸塩	内-1	錠剤		リスミー錠	
							ロラメタゼパム	内-1	錠剤		ロラメット錠	
						シクロピロン系	ゾピクロン	内-1	錠剤		アモバン錠	
							エスゾピクロン	内-1	錠剤		ルネスタ錠	
						イミダゾピリジン系	ゾルピデム酒石酸塩	内-1	錠剤		マイスリー錠	
							プロチゾラム	内-1	錠剤		レンドルミン錠	
					中間作用型	ベンゾジアゼピン系	エスタゾラム	内-2 内-1	散剤 錠剤		ユーロジン散 ユーロジン錠	
							フルニトラゼパム	内-1	錠剤		サイレース錠	
							ニトラゼパム	内-2	散剤		ネルボン散	
								内-2	細粒剤		ベンザリン細粒	
								内-1	錠剤		ネルボン錠 ベンザリン錠	
					長時間作用型	ベンゾジアゼピン系	フルラゼパム塩酸塩	内-1	カプセル剤		ベノジールカプセル ダルメートカプセル	
							クアゼパム	内-1	錠剤		ドラール錠	
							ハロキサゾラム	内-2	細粒剤		ソメリン細粒	
								内-1	錠剤		ソメリン錠	
					短時間作用型		フロモバレリル尿素	内-2	末剤		フロムワレリル尿素	
					短時間作用型	バルピツール酸系	ペントバルビタールカルシウム	内-1	錠剤		ラボナ錠	
							アモバルビタール	内-2	末剤		イソミタール	
					長時間作用型	バルピツール酸系	バルビタール	内-2	末剤		バルビタール	
							フェノバルビタール	内-2	末剤		フェノバルビタール末(局)	
								内-2	散剤		フェノバルビタール散(局)	
								内-1	錠剤		フェノバル錠	
								内-3	液剤		フェノバルエリキシル	
					短時間作用型		抱水クロラール	内-2	末剤		抱水クロラール「ホエイ」	
							トリクロホスナトリウム	内-3,4	シロップ剤		トリクロールシロップ	
2	催眠鎮静剤	鎮静	催眠鎮静作用	Cl-透過性上昇作用	中間作用型	バルピツール酸系	セコバルビタールナトリウム	注-1	注射薬		注射用アイオナールナトリウム	
					長時間作用型	バルピツール酸系	フェノバルビタール	注-1	注射薬		フェノバル	
		麻酔導入		ベンゾジアゼピン受容体刺激作用	短時間作用型	ベンゾジアゼピン系	ミダゾラム	注-1	注射薬		ドルミカム注	
		集中治療における鎮静	鎮静作用	中枢性 $\alpha 2$ 受容体刺激作用	中間作用型	ベンゾジアゼピン	フルニトラゼパム	注-1	注射薬		サイレース注	
							デクスメトミジン塩酸塩	注-1	注射薬		フレセデックス静注液200 μ g「アボット」	
3	催眠鎮静剤	催眠、不安・緊張状態の鎮静	催眠鎮静作用	透過性上昇作用	長時間作用型	バルピツール酸系	フェノバルビタールナトリウム	外-6	坐剤		ワコビタール坐剤	
				中枢神経系(大脳皮質)抑制作用	短時間作用型		抱水クロラール	外-6	坐剤		エスクレ坐剤	
								外-9	キット		エスクレ注腸用キット「500」	

113 抗てんかん剤

内注外 区分	分類名	主な適応症(国際抗てんかん発作分類)	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	抗てんかん剤	複雑部分発作, 単純部分発作, 全般発作(特に欠神発作, ミオクローニー発作), 混合発作	抗痙攣作用	GABA分解酵素活性阻害作用		脂肪酸系	パルプロ酸ナトリウム	内-2 内-2 内-1 内-1 内-4	細粒剤 顆粒剤 錠剤 錠剤 シロップ剤		デパケン細粒 セレニカル顆粒 デパケン錠 デパケンR錠 デパケンシロップ	
		複雑部分発作, 単純部分発作, 全般発作	抗痙攣作用	電位依存性Naチャンネル遮断作用		ヒダントイン系	フェニトイン	内-2 内-2 内-2 内-1 内-1	散剤 散剤 散剤 錠剤 錠剤		アレビアチン散 ヒダントール散 フェニトイン散 アレビアチン錠 ビタントール錠	
		全般発作(特に強直間代発作)				イミノスチルベン系	エトイン	内-2	末剤		アクセノン末	
		複雑部分発作, 全般発作(特に強直性間代発作)					カルバマゼピン	内-2 内-1	細粒剤 錠剤		デグレトール細粒 デグレトール錠	
		複雑部分発作, 単純部分発作, 全般発作	抗痙攣作用	Cl ⁻ 透過性上昇作用		バルピツール酸系	フェノバルビタール	内-2 内-2 内-1 内-3	末剤 散剤 錠剤 液剤		フェノバル末 フェノバル10倍散 フェノバル錠 フェノバルビタールエリキシル	
							プリミドン	内-2 内-1	細粒剤 錠剤		マイソリン細粒 マイソリン錠	
		複雑部分発作, 全般発作(特にミオクローニー発作)	抗痙攣作用	ベンゾジアゼピン受容体刺激作用		ベンゾジアゼピン系	クロナゼパム	内-2 内-1	細粒剤 錠剤		ランドセン細粒 ランドセン錠	
		単純部分発作, 全般発作					ニトラゼパム	内-2 内-2 内-1 内-1	散剤 細粒剤 錠剤 錠剤		ネルボン散 ベンザリン細粒 ネルボン錠 ベンザリン錠	
		他の薬剤と併用による複雑部分発作, 単純部分発作, 全般発作					クロバザム	内-2 内-1	細粒剤 錠剤		マイスタン細粒 マイスタン錠	
		全般発作(特に欠神発作)	抗痙攣作用	Caチャンネル遮断作用		オキサゾリジン系	トリメタジオン	内-2	散剤		ミ・アレビアチン散	
		複雑部分発作, 単純部分発作, 全般発作	抗痙攣作用			フェニル尿素系	アセチルフェネトライド	内-2 内-1	末剤 錠剤		クランポール クランポール錠	
		複雑部分発作	抗痙攣作用			スルタム系	スルチアム	内-1	錠剤		オスボロツ錠	
		全般発作(特に欠神発作)	抗痙攣作用			スクシミド系	エトスクシミド	内-2 内-4	散剤 シロップ剤		エピレオブリマル散 サロンチンシロップ	
		複雑部分発作, 単純部分発作, 全般発作(特に強直間代発作), 混合発作	抗痙攣作用			ベンズイソキサゾール系	ゾニサミド	内-2 内-1	散剤 錠剤		エクセグラン	
		部分発作(他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかん患者)	抗痙攣作用	電位依存性Caチャンネル阻害作用 電位依存性Naチャンネル抑制作用、電位依存性L型Caチャンネル抑制作用、AMPA/カイニン酸型グルタミン酸受容体機能抑制作用、炭酸脱水酵素阻害作用、GABAA受容体機能増強作用			ガバペンチン	内-1 内-3,4	錠剤 シロップ剤		ガバペン錠 ガバペンシロップ	
							トピラマート	内-1	錠剤		トピナ錠	
								内-2	細粒剤		トピナ細粒	
				電位依存性Naチャンネル抑制作用			ラコサミド	内-1	錠剤		ビムバット錠	
		部分発作、強直間代発作(他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかん患者)		AMPA型グルタミン酸受容体拮抗作用			ペランパネル水和物	内-1	錠剤		フィコンパ錠	
		部分発作(他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかん患者)	抗痙攣作用	シナプス小胞たん白質2A(SV2A)との結合によるてんかん発作抑制作用			レベチラセタム	内-1	錠剤		イーケブラ錠	

								内-3,4	ドライシロップ剤		イーケブラドライシロップ	
		部分発作、強直間代発作、Lennox-Gastaut症候群における全般発作（他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかん患者） 他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないLennox-Gastaut症候群における強直発作及び脱力発作に対する抗てんかん薬との併用療	抗痙攣作用	電位依存性Naチャンネル抑制作用			ラモトリギン	内-1	錠剤 錠小児用		ラミクタール	
							ルフィナミド	内-1	錠剤		イノベロン錠	
		クロバザム及びバルプロ酸ナトリウムで十分な効果が認められないDravet症候群患者における間代発作又は強直間代発作に対するクロバザム及びバルプロ酸ナトリウムとの併用療法	抗痙攣作用	GABA の取り込み阻害作用			スチリペンツール	内-1 内-3,4	カプセル剤 ドライシロップ剤		ディアコミットカプセル ディアコミットドライシロップ	
		点頭てんかん	抗痙攣作用	GABAアミノ基転移酵素阻害作用			ピガバリン	内-2	散剤		サブリル散分包	
		皮膚性ミオクローヌスに対する抗てんかん剤などの併用療法	抗ミオクローヌス作用				ピラセタム	内-3	液剤		ミオカーム内服液	
		複雑部分発作、単純部分発作、全般発作	配合剤（抗痙攣作用＋催眠鎮静作用）	電位依存性Naチャンネル遮断作用		配合剤	フェニトイン／フェノバルビタール／安息香酸ナトリウムカフェイン	内-1	錠剤		ヒダントール-D、-E、-F	
						配合剤	フェニトイン／フェノバルビタール	内-1	錠剤		複合アレビアチン	
2	抗てんかん剤	複雑部分発作、単純部分発作、全般発作	抗痙攣作用	Cl ⁻ 透過性上昇作用		バルビツール酸系	フェノバルビタール	注-1	注射薬		10%フェノバル	
		新生児けいれん、てんかん重積発作					フェノバルビタールナトリウム	注-1	注射薬		ノーベルバル静注用	
		全般発作（てんかん発作重積症を含む）	抗痙攣作用	電位依存性Naチャンネル遮断作用		ヒダントイン系	フェニトインナトリウム	注-1	注射薬		アレビアチン注射液	
		てんかん重積状態、脳外科手術又は意識障害（頭部外傷等）時のてんかん発作の発現抑制等					ホスフェニトインナトリウム水和物	注-1	注射薬		ホストイン静注	
		てんかん重積状態		ベンゾジアゼピン受容体刺激作用		ベンゾジアゼピン系	ミダゾラム	注-1	注射薬		ミダフレッサ静注	
		全般発作（てんかん様重積発作の抑制を含む）	抗痙攣作用	ベンゾジアゼピン受容体刺激作用		ベンゾジアゼピン系	ジアゼパム	注-1	注射薬		セルシン注射液	
		部分発作（二次性全般化発作を含む）	抗痙攣作用	シナプス小胞たん白質2A（SV2A）との結合によるてんかん発作抑制作用			レベチラセタム	注-1	注射薬		イーケブラ点滴静注	
3	抗てんかん剤	熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善	抗痙攣作用	Cl ⁻ 透過性上昇作用		バルビツール酸系	フェノバルビタール	外-6	坐剤		ワコビタール坐剤	
				ベンゾジアゼピン受容体刺激作用		ベンゾジアゼピン系	ジアゼパム	外-6	坐剤		ダイアップ坐剤	

114 解熱鎮痛消炎剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き	
1	解熱鎮痛消炎 剤	疼痛性疾患、炎症性疾患、熱性疾患	鎮痛作用／抗炎症作用／ (解熱作用)	プロスタグランジン生合成阻 害作用		アリール酢酸系	アセメタシン	内－1	錠剤		ランツジールコーワ 錠		
							インドメタシン	内－1	カプセル剤		インドメタシンカプセ		
							ジクロフェナクナトリウム	内－1	錠剤		ボルタレン錠		
								内－1	カプセル剤		ボルタレンSRカプセ ル		
								内－1	カプセル剤		ナポールSRカプセ ル		
								アンフェナクナトリウム	内－1	カプセル剤			フェナゾックスカプセ ル
							モフェゾラク	内－1	錠剤		ジソベイン錠		
							インドメタシンファルネシル	内－1	カプセル剤		インフリーカプセル		
							スリンダク	内－1	錠剤		クリノリル錠		
							ナブメトン	内－1	錠剤		レリフェン錠		
							プログルメタシンマレイン酸塩	内－1	錠剤		ミリダシン錠		
							アントラニル酸系	フルフェナム酸アルミニウム	内－1	錠剤			オバイリン錠
								メフェナム酸	内－2	散剤			ボンタール散
									内－2	細粒剤			ボンタール細粒
									内－1	錠剤			ボンタール錠
							内－1		カプセル剤		ボンタールカプセル		
						内－3	シロップ剤		ボンタールシロップ				
						プロピオン酸系	チアプロフェン酸	内－1	錠剤		スルガム錠		
							ロキソプロフェンナトリウム	内－2	細粒剤		ロキソニン細粒		
								内－1	錠剤		ロキソニン錠		
								内－3	液剤				
							イブプロフェン	内－2	顆粒剤		ブルフェン顆粒		
							内－1	錠剤		ブルフェン錠			
							ブラプロフェン	内－1	錠剤		ニフラン錠		
								内－1	カプセル剤				
								内－3	シロップ剤				
							内－3	液剤					
						オキサプロジン	内－1	錠剤		アルボ			
						ザルトプロフェン	内－1	錠剤		ゾレトン錠、ベオン錠			
						ナプロキセン	内－1	錠剤		ナイキサン錠			
						フルルビプロフェン	内－2	顆粒剤		フロベン顆粒			
			内－1	錠剤			フロベン錠						
オキシカム系	アンピロキシカム	内－1	カプセル剤		フルカムカプセル								
	ピロキシカム	内－1	カプセル剤		バキソカプセル								
	メロキシカム	内－1	錠剤		モービック錠								
	ロルノキシカム	内－1	錠剤		ロルカム錠								
ピラノ酢酸系	エトドラク	内－1	錠剤		オステラック錠 ハイベン錠								
サリチル酸系	アスピリン	内－2	末剤		アスピリン末								
		内－1	錠剤		アスピリン錠								
コキシブ系	セレコキシブ	内－1	錠剤		セレコックス錠								
サリチル酸系	サリチルアミド	内－2	末剤		サリチルアミド「イワ キ」								
	エビリゾール	内－2	顆粒剤		メブロンG								
	チアラミド塩酸塩	内－1	錠剤		ソランタール錠								
	ブコローム	内－1	カプセル剤		パラミジンカプセル								
	配合剤	アスピリン／ダイアルミネート	内－1	錠		バファリン330mg錠							
	熱性疾患、疼痛性疾患	解熱作用／鎮痛作用		体温中枢調節作用／中枢性 痛覚抑制作用		アニリン系	アセトアミノフェン	内－2	散剤		アセトアミノフェン		
内－2							細粒剤		コロナール細粒				
内－1							錠剤		コロナール錠				
内－3							シロップ剤		コロナールシロップ				
内－3							ドライシロップ 剤		アセトアミノフェンドラ イシロップ				

						ピラゾロン系	イソプロビルアンチピリン	内ー2	散剤		イソプロビルアンチピリン	
						サリチル酸系	エテンザミド	内ー2	散剤		エテンザミド	
		熱性疾患	解熱作用	体温中枢調節作用		ピラゾロン系	スルピリン	内ー2	散剤		スルピリン	
		疼痛性疾患	鎮痛作用	中枢鎮痛機構活性化作用			ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液	内ー1	錠剤		ノイロトロピン錠	
			配合剤(鎮痛作用)	中枢性痛覚抑制作用＋中枢興奮作用		配合剤	アンチピリン／カフェイン／クエン酸	内ー2	末剤		ミグレニン	
				視床下部抑制作用＋中枢興奮作用		配合剤	シメトリド／無水カフェイン	内ー2	顆粒剤		キョーリンAP2配合顆粒	
2	解熱鎮痛消炎剤	疼痛性疾患	鎮痛作用			プロピオン酸系	ケトプロフェン	注ー1	注射薬		カピステン筋注、メジエイド筋注	
							フルルビプロフェンアキセチル	注ー1	注射薬		ロビオン静注	
				体温中枢調節作用／中枢性痛覚抑制作用		サリチル酸系	サリチル酸ナトリウム	注ー1	注射薬		サルソニン静注	
				中枢鎮痛機構活性化作用			ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液	注ー1	注射薬		ノイロトロピン注射液	
			配合剤	プロスタグランジン生合成阻害作用＋鎮痛効果増強作用		配合剤	サリチル酸ナトリウム／コンドロイチン硫酸ナトリウム	注ー1	注射薬		ロイサールS注射液	
				プロスタグランジン生合成阻害作用＋局所麻酔作用		配合剤	サリチル酸ナトリウム／ジブカイン	注ー1	注射薬		ネオビタカイン注	
								注ー2	キット		ネオビタカイン注シリンジ	
		熱性疾患	解熱作用	体温中枢調節作用		ピラゾロン系	スルピリン	注ー1	注射薬		メチロン注	
		熱性疾患、疼痛性疾患	解熱作用／鎮痛作用	体温中枢調節作用／中枢性痛覚抑制作用		アニリン系	アセトアミノフェン	注ー1	注射薬		アセリオ静注液	
3	解熱鎮痛消炎剤	熱性疾患、疼痛性疾患、炎症性疾患	解熱作用／鎮痛作用／抗炎症作用	プロスタグランジン生合成阻害作用		アリール酢酸系	ジクロフェナクナトリウム	外ー6 外ー1 外ー1 外ー1 外ー5	坐剤 クリーム剤 ローション剤 ゲル 貼付剤		ボルタレンサボ ボルタレンクリーム ボルタレンローション ボルタレンゲル ボルタレンテープ	
						プロピオン酸系	ケトプロフェン	外ー6	坐剤		メナミン坐剤	
						アリール酢酸系	インドメタシン	外ー6	坐剤		インダシン坐剤	
						オキシカム系	ピロキシカム	外ー6	坐剤		フェルデンザボジトリ	
		熱性疾患、疼痛性疾患	解熱作用／鎮痛作用	体温中枢調節作用＋中枢性痛覚抑制作用		アニリン系	アセトアミノフェン	外ー6	坐剤		アンヒバ坐剤	

114 弱オピオイド類

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	弱オピオイド類	癌性疼痛	鎮痛作用	中枢神経刺激伝導抑制作用		ベンズアゾシン系 フェノールエーテル系	ペンタゾシン塩酸塩	内－1	錠剤		ソセゴン錠25mg	
		癌性疼痛、慢性疼痛（非オピオイド鎮痛剤で治療困難な場合）					トラマドール塩酸塩	内－1	錠剤	1日4回	トラマールOD錠	
		非がん性慢性疼痛、抜歯後の疼痛（非オピオイド鎮痛剤で治療困難な場合）	鎮痛作用	中枢神経刺激伝導抑制作用 ／中枢性痛覚抑制作用			トラマドール塩酸塩／アセトアミノフェン	内－1	錠剤	1日1回	ワントラム錠 トラムセット配合錠	
2	弱オピオイド類	癌性疼痛、術後疼痛	鎮痛作用	中枢神経刺激伝導抑制作用		ベンザゾニン系	エブタゾシン臭化水素酸	注－1	注射薬		セタペイン注	
							ブプレノルフィン塩酸塩	注－1	注射薬		レペタン注	
						ベンズアゾシン系	ペンタゾシン	注－1	注射薬		ソセゴン注射液	
						フェノールエーテル	トラマドール塩酸塩	注－1	注射薬		クリスピン注1号	
3	弱オピオイド類	癌性疼痛、術後疼痛	鎮痛作用	中枢神経刺激伝導抑制作用			ブプレノルフィン塩酸塩	外－6	坐剤		レペタン坐薬	
		慢性疼痛における鎮痛（変形性関節症、腰痛症）	鎮痛作用	中枢神経刺激伝導抑制作用			ブプレノルフィン	外－5	貼付剤		ノルスパンテープ	

114・211・216 片頭痛用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	片頭痛用剤	片頭痛	血管収縮作用	抗セロトニン作用			ジメチアジンメシル酸塩	内ー1	錠剤		ミグリステン錠	
				セロトニン5-HT1受容体刺激作用		トリプタン系	コハク酸スマトリプタン	内ー1	錠剤		イミグラン錠	
							臭化水素酸エレクトリプタン	内ー1	錠剤		レルバックス錠20mg	
							ゾルミトリプタン	内ー1	錠剤		ゾーミック錠	
							安息香酸リザトリプタン	内ー1	錠剤		マクサルT錠10mg	
							ナラトリプタン塩酸塩	内ー1	錠剤		アマージ錠	
			中枢神経興奮作用				カフェイン	内ー2	末剤		カフェイン	
							安息香酸ナトリウムカフェイン	内ー2	末剤		安息香酸ナトリウムカフェイン	
			血管収縮抑制作用	カルシウム拮抗作用		ピペラジン系	塩酸ロメリジン	内ー1	錠剤		ミグシス錠	
			配合剤(血管収縮作用＋中枢神経興奮作用＋鎮痛作用)			配合剤	酒石酸エルゴタミン／無水カフェイン／イソプロピルアンチピリン	内ー1	錠剤		クリアミンA錠 クリアミンS錠	
2	片頭痛用剤	片頭痛	脳血管収縮作用	セロトニン5-HT1受容体刺激作用		トリプタン系	スマトリプタンコハク酸塩	注ー1 注ー2	注射薬 キット		イミグラン注3 イミグランキット皮下 注3mg	
3	片頭痛用剤	片頭痛	血管収縮作用	セロトニン5-HT1受容体刺激作用		トリプタン系	スマトリプタン	外ー2	噴霧剤 (鼻腔内)		イミグラン点鼻液20	

115 興奮剤・覚醒剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分名	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	覚醒剤	ナルコレプシー	覚醒作用	ノルエピネフリン、ドパミン遊離取り込み阻害作用／MAO阻害作用			メタンフェタミン塩酸塩	内－1	錠剤		ヒロポン錠	
2	覚醒剤	ナルコレプシー	覚醒作用	ノルエピネフリン、ドパミン遊離取り込み阻害作用／MAO阻害作用			メタンフェタミン塩酸塩	注－1	注射薬		ヒロポン注射液	

116 抗パーキンソン剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤型区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	抗パーキンソン剤	パーキンソン病	ドパミン増加作用				レボドパ	内-2 内-1 内-1	散剤 錠剤 カプセル剤		ドバストン散 ドバゾール錠 ドバールカプセル	
			配合剤(ドパミン増加作用+レボドパ 脱炭酸酵素阻害作用)			配合剤	レボドパ/ベンセラジド塩酸塩	内-1	錠剤		ネオドパゾール錠	
						配合剤	レボドパ/カルビドパ水和物	内-1	錠剤		ネオドバストン錠	
						配合剤	レボドパ/カルビドパ水和物	内-3	液剤		デュオドーパ配合経 腸用液	
			配合剤(ドパミン増加作用+レボドパ 脱炭酸酵素阻害作用+COMT阻害作 用)			配合剤	レボドパ/カルビドパ水和物/エンタ カボン	内-1	錠剤		スタレボ配合錠	
			ドパミン受容体刺激作用	ドパミンD2受容体刺激作用			タリペキソール塩酸塩	内-1	錠剤		ドミン錠	
							ブラミベキソール塩酸塩水和物	内-1	錠剤	1日2~3 回	ビ・シフロール錠	
							ロビニロール塩酸塩	内-1	錠剤	1日1回	ミラベックスLA錠	
								内-1	錠剤	1日3回	レキップ錠	
				ドパミンD1、D2受容体刺激作			カベルゴリン	内-1	錠剤	1日1回	レキップCR錠	
							ベルゴリドメシル酸塩	内-1 内-2	錠剤 顆粒剤		カバサル錠 ベルマックス錠	
			ノルアドレナリン増加作用				ドロキシドパ	内-2 内-1 内-1	細粒剤 カプセル剤 錠剤		ドブス細粒 ドブスカプセル ドブスOD錠	
			B型モノアミン酸化酵素阻害作用				セレギリン塩酸塩	内-1	錠剤		エフビー錠	
			B型モノアミン酸化酵素阻害作用+ ドパミン増加作用				ゾニサミド	内-1	錠剤		トレリーフ錠	
		パーキンソン症候群	カテコール-O-メチル基転移酵素 (COMT)阻害作用				エンタカボン	内-1	錠剤		コムタン錠	
			アデノシンA2A受容体拮抗作用				イストラデフィリン	内-1	錠剤		ノウリアスト錠	
			ドパミン受容体刺激作用	ドパミンD2受容体刺激作用		麦角アルカロイド系	フロモクリプチンメシル酸塩	内-1	錠剤		パーロデル	
							アマンタジン塩酸塩	内-2 内-2 内-1	散剤 細粒剤 錠剤		塩酸アマンタジン1% 散 シンメトレル細粒 シンメトレル錠	
			アセチルコリン受容体拮抗作用				フロメタジン塩酸塩	内-1	錠剤		ヒベルナ糖衣錠 ビレチア錠	
							ピロヘプチン塩酸塩	内-2 内-1	細粒剤 錠剤		トリモール細粒 トリモール錠	
							トリヘキシフェニジル塩酸塩	内-2 内-1	散剤 錠剤		アーテン散 アーテン錠	
							ビペリデン塩酸塩	内-2 内-2 内-1	散剤 細粒剤 錠剤		タスモリン散 アキネトン細粒 アキネトン錠	
							プロフェナミンヒベンズ酸塩/塩酸 塩	内-2 内-1	散剤 錠剤		パーキン糖衣錠/パー キン散	
							マザチコール塩酸塩	内-2 内-1	散剤 錠剤		ベントナ散 ベントナ錠	
							チアプリド塩酸塩	内-2 内-1	細粒剤 錠剤		グラマリール細粒 グラマリール錠	
			自発運動抑制作用									
2	抗パーキンソン剤	パーキンソン病	ドパミン増加作用				レボドパ	注-1	注射薬		ドバストン注射液	
			アセチルコリン受容体拮抗作用				フロメタジン塩酸塩	注-1	注射薬		ヒベルナ注	
							ビペリデン乳酸塩	注-1	注射薬		アキネトン注射液	

			ドバミンD1様及びD2様受容体刺激作用				アボモルヒネ塩酸塩	注－1	注射薬		アボカイン皮下注	
3	抗パーキンソン剤	パーキンソン病	ドバミン受容体刺激作用	ドバミンD2受容体刺激作用			ロチゴチン	外－5	貼付剤	1日1回	ニュープロパッチ	

117 抗うつ剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用 3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	抗うつ剤	うつ病・うつ状態	モノアミン再取り込み阻害作用			三環系	アミトリプチリン塩酸塩	内ー1	錠剤		トリプタノール錠	
							イミプラミン塩酸塩	内ー1	錠剤		トフラニール錠	
							トリミプラミンマレイン酸塩	内ー2	散剤		スルモンチール散	
								内ー1	錠剤		スルモンチール錠	
							クロミプラミン塩酸塩	内ー1	錠剤		アナフラニール錠	
							アモキサピン	内ー2	細粒剤 カプセル 剤		アモキサン細粒	
								内ー1			アモキサンカプセル	
							ロフェブラミン塩酸塩	内ー1	錠剤		アンブリット錠	
							ドスレピン塩酸塩	内ー1	錠剤		プロチアデン錠	
							ノルトリプチリン塩酸塩	内ー1	錠剤		ノリレン錠	
			α 2-アドレナリン受容体遮断作用 セロトニン受容体遮断作用			四環系	マプロチリン塩酸塩	内ー1	錠剤		ルジオミール錠	
							ミアンセリン塩酸塩	内ー1	錠剤		テトラミド錠	
			セロトニン再取り込み阻害作用			四環系	セチプチリンマレイン酸塩	内ー1	錠剤		デシプール錠	
							トラゾドン塩酸塩	内ー1	錠剤		レスリン錠	
			選択的セロトニンの再取り込み阻害作用			トリアゾロピリジン系	フルボキサミンマレイン酸塩	内ー1	錠剤		ルボックス錠	
							パロキセチン塩酸塩水和物	内ー1	錠剤		パキシル錠	
							セルトラリン塩酸塩	内ー1	錠剤		ジェイゾロフト錠	
							エスシタロプラムシュウ酸塩	内ー1	錠剤		レクサプロ錠	
			セロトニン、ノルアドレナリン再取り込み阻害作用				ミルナシブラン塩酸塩	内ー1	錠剤		トレドミン錠	
							デュロキセチン塩酸塩	内ー1	カプセル剤		サインバルタカプセル	
							ベンラファキシン塩酸塩	内ー1	カプセル剤		イフェクサーSRカプセル	
			ノルアドレナリン作動性 セロトニン作動性				ミルタザピン	内ー1	錠剤		レメロン錠	
			ドバミン受容体拮抗作用			ベンズアミド系	スルピリド	内ー1 内ー1 内ー2	錠剤 カプセル 剤 細粒剤		リフレックス錠	
			中枢神経興奮作用				ベモリン	内ー1	錠剤		ベタナミン錠	
2	抗うつ剤	うつ病・うつ状態	モノアミン再取り込み阻害作用			三環系	クロミプラミン塩酸塩	注ー1	注射薬		アナフラニール注射	

117 精神神経用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
I	精神神経用剤	統合失調症	抗ドパミン作用			フェノチアジン系	ペルフェナジン	内-2 内-1	散剤 錠剤		トリオミン散 トリオミン錠	
							ペルフェナジンマレイン酸塩	内-1	錠剤		ビーゼットシー糖衣錠	
							ペルフェナジンフェンジソ酸	内-2	散剤			
							プロクロルペラジンマレイン酸塩	内-1	錠剤		パストミン倍散 ノバミン錠	
							プロペリシアジン	内-2 内-1 内-4	細粒剤 錠剤 液剤		ニューレプチル細粒 ニューレプチル錠 ニューレプチル液	
							クロルプロマジン塩酸塩	内-1 内-1	錠剤 錠剤		ウインタミン錠 コントミン糖衣錠	
							クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩	内-2	細粒剤		ウインタミン細粒	
							レボメプロマジンマレイン酸塩	内-2 内-2 内-2 内-1	散剤 顆粒剤 細粒剤 錠剤		ヒルナミン散 プロクラジン顆粒 ヒルナミン細粒 ヒルナミン錠	
							フルフェナジンマレイン酸塩	内-2 内-1	散剤 錠剤		フルメジン500倍散 フルメジン糖衣錠	
						チエピン系	ゾテピン	内-2 内-1	細粒剤 錠剤		ロドピン細粒 ロドピン錠	
								内-2 内-1	顆粒剤 錠剤		クロフェクトン顆粒 クロフェクトン錠	
						イミノジベンジル系	クロカブラミン塩酸塩	内-2 内-1	顆粒剤 錠剤		クレミン顆粒 クレミン錠	
							モサブラミン塩酸塩	内-2 内-1	顆粒剤 錠剤		クレミン錠	
						インドール系	オキシベルチン	内-2 内-1	散剤 錠剤		ホーリット散 ホーリット錠	
						ブチロフェノン系	ハロペリドール	内-2 内-1 内-4	細粒剤 錠剤 液剤		セレネース細粒 セレネース錠 セレネース液	
								内-2 内-1	細粒剤 錠剤		オーラップ細粒 オーラップ錠	
							スピベロン	内-1	錠剤		スピロビタン錠	
								内-2 内-1	散剤 錠剤		プロビタン散 プロビタン錠	
							チミベロン	内-2 内-1	細粒剤 錠剤		トロベロンS トロベロン錠	
							ブロムペリドール	内-2 内-1	細粒剤 錠剤		インプロメン細粒 インプロメン錠	
						ベンザミド系	ネモナブリド	内-1	錠剤		エミレース錠	
							スルトブリド塩酸塩	内-2 内-1	細粒剤 錠剤		バルネチール細粒 バルネチール錠	
							スルピリド	内-1 内-1 内-2	錠剤 カプセル剤 細粒剤		ドグマチール錠	
			抗ドパミン作用／抗セロトニン作用			ベンズイソキサゾール系	リスベリドン	内-2 内-1 内-3	細粒剤 錠剤 内用液		リスバダール細粒 リスバダール錠 リスバダール内用液	
								内-1	錠剤		インヴェガ錠	
								内-1 内-2	錠剤 細粒剤		ジブレキサ錠 ジブレキサ細粒	
						ジベンゾチアゼピン系	クエチアピン fumarate	内-1 内-2	錠剤 細粒剤		セロクエル錠 セロクエル細粒	
								内-1	錠剤		ルーラン錠	
						ベンズイソチアゾール系	ペロスピロン塩酸塩水和物	内-1	錠剤			

							プロナンセリン	内-1 内-2	錠剤 散剤		ロナセン錠 ロナセン散	
						ジベンゾジアゼピン系	クロザピン	内-1	錠剤		クロザリル錠	
							アセナピンマレイン酸塩	内-5	舌下錠		シクレスト舌下錠	
			ドパミンD2受容体部分アゴニスト作用			キノリノン系	アリビプラゾール	内-2 内-1 内-3	散剤 錠剤 液剤		エビリファイ散 エビリファイ錠、OD錠 エビリファイ内用液	
			抗セロトニン作用／抗カテコールアミン作用				レセルピン	内-2 内-1	散剤 錠剤		レセルピン散 レセルピン錠 (アボブロン散・錠)	
		統合失調症の興奮状態、躁病、躁うつ病の躁状態	情動経路の誘発電位抑制作用				カルバマゼピン	内-2 内-1	細粒剤 錠剤		テグレート細粒 テグレート錠	
		躁病及び躁うつ病の躁状態	躁状態改善作用				炭酸リチウム	内-1	錠剤		リーマス	
		統合失調症等における鎮静催眠	配合剤(抗ドパミン作用＋催眠鎮静作用)			配合剤	クロルプロマジン塩酸塩／ プロメタジン塩酸塩／ フェノバルビタール	内-1	錠剤		ベゲタミン錠A、同錠B	
2	精神神経用剤	統合失調症	抗ドパミン作用			フェノチアジン系	ベルフェナジン塩酸塩	注-1	注射薬		ビーゼットシー注	
							クロルプロマジン塩酸塩	注-1	注射薬		コントミン筋注	
							レボメプロマジン塩酸塩	注-1	注射薬		ヒルナミン注	
							フルフェナジンデカン酸塩	注-1	注射薬		フルデカシン注	
						ブチロフェノン系	ハロペリドール	注-1	注射薬		セレネース注	
							ハロペリドールデカン酸エステル	注-1	注射薬		ハロマンス注 ネオペリドール注	
							チミベロン	注-1	注射薬		トロベロン注	
						ベンザミド系	スルピリド	注-1	注射薬		ドグマチール注	
			抗ドパミン作用／抗セロトニン作用			ベンズイソキサゾール系	リスベリドン	注-2	キット		リスバダール コンスタ筋注用	
							パリエリドンバルミチン酸エステル	注-2	キット		ゼブリオン水懸筋注シリンジ	
						チエノベンゾジアゼピン系	オランザピン	注-1	注射薬		ジブレキサ筋注用	
			ドパミンD2受容体部分アゴニスト作用			キノリノン系	アリビプラゾール水和物	注-1 注-2	注射薬 キット		エビリファイ持続性水懸筋注用 エビリファイ持続性水懸筋注用シリンジ	
			抗セロトニン作用／抗カテコールアミン作用				レセルピン	注-1	注射薬		レセルピン注 (アボブロン注)	

118 総合感冒剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
I	総合感冒剤	感冒若しくは上気道炎に伴う諸症状の改善	配合剤(感冒症状改善作用)			配合剤	サリチルアミド／アセトアミノフェン／無水カフェイン／クロルフェニラミンマレイン酸塩	内ー2	顆粒剤		ベレックス顆粒	
							サリチルアミド／アセトアミノフェン／無水カフェイン／クロルフェニラミンマレイン酸塩	内ー2	顆粒剤		ベレックス-1/6顆粒	
							サリチルアミド／アセトアミノフェン／無水カフェイン／メチレンジサリチル酸プロメタジン	内ー2 内ー1	顆粒剤 錠剤		PL顆粒 ピーエイ錠	
							サリチルアミド／アセトアミノフェン／無水カフェイン／メチレンジサリチル酸プロメタジン	内ー2	顆粒剤		幼児用PL顆粒	

119 その他の中枢神経系用薬

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	その他の中枢 神経用薬	脳梗塞後遺症に伴う意欲・自発性低下の改善	精神活動改善作用				アマンタジン塩酸塩	内ー2 内ー2 内ー1	散剤 細粒剤 錠剤		塩酸アマンタジン散-GE シンメトレル細粒 シンメトレル錠	
		高プロラクチン血症性排卵障害、高プロラクチン血症下垂体腺腫(外科的処置を必要としない場合に限り)、乳汁漏出症、産褥性乳汁分泌抑制	下垂体プロラクチン分泌細胞のドパミンD-2受容体刺激作用				テルグリド	内ー1	錠剤		テルロン錠	
		高度肥満症における食事療法及び運動療法の補助	摂食中枢抑制作用				マジンドール	内ー1	錠剤		サノレックス錠	
		筋萎縮性側索硬化症(ALS)の治療および病態進展の抑制	神経細胞保護作用				リルゾール	内ー1	錠剤		リルテック錠	
		アルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制	アセチルコリンエステラーゼ可逆的阻害作用				ドネペジル塩酸塩	内ー1 内ー2 内ー3	錠剤 細粒剤 ゼリー		アリセプト錠 アリセプト細粒 アリセプト内服ゼリー	
		軽度及び中等度のアルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制	アセチルコリンエステラーゼ可逆的阻害作用	ニコチン性アセチルコリン受容体A α S β リック増強作用			ガラタミン臭化水素酸塩	内ー1 内ー3	錠剤 液剤		レミニール錠 レミニール内用液	
		中等度及び高度アルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制	NMDA受容体拮抗作用				メマンテン塩酸塩	内ー1	錠剤		メマリー錠	
		次の疾患における頭痛・頭重、倦怠感、心悸亢進、発汗等の自律神経症状：自律神経失調症、頭部・頸部損傷、更年期障害・卵巣欠落症状	自律神経緊張不均衡改善作用				トフィソバム	内ー2 内ー1	細粒剤 錠剤		グラダキシ細粒 グラダキシ錠	
		脳梗塞後遺症に伴う攻撃的行動、精神興奮、徘徊、せん妄の改善	自発運動抑制作用	抗ドパミン作用			チアプリド塩酸塩	内ー2 内ー1	細粒剤 錠剤		グラマリール細粒 グラマリール錠	
		脊髄小脳変性症における運動失調の改善	自発運動亢進作用				タルチレリン水和物	内ー1	錠剤		セレジスト錠5	
		不眠症における入眠困難の改善	催眠作用	メラトニン受容体刺激作用			ラメルテオン	内ー1	錠剤		ロゼレム錠	
		不眠症		オレキシン受容体拮抗作用			スボレキサント	内ー1	錠剤		ベルソムラ錠	
		ナルコレプシーに伴う日中の過度の眠気	中枢神経興奮作用	覚醒作用			モダフィニル	内ー1	錠剤		モディオタール錠	
		ナルコレプシー	中枢神経興奮作用	覚醒作用			メチルフェニデート塩酸塩	内ー1	錠剤		リタリン錠	
		注意欠陥／多動性障害(AD/HD)	中枢神経興奮作用				メチルフェニデート塩酸塩	内ー1	錠剤		コンサータ錠	
			選択的ノルアドレナリン再取り込み阻害作用				アトモキセチン塩酸塩	内ー1 内ー3、4	カプセル剤 液剤		ストラテラカプセル ストラテラ内用液	
		次の患者におけるそう痒症の改善(既存治療で効果不十分な場合に限り)血液透析患者、慢性肝疾患患者		選択的オピオイド κ 受容体作用			ナルフラフィン塩酸塩	内ー1	カプセル剤		レミッチカプセル ノビコールカプセル	
		末梢性神経障害性疼痛	電位依存性カルシウムチャネルの $\alpha 2 \delta$ サブユニット結合によるカルシウム流入の抑制を介した興奮性神経伝達物質の遊離の抑制作用				ブレガバリン	内ー1	カプセル剤		リリカカプセル	
		中等度から高度の特発性レストレスレッグス症候群(下肢静止不能症候群)	電位依存性カルシウムチャネル阻害作用				ガバペンチン エナカルビル	内ー1	錠剤		レグナイト錠	
		ハンチントン病に伴う舞踏運動	モノアミン小胞トランスポーター2(VMAT2)の選択的阻害作用				テトラベナジン	内ー1	錠剤		コレアジン錠	
		アルコール依存症患者における断酒維持の補助	グルタミン酸作動性神経活動の抑制				アカンプロサートカルシウム	内ー1	錠剤		レグテクト錠	
2	その他の中枢 神経用薬	(1)頭部外傷、くも膜下出血に伴う昏睡、半昏睡を除く遷延性意識障害 (2)脊髄小脳変性症における運動失調の改善	意識障害改善作用／自発運動亢進作用				プロチレリン酒石酸塩	注ー1	注射薬		ヒルトニン注射液	
		脳梗塞急性期に伴う神経症候、日常生活動作障害、機能障害の改善	フリーラジカル消去作用				エダラボン	注ー1 注ー2	注射薬 キット		ラジカット注 ラジカット点滴静注 バッグ	

		多発性硬化症の再発予防及び身体的障害の進行抑制	α 4インテグリンと血管細胞接着分子(VCAM-1)の相互作用に対する阻害作用			ヒト型モノクローナル抗体	ナタリズマブ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		タイサブリ点滴静注	
3	その他の中枢神経用薬	軽度及び中等度のアルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制	アセチルコリンエステラーゼ阻害作用				リバスチグミン	外-5	貼付剤		イクセロンパッチ リバスタッチパッチ	

121 局所麻酔剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	局所麻酔剤	表面麻酔	神経遮断作用	活動電位伝導抑制作用			リドカイン塩酸塩	内-3 内-3	液剤 ゼリー		キシロカインビスカス	
2	局所麻酔剤	局所麻酔	神経遮断作用	活動電位伝導抑制作用			ブピバカイン塩酸塩	注-1	注射薬		マーカイン注射液	
							ロピバカイン塩酸塩水和物	注-1	注射薬			
							リドカイン塩酸塩	注-1	注射薬		キシロカイン注射液	
								注-2	キット			
							プロカイン塩酸塩	注-1	注射薬		塩酸プロカイン注射液	
							テトラカイン塩酸塩	注-1	注射薬		テトカイン「杏林」	
							メピバカイン塩酸塩	注-1	注射薬		塩酸メピバカイン注射液	
								注-2	キット			
							レボブピバカイン塩酸塩	注-1	注射薬		ポプスカイン注	
								注-2	キット		ポプスカイン注シリン	
3	局所麻酔剤	表面麻酔	神経遮断作用	活動電位伝導抑制作用		配合剤	リドカイン塩酸塩/アドレナリン	注-1	注射薬		キシロカイン注射液	
		脊椎麻酔	神経遮断作用	活動電位伝導抑制作用			ブピバカイン塩酸塩	注-1	注射薬		ネオペルカミンS	
							ジブカイン塩酸塩	注-1	注射薬		ペルカミンエス注脊麻	
							リドカイン塩酸塩	注-1	注射薬		キシロカイン注射液	
								注-2	キット			
							テトラカイン塩酸塩	注-1	注射薬		テトカイン「杏林」	
							プロカイン塩酸塩	外-1	原末			
							ジブカイン塩酸塩	外-1	原末			
							リドカイン	外-2 外-5	噴霧剤 貼付剤		キシロカインポンプス プレー ペンレス	
							リドカイン塩酸塩	外-1 外-1	液剤 ゼリー		キシロカイン液 キシロカインゼリー	
		皮膚レーザー照射療法時の疼痛緩和 静脈留置針穿刺時の疼痛緩和	神経遮断作用	活動電位伝導抑制作用			パラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミノエチル塩酸塩	外-1	末剤		テーカイン原末	
							リドカイン/プロピトカイン	外-1	クリーム		エムラクリーム	
							リドカイン	外-5	貼付剤		ペンレス	

122 骨格筋弛緩剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分名	剤形区分	剤形	用法	主な商品名	線引き
1	骨格筋弛緩剤	運動器疾患に伴う有痛性痙縮／筋緊張状態、 痙性麻痺	脊髄反射抑制作用(多シナプ ス反射抑制)				クロルフェネシカル バミン酸塩エステル	内ー1	錠剤		リンラキサー錠	
							クロルゾキサゾン	内ー1	錠剤		フラメンコ錠	
							ブリジノールメシル酸 塩	内ー1	錠剤		コンラックス錠	
							メカルバモール	内ー2	顆粒剤		ロバキシシ	
							アフロクアロン	内ー1	錠剤		アロフト	
							エベリゾン塩酸塩	内ー2	顆粒剤		ミオナール顆粒	
								内ー1	錠剤		ミオナール錠	
							チザニジン塩酸塩	内ー2	顆粒剤		テルネリン顆粒	
								内ー1	錠剤		テルネリン錠	
		痙性麻痺	脊髄反射抑制作用(単シナプ ス反射抑制)	GABA受容体親和作用			バクロフェン	内ー1	錠剤		リオレサール錠	
		悪性症候群	筋小胞体からのCaイオン遊 離抑制作用				ダントロレンナトリウ ム水和物	内ー1	カプセル剤		ダントリウムカプセル	
2	骨格筋弛緩剤	麻酔時の筋弛緩、気管内挿管時の筋弛緩	神経終板に対する脱分極作 用				スキサメニウム塩 化物水和物	注ー1	注射薬		レラキシシ	
			神経筋接合部遮断作用				ベクロニウム臭化物	注ー1	注射薬		マスキュラックス静注 用	
		運動器疾患に伴う有痛性痙縮					ロクロニウム臭化物	注ー1	注射薬		エスラックス静注	
							ブリジノールメシル酸 塩	注ー1	注射薬		コンラックス注	
		麻酔時における悪性高熱症、悪性症候群	筋小胞体からのCaイオン遊 離抑制作用				ダントロレンナトリウ ム	注ー1	注射薬		ダントリウム注射用	
		眼瞼けいれん、片側顔面けいれん、痙性斜頸	アセチルコリン放出抑制作用				A型ボツリヌス毒素	注ー1	注射薬		ボトックス注100	
		脳脊髄疾患に由来する重度の痙性麻痺	脊髄反射抑制作用(単シナプ ス反射抑制)	GABA受容体親和作用			B型ボツリヌス毒素	注ー1	注射薬		ナーブロック筋注	
							バクロフェン	注ー1	注射薬		ギャバロン随注	

123 自律神経剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分名	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	自律神経剤 (β 受容体拮 抗薬を除く)	慢性胃炎等の消化器機能異常	消化管運動亢進作用	アセチルコリン受容体刺激作用		四級アンモニウム塩	アクラトニウムナパ ジシル酸塩	内ー1	カプセル剤		アボピスカプセル50	
							ベタネコール塩化物	内ー2	散剤		ベサコリン散	
		重症筋無力症	神経筋伝達障害改善作用	コリンエステラーゼ阻害作用		四級アンモニウム	ジスチグミン臭化物	内ー1	錠剤		ウブレチド錠	
							ピリドスチグミン臭化 物	内ー1	錠剤		メスチノン「ロシュ」錠	
							アンペニウム塩化 物	内ー1	錠剤		マイテラーゼ	
		慢性胃炎等の消化器機能異常, 重症筋無力 症	神経筋伝達障害改善作用	コリンエステラーゼ阻害作用			ネオスチグミン臭化 物	内ー2	散剤		ワゴスチグミン散 (0.5%)	
2	自律神経剤 (β 受容体拮 抗薬を除く)	麻酔後の腸管麻痺／慢性胃炎等の消化器機 能異常	消化管運動亢進作用	アセチルコリン受容体刺激作用			アセチルコリン塩化 物	注ー1	注射薬		オピソート注射用	
				副交感神経刺激作用			カルニチン塩化物	注ー1	注射薬		エントミン注	
		非脱分極性筋弛緩剤による遷延性呼吸抑制 に対する拮抗	神経筋伝達障害改善作用	コリンエステラーゼ阻害作用			ネオスチグミンメチ ル硫酸塩	注ー1	注射薬		ワゴスチグミン注	
		非脱分極性筋弛緩剤の作用の拮抗	配合剤(神経筋伝達障害改 善作用)	コリンエステラーゼ阻害作 用・副交感神経遮断作用		配合剤	ネオスチグミンメチ ル硫酸塩/アトロピン 硫酸塩水和物	注ー2	キット		アトワゴリバース静 注	

124 鎮けい剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	鎮痙剤	胃・十二指腸等の腹部平滑筋のけいれん、運動亢進および疼痛／過敏性腸症候群	消化器・泌尿器・子宮等の平滑筋運動亢進抑制およびれん縮緩解作用	アセチルコリン拮抗作用（ムスカリン受容体拮抗作用）			アトロピン硫酸塩	内-2	末剤		硫酸アトロピン	
							ロートエキス	内-2	散剤		ロートエキス散	
							ブチルスコポラミン臭化物	内-1	錠剤		ブスコパン錠	
							N-メチルスコポラミンメチル硫酸	内-1	錠剤		ダイピン錠	
							プロピウム臭化物	内-2	顆粒剤		コリオバン顆粒	
								内-1	錠剤		コリオバン錠	
								内-1	カプセル剤		コリオバンカプセル	
		過敏性腸症候群	配合剤（消化器・泌尿器・子宮等の平滑筋運動亢進抑制およびれん縮緩解作用）	アセチルコリン拮抗作用＋鎮静作用		配合剤	ピペリドレート塩酸塩	内-1	錠剤		ダクチル錠	
							チメジウム臭化物	内-2 内-1 内-1	細粒剤 錠剤 カプセル剤		セスデン細粒 臭化チメジウム 30mg錠 セスデン	
							チキジウム臭化物	内-2 内-1	顆粒剤 カプセル剤		チアトン顆粒 チアトン	
		胃・十二指腸等の腹部平滑筋のけいれん、運動亢進および疼痛	消化器・泌尿器・子宮等の平滑筋運動亢進抑制およびれん縮緩解作用	ホスホジエステラーゼ阻害作用			ババベリン塩酸塩	内-2 内-2	末剤 散剤		塩酸ババベリン 塩酸ババベリン散	
							フロプロピオン	内-1 内-1	錠剤 カプセル剤		コスパン錠 コスパンカプセル	
		子宮収縮の抑制	子宮平滑筋弛緩作用	COMT(catechol-O methyltransferase)阻害作用 ／Oddi括約筋弛緩作用			メベンゾラート臭化物	内-1	錠剤		トランコリン錠	
							メベンゾラート臭化物／フェノバルビタール	内-1	錠剤		トランコロンP錠	
		子宮収縮の抑制	子宮平滑筋弛緩作用	β 受容体刺激作用			イソクスプリン塩酸塩	内-1	錠剤		ズファジラン錠	
		胃・十二指腸等の腹部平滑筋のけいれんおよび疼痛（麻酔前投薬の効能を含む。）	消化器・泌尿器・子宮等の平滑筋運動亢進抑制およびれん縮緩解作用	アセチルコリン拮抗作用（ムスカリン受容体拮抗作用）			アトロピン硫酸塩	注-1 注-2	注射薬 キット		硫酸アトロピン	
							スコポラミン臭化水素酸塩	注-1	注射薬		ハイスコ皮下注	
							ブチルスコポラミン臭化物	注-1 注-2	注射薬 キット		ブスコパン注射液	
							チメジウム臭化物	注-1	注射薬		セスデン注射液	
		子痙	配合剤（骨格筋弛緩作用）	Mgによるアセチルコリン放出抑制作用		配合剤	ババベリン塩酸塩	注-1	注射薬		塩酸ババベリン注射液	
							硫酸マグネシウム／ブドウ糖	注-1	注射薬		マグネゾール	

129 その他の末梢神経系用薬

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分名	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
I	その他の末梢 神経系用薬	トランスサイレチン型家族性アミロイドポリ ニューロパチーの末梢神経障害の進行抑制	トランスサイレチン(TTR)4量 体の乖離及び変性の抑制				タファミジスメグルミ ン	内-1	カプセル 剤		ビンダケルカプセル	

131 眼科用剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	眼科用剤	網膜色素変性症	暗順応改善作用	好氣的代謝促進作用		カロチノイド	ヘレニエン	内－1	錠剤	1日10～20mg2～4分服	アダブチノール	
2	眼科用剤	中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性症	細胞内呼吸障害作用	レーザー光照射による活性酸素生成作用		光感受性物質	ベルテボルフィン	注－1	注射薬	静脈内投与	ビスタイン静注用15mg	
			VEGF ₁₆₅ 選択的活性阻害作用			ポリエチレングリコールを結合させたオリゴヌクレオチド	ベガブタニブナトリウム	注－2	注射薬（キット製品）	硝子体内注射	マクジェン硝子体内注射用キット	
			VEGF阻害作用			ヒト型マウス抗ヒトVEGFモノクローナル抗体のFab断片	ラニズマブ（遺伝子組換え）	注－2	注射薬（キット製品）	硝子体内注射	ルセンチス硝子体内注射液	
		硝子体手術時の硝子体可視化	難水溶性等の物理学的性質に基づく硝子体可視化作用		遺伝子組換え融合糖蛋白質	アフリベルセプト（遺伝子組換え）	注－1	注射薬	硝子体内注射	アイリーア硝子体内注射液		
3	眼科用剤	結膜炎/角膜炎等	主として一般細菌に作用するもの	細胞壁合成阻害作用		セフェム系	セフメノキシム塩酸塩	外－3	点眼剤	溶解後1回1～2滴、1日4回	ベストロン点眼用	
				核酸（DNA）合成阻害作用		ニューキノロン系	レボフロキサシン	外－3	点眼剤	1回1滴、1日3回	クラビット点眼液	
							ノルフロキサシン	外－3	点眼剤	1回1滴、1日3回	ノフロ点眼液	
							ロメフロキサシン塩酸塩	外－3	点眼剤	1回1滴、1日3回	ロメフロ点眼液	
							オフロキサシン	外－3	眼軟膏	1日3回、適量塗布	タリビット眼軟膏	
								点眼剤	1回1滴、1日3回	タリビット点眼液		
							ガチフロキサシン水和物	外－3	点眼剤	1回1滴、1日3回（眼科周術期の無菌化療法の手術前は1回1滴、1日5回）	ガチフロ点眼液	
							トスフロキサシントシル酸塩	外－3	点眼剤	1回1滴、1日3回	オゼックス点眼液／トスフロ点眼液	
							モキシフロキサシン塩酸塩	外－3	点眼剤	1回1滴、1日3回（眼科周術期の無菌化療法の手術前は1回1滴、1日5回）	ベガモックス点眼液	
				蛋白合成阻害作用		アミノグリコシド系	ゲンタマイシン硫酸塩	外－3	点眼剤	1回1～2滴、1日3～4回	ゲンタシン点眼液	
							トラブライシン	外－3	点眼剤	1回1～2滴、1日4～5回	トラブライ点眼液	
							ジベカシン硫酸塩	外－3	点眼剤	1回2滴、1日4回	バニマイシン点眼液	
				クロラムフェニコール系	クロラムフェニコール	外－3	点眼剤	1日1～数回、適量	クロラムフェニコール点眼液T			
				結膜粘膜表層細胞新生促進作用/毛細管透過性抑制作用/細菌プロテアーゼ阻害作用			硫酸亜鉛	外－3	点眼剤	1回1～2滴、1日3～5回	オフサリンP	
			配合剤（主として一般細菌に作用するもの）	蛋白合成阻害＋細胞膜機能障害作用）		配合剤	クロラムフェニコール／コリスチンメタンサルホン酸ナトリウム	外－3	点眼剤	1回2～3滴、1日4～5回	コリマイC点眼液	
							エリスロマイシン／コリスチン	外－3	眼軟膏	1日数回	エコリシン眼軟膏	
				蛋白合成阻害＋抗炎症作用）		配合剤	フラジオマイシン硫酸塩／メチルプレドニゾロン	外－3	眼軟膏	1日1～数回、適量	ネオメドロールEE軟膏	
							フラジオマイシン硫酸塩／リン酸ベタメタゾンナトリウム	外－3	眼軟膏	1日1～数回、適量	眼・耳科用リンデロンA軟膏	
								点眼剤	1回1～2滴、1日1～数回点眼	眼・耳科用リンデロンA液		

	ウイルスに作用するもの 主として真菌に作用するもの	ヘルペスウイルス 真菌	核酸(DNA)合成阻害作用 抗真菌作用		アシクロビル ピマリシン	外-3 外-3	眼軟膏 眼軟膏	1日5回、適量 1回適量、1日4～5回	ゾビラックス眼軟膏 ピマリシン眼軟膏	
新生児臍漏眼の予防	殺菌作用	組織蛋白凝固沈殿作用			硝酸銀	外-3	点眼剤	1回1～2滴、1日6～8回	ピマリシン点眼液	
慢性結膜炎	涙液分泌抑制	結膜/角膜神経麻痺作用、 三叉神経反射弓一過性遮断作用			オキシブプロカイン塩酸塩	外-3	点眼剤	クレーデ氏法により点眼。新生児に対し点眼後生理食塩液で洗浄。 1回1～2滴、1日数回	ラクリミン点眼液	
アレルギー性結膜炎	抗炎症作用	γ-カルシトリエーテ遊離抑制作用	抗ヒスタミン作用/抗ロコトリエン作用		クロモグリク酸ナトリウム	外-3	点眼剤	1回1～2滴、1日4回	インタール点眼液	
					ベミロラストカリウム	外-3	点眼剤	1回1滴、1日2回	アレギサル点眼液	
					トラニラスト	外-3	点眼剤	1回1～2滴、1日4回	リザベン点眼液	
					アシタザノラスト水和物	外-3	点眼剤	1回1～2滴、1日4回	ゼベリン点眼液	
					アンレキサノクス	外-3	点眼剤	1回1～2滴、1日4回	エリックス点眼液	
				抗ロコトリエン作用	イブジラスト	外-3	点眼剤	1回1～2滴、1日4回	ケタス点眼液	
		γ-カルシトリエーテ受容体拮抗作用	抗ヒスタミン作用		ケトチフェンフマル酸塩	外-3	点眼剤	1回1～2滴、1日4回	ザジテン点眼液	
					オロパタジン塩酸塩	外-3	点眼剤	1回1～2滴、1日4回	パタノール点眼液	
					レボカバステチン塩酸塩	外-3	点眼剤	1回1～2滴、1日4回	リボステチン点眼液	
					エピナスチン塩酸塩	外-3	点眼剤	1回1滴、1日4回	アレジオン点眼液	
		角膜上皮再生促進作用			グリチルリチン酸二カリウム	外-3	点眼剤	1回2～3滴、1日5～6回	ノイボルミチン	
					アズレン	外-3	点眼剤	1回1～2滴、1日3～5回	アゾテシン点眼液	
春期カタル	免疫抑制作用	主にT細胞の分化・増殖抑制、G0→G1移行期に作用	カルシニューリンの活性化を阻害し、インターロイキン2（IL-2）等のサイトカイン産生抑制		シクロスポリン	外-3	点眼剤	1回1滴、1日3回点眼する	パピロックミニ点眼液0.1%	
					タクロリムス水和物	外-3	点眼剤	1回1滴、1日2回点眼する	タリムス点眼液	
慢性結膜炎	抗炎症作用	角膜上皮再生作用			リゾチーム塩酸塩	外-3	点眼剤	1回1～2滴、1日3～6回	ムコゾーム点眼液	
術後炎症防止等	抗炎症作用	プロスタグランジン生合成抑制作用	(非ステロイド作用)	フェニル酢酸系	ジクロフェナクナトリウム	外-3	点眼剤	眼手術前4回、眼手術後1日3回、1回1滴	ジクロード点眼液	
内眼部手術における術後炎症	抗炎症作用	プロスタグランジン生合成抑制作用	(非ステロイド作用)	アリール酸系	ネバフェナク	外-3	点眼剤	眼手術前日から1回1滴1日3回点眼。手術日に限り、術前3回術後1回点眼。	ネバナック点眼液	
結膜炎等の炎症疾患の対症療法	抗炎症作用	プロスタグランジン生合成抑制作用	(非ステロイド作用)	アリール酢酸系	ブラノプロフェン	外-3	点眼剤	1回1～2滴、1日4回	ニフラン点眼液	
					ブロムフェナクナトリウム水和物	外-3	点眼剤	1回1～2滴、1日2回	プロナック点眼液	
		白血球遊走抑制作用/虹彩毛様体腫脹抑制作用	(ステロイド作用)	ステロイド	デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム	外-3	点眼剤	1回1～2滴、1日3～4回	DMゾロン点眼液	
					デキサメタゾン	外-3	眼軟膏		サンテゾーン0.05%眼軟膏	

					リン酸デキサメタゾンナトリウム	外－３	点眼剤	１日１～３回、 適量	点眼・点耳用デカドロン液	
					リン酸ベタメタゾンナトリウム	外－３	点眼剤	１回１～２滴、 １日３～４回	リンデロン液	
					酢酸ヒドロコルチゾン	外－３	点眼剤	１回１～２滴、 １日３～４回	日点・ＨＣゾロン点眼液	
					酢酸ブレドニゾン	外－３	点眼剤	１回１～２滴、 １日３～４回	ブレドニン眼軟膏	
						外－３	点眼剤	１回１～２滴、 １日３～４回	日点・ＰＳゾロン点眼液	
					フルオロメトロン	外－３	点眼剤	１回１～２滴、 １日数回宛	フルメトロン点眼液	
ビタミンＢ２欠乏、代謝障害 関与の角膜炎等	角膜組織呼吸亢進作用	組織呼吸関与補酵素の酸 素消費能増加作用		補酵素型ビタミン Ｂ２	フラビンアデニンジヌクレ オチド	外－３	眼軟膏	１回１～２滴、 １日数回	フラビタン眼軟膏	
							点眼剤	１回１～２滴、 １日２～４回	フラビタン点眼液	
角膜上皮障害	角膜創傷治癒促進作用	上皮細胞接着・進展促進 作用（保水性亢進作用）	フィブリン結合作用		ヒアルロン酸ナトリウム	外－３	点眼剤	１回１滴、１日 ５～６回	ヒアレイン	
									ヒアレインミニ	
角膜表層の保護	角膜保護作用/乾燥抑制作 用/透明性保持作用	結膜嚢内滞留性亢進作用			コンドロイチン硫酸ナトリ ウム	外－３	点眼剤	１回１～２滴、 １日２～４回	コンドロ点眼液	
	配合剤（角膜保護作用/乾 燥抑制作用/透明性保持作 用＋ビタミンＢ２補給作用）	結膜嚢内滞留性亢進作用 ＋角膜へのFDA取込促進作 用		配合剤	フラビンアデニンジヌクレ オチドナトリウム／コン ドロイチン硫酸ナトリ ウム	外－３	点眼剤	１回１～２滴、 １日３～６回	ムコファジン点眼液	
ドライアイ	ムチン/水分分泌促進作用 ムチン産生促進作用	P2Y2受容体刺激作用			ジクアホソルナトリウム	外－３	点眼剤	１日６回	ジクアス点眼液	
					レバミピド	外－３	点眼剤	１回１滴、１日 ４回点眼	ムコスタ点眼液UD	
表在性充血	末梢血管収縮作用/充血抑 制作用	血管平滑筋α受容体刺激 作用			ナファゾリン硝酸塩	外－３	点眼剤	１回１～２滴、 １日２～３回	眼科用ブリピナ	
診断/治療を目的とする散 瞳/調節麻痺	散瞳作用/調節麻痺作用	毛様体筋麻痺作用			アトロピン硫酸塩	外－３	眼軟膏	１日１～３回適 量結膜のう	リュウアト１％眼軟膏	
							点眼剤	１回１～２滴、 １日１～３回	日点アトロピン点眼液１％	
					トロピカミド	外－３	点眼剤	（散瞳）１回１～ ２滴、１日１ 回。（調節麻痺） ３～５分おきに ２～３回、１回 １滴	ミドリンM	
		調節麻痺作用			シクロペントラート塩酸 塩	外－３	点眼剤	１日１回１滴又 は１滴点眼後５ ～１０分さらに １滴	サイブレジン１％点眼液	
		副交感神経遮断作用/散瞳 作用/毛様筋麻痺作用			ホマトロビン臭化水素酸 塩	外－３	点眼用末 剤			
		瞳孔散大筋収縮/交感神経 α１受容体刺激作用		配合剤	フェニレフリン塩酸塩	外－３	点眼剤	１回１～２滴	ネオシネジンコーワ５％点 眼液	
					トロピカミド／フェニレ フリン塩酸塩	外－３	点眼剤		ミドリンP点眼液	
洗眼、殺菌・消毒	局所消毒作用				ポリビニルアルコールヨ ウ素液	外－３	点眼剤		PA・ヨード液	
					ホウ酸	外－３	点眼用末 剤	〔眼軟膏〕１日 １～４回。〔点 眼液〕１回１～ ２滴、１日３～ ６回	ホウ酸	
					ホウ砂	外－３	点眼用末 剤	１回１～２滴、 １日３～６回	ホウ砂	
涙液の補充				正常涙液類似液	ホウ酸／無機塩類	外－３	点眼剤	１回１～２滴、 １日５～６回	人工涙液マイティア	
緑内障	房水産生抑制作用/房水流 出促進作用	アドレナリン受容体刺激 作用		エピネフリンブ ロドラッグ	ジベペフリン塩酸塩	外－３	点眼剤	溶解後１回１ 滴、１日１～２ 回	ビバレフリン点眼液	
	房水産生抑制作用/房水流 出促進作用	アドレナリンα ₂ 受容体刺 激作用			グリモニジン酒石酸塩	外－３	点眼剤	１回１滴、１日 ２回	アイファガン点眼液	
	配合剤（房水産生抑制作 用/房水流出促進作用）	フロスタグランジン受容 体刺激作用/交感神経β受 容体遮断作用		配合剤	ラタノプロスト／チモ ロールマレイン酸塩	外－３	点眼剤	１回１滴、１日 １回	ザラカム配合点眼液	

						トラボプロスト／チモ ロールマレイン酸塩	外－3	点眼剤	1回1滴、1日 1回	デュオトラバ配合点眼液	
						タフルプロスト／チモ ロールマレイン酸塩	外－3	点眼剤	1回1滴、1日 1回	タブコム配合点眼液	
						カルテオロール塩酸塩／ ラタノプロスト	外－3	点眼剤	1回1滴、1日 1回	ミケルナ配合点眼液	
			房水流出促進作用	交感神経 α 1受容体遮断作 用		ブナゾシン塩酸塩	外－3	点眼剤	1回1滴、1日 2回	デタントール0.01%点眼 液	
				プロスタグランジン受容 体刺激作用		代謝型プロスタ グランジン系	外－3	点眼剤	1回1滴、1日 2回	レスキュラ点眼液	
						ラタノプロスト	外－3	点眼剤	1回1滴、1日 1回	キサラタン点眼液	
						トラボプロスト	外－3	点眼剤	1回1滴、1日 1回	トラバタンズ点眼液	
						タフルプロスト	外－3	点眼剤	1回1滴、1日 1回	タブロス点眼液	
						ビマトプロスト	外－3	点眼剤	1回1滴、1日 1回	ルミガン点眼液	
				Rh oキナーゼ阻害作用		リバスジル塩酸塩水和物	外－3	点眼剤	1回1滴、1日 2回	グラナテック点眼液	
			房水産生抑制作用	交感神経 β 受容体遮断作 用		ニブラジロール	外－3	点眼剤	1回1滴、1日 2回	ハイバジールコーワ点眼液	
						レボブノロール塩酸塩	外－3	点眼剤	1回1滴、1日 1回	ミロル点眼液	
						カルテオロール塩酸塩	外－3	点眼剤	1回1滴、1日 2回	ミケラン点眼液	
						チモロールマレイン酸塩	外－3	点眼剤	1回1滴、1日 2回	チモブトール点眼液	
									1回1滴、1日 1回	チモブトールXE	
										リズモンTG点眼液	
						ベタキソロール塩酸塩	外－3	点眼剤	1回1滴、1日 2回	ベトブティック0.5%点眼 液	
				炭酸脱水酵素阻害作用 (Na+能動輸送抑制作用)		ドルゾラミド塩酸塩	外－3	点眼剤	1回1滴、1日 3回	トルソプト点眼液	
						布林ゾラミド	外－3	点眼剤	1回1滴、1日 2回	エイゾプト懸濁性点眼液	
			配合剤（房水産生抑制作 用）	炭酸脱水酵素阻害作用／ 交感神経 β 受容体遮断作 用		配合剤	外－3	点眼剤	1回1滴、1日 2回	コソプト配合点眼液	
										アゾルガ配合懸濁性点眼液	
			縮瞳作用/房水流出増加作 用	可逆性抗コリンエステ ラーゼ阻害作用		布林ゾラミド／チモ ロールマレイン酸塩	外－3	点眼剤	1回1滴、1日 2回	ウブレチド点眼液	
				副交感神経刺激作用		ジスチグミン臭化物	外－3	点眼剤	1回1滴、1日 1～2回	サンピロ	
									1回1～2滴、 1日3～5回	塩酸ピロカルピン	
		初期老人性白内障	水晶体タンパク変性抑制 作用	キ/イ'物質競合的阻害作用		ピレノキシシン	外－3	点眼剤	溶解後1回1～ 2滴、1日3～ 5回	カタリンK点眼用	
			角膜障害軽減・回復促進 作用	角膜コラーゲン合成促進/ コラーゼ活性阻止作用		グルタチオン	外－3	点眼剤	溶解後1回1～ 2滴、1日3～ 5回	タチオン点眼用	
		調節性眼精疲労における 微動調節の改善	毛様体筋賦活作用	網膜酸素消費量増強作用		ビタミンB12	外－3	点眼剤	1回1～2滴、 1日3～5回	サンコバ点眼液	
		眼内レンズ挿入術・全層角 膜移植術における手術補 助	粘弾性、保水性等潤滑作用 /前房形成作用/角膜内皮 保護作用	前房形成・保持作用/角膜 内皮保護作用			外－3	注入液		ヒーロン	
			配合剤（粘弾性、保水性等 潤滑作用/前房形成作用/ 角膜内皮保護作用）			配合剤	外－3	注入液		ビスコート	
		レーザー術後眼圧上昇防 止	房水産生抑制作用	毛様体上皮細胞 α 2受容体 刺激作用			外－3	点眼剤	レーザー照射1 時間前、照射直 後1滴ずつ	アイオビジン1%	
		眼科領域における表面麻 酔	涙液分泌抑制作用	結膜/角膜神経麻痺作用、 三叉神経反射弓の一過性 遮断作用		オキシブプロカイン塩酸 塩	外－3	点眼剤	1～4滴	ベノキシール0.4%液	
		眼科手術時の眼灌流/洗浄	角膜保護作用	角膜内皮障害防止作用		オキシグルタチオン	外－3	点眼剤		ビーエスエスプラス	

			配合剤（洗浄作用）	眼内灌流作用		配合剤	ブドウ糖／無機塩類	外－3	点眼剤		オベガードMA	
			配合剤（調節機能改善作用）			配合剤	ネオスチグミン／無機塩類	外－3	点眼剤	1回2～3滴、 1日4回	ミオピン点眼液	
	主として一般細菌に作用するもの	MRSAに作用	細胞壁合成阻害作用			ゲルベブタイト系	バンコマイシン塩酸塩	外－3	眼軟膏		バンコマイシン眼軟膏	

1 3 2 耳鼻科用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	耳鼻科用剤	中耳/中枢障害による耳鳴	配合剤(内耳循環血量増加作用＋内耳血管カウム騒音刺激による変動予防作用)	蝸牛放射状動脈枝血流速度上昇作用＋内耳電解質への作用		配合剤	ババベリン塩酸塩/ニコチン酸アミド	内－1	錠剤	1錠	ストミンA錠	
		慢性副鼻腔炎	病的副鼻腔分泌の正常化作用	線毛運動亢進作用			塩酸アンブロキシール	内－1 内－2	錠剤 細粒剤		ムコサール錠 アンブロン細粒	
3	耳鼻科用剤	アレルギー性鼻炎	ケミカルメディエータ遊離抑制作用	抗ヒスタミン作用、抗ロイコトリエン作用			クロモグリク酸ナトリウム	外－4	点鼻液		インターール点鼻液	
			ケミカルメディエータ受容体拮抗作用	抗ヒスタミン作用			アンレキサノクス	外－4	点鼻液		ソルファ点鼻液	
			抗炎症作用	血管収縮作用		ステロイド	ケトチフェンフマル酸塩	外－4	点鼻液		ザジテン点鼻液	
							レボカバステチン塩酸塩	外－4	点鼻液		リボスチン点鼻液	
							プロピオン酸ベクロメタゾン	外－4	吸入剤		リノコート/ベコナーゼ/アルデシン	
							プロピオン酸フルチカゾン	外－4	点鼻液		フルナーゼ点鼻液	
		諸疾患の充血・うっ血	充血抑制作用	末梢血管収縮作用	交感神経α2受容体刺激作用		フルチカゾンフランカルボン酸エステル	外－4	点鼻液		アラミスト点鼻液	
							モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	外－4	点鼻液		ナゾネックス点鼻	
							デキサメタゾンシベシル酸エステル	外－4	耳鼻科用 噴霧剤		エリザスカプセル 外用	
							オキシメタゾリン塩酸塩	外－4	点鼻液		ナシピン	
							トラマゾリン塩酸塩	外－4	点鼻液		トーク	
							テトラヒドロゾリン塩酸塩	外－4	点鼻液		ABCSプレー	
		外耳炎、中耳炎	主として一般細菌に作用するもの	主としてグラム陽性菌(G(+))/グラム陰性菌(G(-))	細胞壁合成阻害作用	セフェム系	アドレナリン	外－4	点鼻液		ホスミン液	
							ナファゾリン硝酸塩	外－4	点鼻液		0.05%プリピナ液 「チバ」	
							配合剤	配合剤	配合剤	配合剤	配合剤	配合剤
							テトラヒドロゾリン塩酸塩/ブレドニゾロン	外－4	点鼻液		コールドタイジン	
		M R S A の除菌	蛋白合成阻害作用	イソイソール-tRNA合成酵素阻害作用/イソイソAMP複合体生成阻害作用			セフメノキシム塩酸塩	外－4	耳鼻科用 液		ベストロン耳鼻科 用	
							ホスホマイシン系	ホスホマイシンナトリウム	外－4	耳科用液	耳科用ホスミンシ	
							ニューキノロン系	オフロキサシン	外－4	耳科用液	タリビッド耳科用液	
							クロラムフェニコール系	クロラムフェニコール	外－4	耳科用液	クロロマイセチン 耳科用	
		M R S A の除菌	蛋白合成阻害作用	イソイソール-tRNA合成酵素阻害作用/イソイソAMP複合体生成阻害作用			ムピロシカルシウム水和物	外－1	軟膏剤		バクトバン	

1 3 3 鎮暈剤

内注 外区	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	鎮暈剤	メニエル症候群等に伴うめまい /内耳障害に基づくめまい	自律神経調整作用	迷路機能亢進抑制作用	抗ヒスタミン作用	ジフェニルメタン系	ジメンヒドリナート	内-1	錠剤		ドラマミン	
			配合剤(自律神経調整作用)			配合剤	ジフェンヒドラミン/ジプロフィリン	内-1	錠剤		トラベルミン	
			循環改善作用	内耳血流量増加作用	脳血管拡張作用/ヒスタミン類似作用		ベタヒスチンメシル酸塩	内-1	錠剤		メリスロン	
				交感神経β2受容体刺激作用	内耳血流改善作用/ヒスタミン遊離抑制作用	カテコラミン類	dI-イソプレナリン塩酸塩	内-1	カプセル剤		イソメニール	
				椎骨脳底動脈の循環改善作用			ジフェニドール塩酸塩	内-1 内-2	錠剤 顆粒剤		セファドール	
2	鎮暈剤	メニエル症候群等に伴うめまい	配合剤(自律神経調整作用)	迷路機能亢進抑制作用	抗ヒスタミン作用	配合剤	ジフェンヒドラミン/ジプロフィリン	注-1	注射剤		トラベルミン	

211 強心剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品	線引き	
1	強心剤	心不全	心拍出量増加作用／心拍数減少作用	Na/Kポンプ遮断作用		強心配糖体	ジギトキシン	内-1	錠剤				
							ジゴキシン	内-2 内-1 内-3	散剤 錠剤 液剤		ジゴシン散 ジゴキシン錠 ジゴシンエリキシル		
							メチルジゴキシン	内-1	錠剤		ラニラビッド錠		
							ラナトシドC	内-1	錠剤		ジギラノゲンC錠		
			心拍出量増加作用	ホスホジエステラーゼ阻害作用		キサンチン系	アミノフィリン	内-2 内-1	末剤 錠剤		ネオフィリン末 ネオフィリン錠		
							プロキシフィリン	内-2 内-1	末剤 錠剤		モノフィリン モノフィリン錠		
			心拍出量増加作用／心拍数増加	β受容体刺激作用			デノバミン	内-2 内-1	細粒剤 錠剤		カルグート細粒 カルグート錠5		
							dl-イソプロレナリン塩酸塩	内-1	錠剤		プロタノールS錠		
			心拍出量増加作用／腎血流量増加作用	β受容体刺激作用		カテコールアミン系	ドカルバミン	内-2	顆粒剤		タナドーバ顆粒		
心拍出量増加作用／血管拡張作用	ホスホジエステラーゼⅢ阻害作用／Ca感受性増強作用			ピモベンダン	内-1	カプセル剤		アカルディカプセル1.25					
ATP産生賦活作用				ユビデカレノン	内-2 内-1 内-1	顆粒剤 錠剤 カプセル剤		ノイキノン顆粒 ノイキノン錠 ノイキノンカプセル					
2	強心剤	急性心不全	心拍出量増加作用／心拍数減少作用	Na/Kポンプ遮断作用		強心配糖体	ジゴキシン	注-1	注射薬		ジゴシン注		
							デスラノシド	注-1	注射薬		ジギラノゲン注		
			心拍出量増加作用／血管拡張作用	アデニル酸シクラーゼ活性化作用			コルホルシンダロパート塩酸塩	注-1	注射薬		アデール注		
				選択的ホスホジエステラーゼⅢ阻害作用			オルブリン塩酸塩	注-1 注-2	注射薬 キット		コアテック注5mg		
							ミルリノン	注-1 注-2	注射薬 キット		ミルリーラ注射液10mg ミルリーラK注射液22.5mg		
				心拍出量増加作用／腎血管拡張作用	β受容体刺激作用		カテコールアミン系	ドバミン塩酸塩	注-1 注-2	注射薬 キット		イノバン注 カコージンD注200	
			心拍出量増加作用／心拍数増加作用					ドブタミン塩酸塩	注-1 注-2	注射薬 キット		ドブトレックス注射液100mg ドブトレックスK注200mg	
								l-イソプロレナリン塩酸塩	注-1	注射薬		プロタノール-L注	
			心拍出量増加作用／末梢血管拡張作用	ホスホジエステラーゼ阻害作用					キサンチン系	ジプロフィリン	注-1	注射薬	
					プロキシフィリン	注-1	注射薬				モノフィリン注		
					アミノフィリン	注-1 注-2	注射薬 キット				ネオフィリン注		
			心拍出量増加作用／末梢血管拡張作用	サイクリックAMP直接増加作用			ブクラデシンナトリウム	注-1	注射薬		アクトシン注		
			眠気、倦怠感、血管拡張性及び脊椎穿刺後頭痛	中枢興奮作用	ホスホジエステラーゼ阻害作用		キサンチン系	安息香酸ナトリウム カフェイン	注-1	注射薬		アンナカ注	

212 不整脈用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2(遮断解離スピー ド)	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品	線引き
1	不整脈用剤	上室性不整脈、心室性不整脈	Na チャンネル遮断作用	速い			メキシレチン塩酸塩	内-1 内-1	錠剤 カプセル剤		メキシレート錠 メキシチールカプセル	
				中間			ビルメノール塩酸塩	内-1	カプセル剤		ビメノールカプセル	
				中間			シベンプリンコハク酸塩	内-1	錠剤		シベノール錠	
				中間			アブリンジン塩酸塩	内-1	カプセル剤		アスペノンカプセル	
				中間			プロカインアミド塩酸塩	内-1	錠剤		アミサリン錠	
				中間			キニジン硫酸塩	内-2 内-1	散剤 錠剤		硫酸キニジン 硫酸キニジン錠	
				遅い			ジソピラミド	内-1	カプセル剤		リスモダン	
				遅い			ジソピラミドリン酸塩	内-1	錠剤		リスモダンR錠	
				遅い			プロパフェノン塩酸塩	内-1	錠剤		プロノン錠	
				遅い			ビルシカイニド塩酸塩水和	内-1	カプセル剤		サンリズムカプセル	
				遅い			フレカイニド酢酸塩	内-1 内-2	錠剤 細粒剤		タンボコール錠 タンボコール細粒	
			β 遮断作用				アテノロール	内-1 内-3	錠剤 ドライ シロップ剤		テノーミン アテノロールドライシ ロップ	
							アセプトロール塩酸塩	内-1	カプセル剤		アセタノールカプセル	
							アルブレノロール塩酸塩	内-1	カプセル剤		アセタノールカプセル	
							アロチノロール塩酸塩	内-1	錠剤		アルマール錠	
							カルテオロール塩酸塩	内-2 内-1	細粒剤 錠剤		ミケラン細粒 ミケラン錠	
							ブフェロール塩酸塩	内-1	錠剤		アドビオール錠	
							プロプラノロール塩酸塩	内-1	錠剤		インダラル錠	
							ナドロール	内-1	錠剤		ナディック錠	
							ビンドロール	内-1	錠剤		カルピスケン錠	
							ピソプロロールフマル酸塩	内-1	錠剤		メインテート錠	
							メソプロロール酒石酸塩	内-1	錠剤		セロケン錠	
							ソタロール塩酸塩	内-1	錠剤		ソタコール錠	
		心室頻拍、心室細動	Kチャンネル遮断作用/β 遮断作用									
		心室性頻拍、心室細動、心不全又は肥大型心筋症に伴う心房細動	Kチャンネル遮断作用/Naチャンネル遮断作用/Caチャンネル遮断作用/β 受容体遮断作用				アミオダロン塩酸塩	内-1	錠剤		アミオダロン塩酸塩錠	
		心室性不整脈	Ca チャンネル遮断作用/Naチャンネル遮断作用				ベプリジル塩酸塩	内-1	錠剤		ベプリコール錠	
		上室性不整脈	Na/Kポンプ遮断作用				ジギトキシン	内-1	錠剤		ジギトキシン錠	
							ジゴキシン	内-2 内-1 内-3	散剤 錠剤 液剤		ジゴキシン1000倍散 ジゴキシン錠 ジゴシンエリキシル	
							メチルジゴキシン	内-1	錠剤		ラニラビッド錠	
							ラナトシドC	内-1	錠剤		ジギラノゲンC錠	
2	不整脈用剤	上室性不整脈、心室性不整脈	Naチャンネル遮断作用	速い			メキシレチン塩酸塩	注-1	注射薬		メキシチール注射液	
				速い			リドカイン塩酸塩	注-1 注-2	注射薬 キット		キシロカイン注	
				中間			アブリンジン塩酸塩	注-1	注射薬		アスペノン注	
				中間			プロカインアミド塩酸塩	注-1	注射薬		アミサリン注	
				中間			シベンプリンコハク酸塩	注-1	注射薬		シベノール注射液	
				遅い			ジソピラミドリン酸塩	注-1	注射薬		リスモダンP注	
				遅い			ビルシカイニド塩酸塩水和	注-1	注射薬		サンリズム注射液50	
				遅い			フレカイニド酢酸塩	注-1	注射薬		タンボコール注50mg	
			β 受容体遮断作用 β 1 受容体遮断作用(選択性)				プロプラノロール塩酸塩	注-1	注射薬		インデラル注射液2mg	
							ランジオロール塩酸塩	注-1	注射薬		注射用オノアクト	
							エスモロール塩酸塩	注-1	注射薬			
		心室頻拍、心室細動	Kチャンネル遮断作用				ニフェカラン塩酸塩	注-1	注射薬		シンビット注	

			Kチャンネル遮断作用/Na チャンネル遮断作用/Caチャ ンネル遮断作用/ β 受容体 遮断作用				アミオダロン塩酸塩	注-1	注射薬		アンカロン注	
		上室性不整脈	Caチャンネル遮断作用				ペラパミル塩酸塩	注-1	注射薬		ワソラン注	
							ジルチアゼム塩酸塩	注-1	注射薬		ヘルベッサー注用	
			Na/Kポンプ遮断作用				ジゴキシン	注-1	注射薬		ジゴキシン注	
							デスラノド	注-1	注射薬		ジギラノゲン注	

213 利尿剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品	線引き
1	利尿剤	浮腫(うっ血性心不全を含む)／高血圧	利尿作用	遠位尿細管でのNa再吸収抑制作用			トリクロロメチアジド	内-1	錠剤		フルイトラン錠	
							ヒドロクロロチアジド	内-1	錠剤			
							ベンチルヒドロクロロチアジド	内-1	錠剤		ベハイド錠	
						非チアジド系	メチクラン	内-1	錠剤		アレステン錠	
							トリパミド	内-1	錠剤		ノルモナール錠15m	
							インダパミド	内-1	錠剤		ナトリックス錠1mg	
				抗アルドステロン作用			スピロノラクトン	内-2 内-1	細粒剤 錠剤		アルダクトンA細粒 アルダクトンA錠	
				抗アルドステロン作用／尿細管直接作用			トリウムテレン	内-1	カプセル剤		トリテレンカプセル	
				ヘンレループでのNa再吸収抑制作用			フロセミド	内-2 内-1 内-1	細粒剤 錠剤 カプセル剤		ラシックス細粒 ラシックス錠 オイテンシンカプセル	
							メフルシド	内-1	錠剤		バイカロン錠	
							ブメタニド	内-1	錠剤		ルネトロン錠	
				ヘンレループでのNa再吸収抑制作用			アゾセミド	内-1	錠剤		ダイアート錠	
							トラセミド	内-1	錠剤		ルブラック錠	
							アセタゾラミド	内-2 内-1	末剤 錠剤		ダイアモックス末 ダイアモックス錠	
		ループ利尿薬等の他の利尿薬で効果不十分な心不全における体液貯留		バソプレシンV2受容体拮抗作用			トルバプタン	内-1	錠剤		サムスカ錠	
		異所性抗利尿ホルモン産生腫瘍による抗利尿ホルモン不適合分泌症候群における低ナトリウム血症の改善	利尿作用	バソプレシンV2受容体拮抗作用			モザバプタン塩酸塩	内-1	錠剤		フィズリン錠	
		脳圧亢進時、緑内障、メニエル病	浸透圧利尿作用				イソソルビド	内-3	液剤		イソバイド	
2	利尿剤	浮腫(うっ血性心不全を含む)	利尿作用	ヘンレループでのNa再吸収抑制作用			フロセミド	注-1 注-2	注射薬 キット		ラシックス注射液	
							ブメタニド	注-1	注射薬		ルネトロン注射液	
							カンレノ酸カリウム	注-1	注射薬		ソルダクトン100mg	
		緑内障、てんかん、メニエル病・メニエル症候群、アシドーシス 術中・術後・外傷後及び薬物中毒時の急性腎不全の予防・治療、眼内圧降下	利尿作用／眼圧低下作用／ 脳圧低下作用	炭酸脱水酵素抑制作用			アセタゾラミドナトリウム	注-1	注射薬		注射用ダイアモックス	
			浸透圧利尿作用／脳圧降下作用／ 眼内圧降下作用				D-マンニトール注射液	注-1	注射薬		マンニゲン注射液	
			配合剤(浸透圧利尿作用／ 脳圧降下作用／眼内圧降下作用)			配合剤	D-ソルビトール/D-マンニトール	注-1	注射薬		マンニットールS	

214 血圧降下剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品	線引き
1	血圧降下剤	高血圧症	交感神経抑制作用	カテコールアミン枯渇作用			レセルピン	内ー2 内ー1	散剤 錠剤		レセルピン散 アポブロン錠	
				中枢性 α 受容体刺激作用			クロニジン塩酸塩	内ー1	錠剤		カタプレス錠75	
							グアナベンズ酢酸塩	内ー1	錠剤		ワイテンス錠	
							メチルドパ	内ー1	錠剤		アルドメット錠125	
				α 1受容体遮断作用			ブナゾシン塩酸塩	内ー1	錠剤	2～3	デタントール錠	
							ブナゾシン塩酸塩	内ー1	錠剤	1	デタントールR錠3m	
							ドキサゾシンメシル酸塩	内ー1	錠剤	1	カルデナリン錠0.5mg	
							ブラゾシン塩酸塩	内ー1	錠剤	2～3	ミニプレス錠0.5mg	
							ウラビジル	内ー1	カプセル剤	2	エブランチル15	
							テラゾシン塩酸塩	内ー1	錠剤	2	ハイトラシン錠0.25mg	
				β 受容体遮断作用	ISA(ー)		フロプラノロール塩酸塩	内ー1	カプセル剤 錠剤	1 3	インデラルLA	
							ニブラジロール	内ー1	錠剤	2	ハイパジールコーワ	
							ナドロール	内ー1	錠剤	1	ナデック錠30mg	
							ビンドロール	内ー1 内ー1	錠剤 カプセル剤	3 1	カシムテンR錠 プロクリンールカプセル5mg	
							カルテオロール塩酸塩	内ー1	カプセル剤	2～3	ミケランLA	
				β 1受容体遮断作用 (選択性)	ISA(ー)		ベタキシロール塩酸塩	内ー1	錠剤	1	ケルロング錠5mg	
							メプロロール酒石酸塩	内ー1 内ー1	錠剤 錠剤	3 1	セロケン錠20mg セロケンL錠	
							ベバントロール塩酸塩	内ー1	錠剤	2	カルバン錠25	
							アテノロール	内ー1 内ー3	錠剤 ドライシロップ剤	1	テノミン25	
							ビソプロロールフマル酸塩	内ー1	錠剤		メインテート錠5mg	
							セリプロロール塩酸塩	内ー1	錠剤	1	セレクトール錠100mg	
							アセプトロール塩酸塩	内ー1	カプセル剤	2	アセタノールカプセル100mg	
				α β 受容体遮断作用			ラベタロール塩酸	内ー1	錠剤	3	トランデート錠50mg	
							アモスラロール塩酸塩	内ー1	錠剤	2	ローガン錠10mg	
							アロチノロール塩酸塩	内ー1	錠剤	2	アルマール錠5mg	
							カルベジロール	内ー1	錠剤	1～2	アーチスト錠10mg	

配合剤	利尿作用／カテコールアミン枯渇作用／血管透過性抑制作用		配合剤	ベンチルヒドロクロロチアジド／レセルピン／カルバソクロム	内ー1	錠剤		ベハイドRA錠			
レニン・アンジオテンシン・アルドステロン系抑制作	ACE阻害作用			エナラプリルマレイン酸塩	内ー1 内ー2	錠剤 細粒剤	1	レニベース錠2. 5			
				リシノプリル	内ー1	錠剤	1	ロンゲス錠5mg			
				カプトプリル	内ー2 内ー1 内ー1	細粒剤 錠剤 カプセル剤	3 3 2	カプトリル細粒 カプトリル錠 カプトリルR			
				アラセプリル	内ー1	錠剤	1～2	セタプリル錠12. 5			
				デラプリル塩酸塩	内ー1	錠剤	2	アデカット7. 5mg錠			
				シラザプリル	内ー1	錠剤	1	インヒベース錠0. 2			
				ペナゼプリル塩酸	内ー1	錠剤	1	チバセン錠2. 5mg			
				イミダプリル塩酸塩	内ー1	錠剤	1	ノバロック錠2. 5			
				デモカプリル塩酸	内ー1	錠剤	1	エースコール錠1mg			
				キナプリル塩酸塩	内ー1	錠剤	1	コナン錠5mg			
				トランドラプリル	内ー1	錠剤	1	ブレラン0. 5mg錠			
				ペリンドプリルエルブミン	内ー1	錠剤		コバシル錠2mg			
		アンジオテンシンⅡ受容体拮抗作用				ロサルタンカリウム	内ー1	錠剤	1	ニューロタン錠25	
						バルサルタン	内ー1	錠剤	1	ディオバン錠80	
					カンデサルタンシレキセチル	内ー1	錠剤	1	プロプレス錠2		
					テルミサルタン	内ー1	錠剤	1	ミカルディス錠		
					オルメサルタン メドキシミル	内ー1	錠剤	1	オルメテック錠10mg		
					イルベサルタン	内ー1	錠剤	1	イルベタン錠50mg アバプロ錠50mg		
					アジルサルタン	内ー1	錠剤	1	アジルバ錠		
	レニン阻害作用				アリスキレンフマル酸塩	内ー1	錠剤	1	ラジレス錠150mg		
	鉍質コルチコイド受容体拮抗作用				エブレノン	内ー1	錠剤	1	セララ錠25mg		
	配合剤(レニン・アンジオテンシン・アルドステロン系抑制作用／利尿作用)	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗作用／遠位尿細管でのNa再吸収抑制作用		配合剤	ロサルタンカリウム／ヒドロクロロチアジド	内ー1	錠剤	1	プレミネント配合錠LD、同HD		
					カンデサルタンシレキセチル／ヒドロクロロチアジド	内ー1	錠剤	1	エカード配合錠LD、同HD		
				バルサルタン／ヒドロクロロチアジド	内ー1	錠剤	1	コディオ配合錠MD、同EX			
				テルミサルタン／ヒドロクロロチアジド	内ー1	錠剤	1	ミコンビ配合錠AP、同BP			
				イルベサルタン／トリクロルメチアジド	内ー1	錠剤	1	イルトラ配合錠LD、同HD			
配合剤(レニン・アンジオテンシン・アルドステロン系抑制作用／血管平滑筋弛緩作用)	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗作用／Caチャネル遮断作用		配合剤	バルサルタン／アムロジピンベシル酸塩	内ー1	錠剤	1	エックスフォージ配合錠			

						オルメサルタン メドキシミル／アゼルニジピン	内ー1	錠剤	1	レザルタス配合錠LD、同HD	
						カンデサルタン シレキセチル／アムロジピンベシル酸	内ー1	錠剤	1	ユニシア配合錠LD、同HD	
						テルミサルタン／アムロジピンベシル酸塩	内ー1	錠剤	1	ミカムロ配合錠AP、同BP	
						イルベサルタン／アムロジピンベシル酸塩	内ー1	錠剤	1	アイミクス配合錠LD、同HD	
						バルサルタン／シルニジピン	内ー1	錠剤	1	アデディオ配合錠	
						アジルサルタン／アムロジピンベシル酸塩	内ー1	錠剤	1	ザクラス配合錠LD、同HD	
					配合剤	テルミサルタン／アムロジピンベシル酸塩／ヒドロクロチアジド	内ー1	錠剤	1	ミカトリオ配合錠	
		配合剤(レニン・アンジオテンシン・アルドステロン系抑制作用／血管平滑筋弛緩作用／利尿作用)	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗作用／Caチャネル遮断作用／遠位尿細管でのNa再吸収抑制作用			ベンゾチアゼピン系	内ー1 内ー1	錠剤 カプセル剤	3 1	ヘルベッサ錠 ヘルベッサR100	
		血管平滑筋弛緩作用	Caチャネル遮断作用	房室結節伝導抑制作用	ジヒドロピリジン系	ニフェジピン	内ー2 内ー1 内ー1	細粒剤 錠剤 カプセル剤	3	セバミット細粒 エマベリン錠 アダラート	
						ニフェジピン	内ー1	錠剤	1	アダラートCR錠10	
						ニフェジピン	内ー1	錠剤	2	アダラートL錠10mg	
						ニソルジピン	内ー1	錠剤	1	バイミカード錠5mg	
						ニトレンジピン	内ー1	錠剤	1	パイロテンシン錠5m	
						ベニジピン塩酸塩	内ー1	錠剤	1～2	コニール錠	
						ベシル酸アムロジピン	内ー1	錠剤	1	アムロジン錠	
						ニルバジピン	内ー1	錠剤	2	ニバジール錠	
						マニジピン塩酸塩	内ー1	錠剤	1		
						ニカルジピン塩酸塩	内ー1 内ー1 内ー2	錠剤 カプセル剤 散剤	3 2 3	ラジストミンL錠 ペルジピンLA	
						マニジピン塩酸塩	内ー1	錠剤	1	カルスロット錠5	
						バルニジピン塩酸	内ー1	カプセル剤	1	ヒポカ5mgカプセル	
						エホニジピン塩酸	内ー1	錠剤	1～2	ランデル錠10	
						フェロジピン	内ー1	錠剤	2	スプレンジール錠2.5mg	
						シルニジピン	内ー1	錠剤	1	アテレック錠5	
						アラニジピン	内ー2 内ー1	顆粒剤 カプセル剤	1	サブレスト顆粒	
						アゼルニジピン	内ー1	錠剤	1	カルブロック錠	
			血管平滑筋直接弛緩作用			ヒドララジン塩酸塩	内ー2 内ー1	散剤 錠剤		アプレジン散 アプレゾリン錠10m	

		肺動脈性肺高血圧症	肺血行動態の改善作用	血小板凝集抑制作用/血管拡張作用			ベラプロストナトリウム	内-1	錠剤	3~4	ドルナー	
									錠剤(徐放剤)	2	ベラススLA錠 ケアロードLA錠	
				プロスタグランジン I 2作用	プロスタサイクリン(IP)受容体アゴニスト作用		セレキシバグ	内-1	錠剤	2	ウブトラビ錠	
				エンドセリン受容体拮抗作用			ボセンタン水和物	内-1	錠剤	2	トラクリア錠62.5mg	
								内-1	錠剤	2	トラクリア小児用分散錠	
							マシテンタン	内-1	錠剤	1	オプスミット錠	
				選択的エンドセリン(ET) _A 受容体拮抗作用			アンプリセンタン	内-1	錠剤	1	ヴォリブリス錠2.5mg	
				ホスホジエステラーゼ5阻害作用			シルデナフィルクエン酸塩	内-1	錠剤	3	レバチオ錠20mg	
							タダラフィル	内-1	錠剤	1	アドシルカ錠20mg	
		慢性血栓塞栓性肺高血圧症	血管拡張作用	cGMP増加作用	グアニル酸シクラーゼ活性化作用		リオシグアト	内-1	錠剤	3	アデムバス錠	
2	血圧降下剤	高血圧性緊急症	交感神経抑制作用	カテコールアミン枯渇作用			レセルピン	注-1	注射薬		アボブロン注0.3mg	
			血管平滑筋直接弛緩作用				ヒドララジン塩酸塩	注-1	注射薬		注射用アブレプリリン	
			交感神経抑制作用									
			血管平滑筋弛緩作用	Caチャネル遮断作用			ニカルジピン塩酸	注-1	注射薬		ペルジピン2mg	
					房室結節伝導抑制作用		ジルチアゼム塩酸	注-1	注射薬		ヘルベッサー注射用	
		手術時の異常高血圧症／手術時の低血圧維持	血管平滑筋弛緩作用	cGMP増加作用	グアニル酸シクラーゼ活性化作用		ニトロブリスドナトリウム	注-1	注射薬		ニトロプロ注	
							ニトログリセリン	注-1	注射薬		ミリスロール注	
		外科手術時の低血圧維持(高血圧症又は軽度の虚血性心疾患合併時)	血管拡張作用＋血小板凝集抑制作用	プロスタグランジンE1作用			アルブロスタジルアルファデクス	注-1	注射薬		注射用ブロスタンデイン500	
		肺動脈性肺高血圧症	血管拡張作用＋血小板凝集抑制作用	プロスタグランジン I 2作用			エポプロステノールナトリウム	注-1	注射薬		静注用フローラン0.5mg	
							トレプロステニル	注-1	注射薬		トレプロスト注射液	
3	血圧降下剤	高血圧症	交感神経抑制作用	β 1受容体遮断作用(選択性)	ISA(-)		ピソプロロール	外-5	貼付剤		ピソノテープ	
		肺動脈性肺高血圧症	血管拡張作用＋血小板凝集抑制作用	プロスタグランジン I 2作用			イロprost	外-2	吸入剤		ベンティビス吸入液	

216 血管収縮剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	血管収縮剤	低血圧	血管収縮作用	α 受容体刺激作用			ミドドリン塩酸塩	内-1	錠剤		メトリジン錠2mg	
							アメジニウムメチル硫酸塩	内-1	錠剤		リズミック錠10mg	
				交感神経刺激作用			エチレフリン塩酸塩	内-1	錠剤		エホチール錠	
2	血管収縮剤	低血圧又はショック時の補助治療	血管収縮作用	交感神経刺激作用			エチレフリン塩酸塩	注-1	注射薬		エホチール注射液	
							フェニレフリン塩酸塩	注-1	注射薬		ネオシネジンコーワ 注1号	
							アドレナリン	注-1 注-2	注射薬 キット		ボスミン注	
							ノルアドレナリン	注-1	注射薬		ノルアドレナリン注	

217 虚血性心疾患用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品	線引き
I	虚血性心疾患 用剤	虚血性心疾患	交感神経抑制作用	β 受容体遮断作用	ISA(－)		ブフェロール塩酸塩	内－1	錠剤		アドビオール錠	
					ISA(－)		プロプラノロール塩酸塩	内－1	錠剤		インデラル錠10mg	
					ISA(－)		ナドロール	内－1	錠剤		ナディック錠30mg	
					ISA(－)		プロプラノロール塩酸塩	内－1	カプセル剤		インデラルLA	
					ISA(－)		ニブラジロール	内－1	錠剤		ハイバジールコーワ錠	
					ISA(＋)		カルテオロール塩酸塩	内－2 内－1	細粒剤 錠剤		ミケラン細粒 ミケラン錠	
					ISA(＋)		ピンドロール	内－1	錠剤		ヒシクロピン錠	
					ISA(＋)		アルブレノロール塩酸塩	内－1	カプセル剤		アテノール	
				β 1受容体遮断作用 (選択性)	ISA(－)		アテノロール	内－1	錠剤		テノミン25	
					ISA(－)		ビソプロロールフマル酸塩	内－1	錠剤		メインテート錠2. 5	
					ISA(－)		メブプロロール酒石酸塩	内－1	錠剤		セロケン錠20mg	
					ISA(－)		ベタキソロール塩酸塩	内－1	錠剤		ケルロング錠5mg	
					ISA(＋)		アセプトロール塩酸塩	内－1	カプセル剤		アセタノールカプセル100	
					ISA(＋)		セリプロロール塩酸塩	内－1	錠剤		セレクトール錠100mg	
				α β 受容体遮断作用			アロチノロール塩酸塩	内－1	錠剤		アルマール錠5	
							カルベジロール	内－1	錠剤		アーチスト錠10mg	
			血管平滑筋弛緩作用	cGMP増加作用			イソソルビド硝酸塩	内－1 内－1 内－1	錠剤 錠剤 カプセル剤		ニトロール錠 ニトロールRカプセル	
							イソソルビド－硝酸塩	内－1	錠剤		アイトロール錠10m	
							ニログリセリン	内－1	錠剤		バソレーターRB2.	
							ニコランジル	内－1	錠剤		シグマート錠2. 5m	
				Ca拮抗作用	房室結節伝導抑制作用	フェニルアル キルアミン系 ベンゾチアゼ ピン系	ベラパミル塩酸塩	内－1	錠剤		ワソラン錠	
							ジルチアゼム塩酸塩	内－1 内－1	錠剤 カプセル剤		ヘルベッサ－錠 ヘルベッサ－R100	
					ジヒドロピリ ジン系		ニフェジピン	内－2 内－1 内－1	細粒剤 錠剤 カプセル剤		セバミット細粒 アダラートL錠 アダラート	
							エホニジピン塩酸塩	内－1	錠剤		ランデル錠10	
							ニソルジピン	内－1	錠剤		バイミカド錠5mg	
							ニトレンジピン	内－1	錠剤		バイロテンシン錠5	
							ベニジピン塩酸塩	内－1	錠剤		コニール錠2	
							アムロジピンベシル酸塩	内－1	錠剤		アムロジン錠2. 5	
					Ca拮抗作用／Naチャンネル 遮断作用		ベプリジル塩酸塩	内－1	錠剤		ベプリコール錠	
			抗血小板凝集抑制作用				ジピリダモール	内－1	錠剤 カプセル 剤		ベルサンテン錠 ベルサンテンLカプ セル	
							ジラゼブ塩酸塩	内－1	錠剤		コメリアンコーワ錠	
							トリメタジジン塩酸塩	内－2 内－1	細粒剤 錠剤		バスタレルF細粒 バスタレルF錠	
							トラバジル	内－2 内－1	細粒剤 錠剤		ロコルナール細粒 ロコルナール錠100 mg	

2	虚血性心疾患 用剤	虚血性心疾患	血管拡張作用	cGMP増加作用			ニコランジル	注-1	注射薬		シグマート注2mg	
							イソソルビド硝酸塩	注-1 注-2	注射薬 キット		ニトロール注5mg	
							ニトログリセリン	注-1	注射薬		ミリスロール注	
			血小板凝集抑制作用+血管 拡張作用				ジピリダモール	注-1	注射薬		ペルサンテン注	
			交感神経抑制作用	β 受容体遮断作用			プロプラノロール塩酸塩	注-1	注射薬		インデラル注射液	
3	虚血性心疾患 用剤	虚血性心疾患	血管拡張作用	cGMP増加作用		硝酸系	ニトログリセリン	外-2	噴霧剤		ミオコールスプレー	
								外-5	貼付剤		ニトロダームTTS	
							イソソルビド硝酸塩	外-2	噴霧剤		ニトロールスプレー	
								外-5	貼付剤		リファタックテープ	
							亜硝酸アミル	外-2	吸入剤		亜硝酸アミル	

218 高脂血症用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	高脂血症用剤	高脂血症(主に高コレステロール血症)	コレステロール低下作用／トリグリセリド低下作用	リポ蛋白リパーゼ活性作用／トリグリセリドリパーゼ活性作用		フィブラート系	クリノフィブラート	内ー1	錠剤		リボクリン錠	
							ベザフィブラート	内ー1	錠剤		ベザトールSR錠	
							クロフィブラート	内ー1	カプセル剤		クロフィブラートカプセル	
							フェノフィブラート	内ー1	錠剤		リビディル錠 トライコア錠	
							プロブコール	内ー2 内ー1	細粒剤 錠剤		シンレスタール細粒 シンレスタール錠	
						ニコチン酸系	ニコモール	内ー1	錠剤		コレキサミン錠	
							ニセリトロール	内ー1	錠剤		ペリシット錠	
							エラスターゼ	内ー1	錠剤		エラスチーム錠	
							イコサペント酸エチル	内ー1	カプセル剤		エパデール	
		コレステロール低下作用	コレステロール低下作用	コレステロール生合成阻害作用	HMG-CoA還元酵素阻害作用		イコサペント酸エチル／ドコサヘキサエン酸エチル	内ー1	カプセル剤		ロトリガ粒状カプセル	
							ブラバスタチンナトリウム	内ー2 内ー1	細粒剤 錠剤		メバロチン細粒 メバロチン錠	
							シンバスタチン	内ー1	錠剤		リボバス錠	
							フルバスタチンナトリウム	内ー1	錠剤		ローコール錠	
							アトルバスタチンカルシウム水和物	内ー1	錠剤		リビトール錠	
							ピタバスタチンカルシウム	内ー1	錠剤		リバロ錠	
							ロスバスタチンカルシウム	内ー1	錠剤		クレストール錠	
						胆汁酸吸着樹脂	コレステラミン	内ー3	ドライシ ロップ剤		クエストラン	
							コレステミド	内ー2 内ー1	顆粒剤 錠剤		コレバイン顆粒 コレバイン錠	
							エゼチミブ	内ー1	錠剤		ゼチーア錠	
						植物由来	ガンマオリザノール	内ー2 内ー1	細粒剤 錠剤		ハイゼット細粒 ハイゼット錠	
				VLDL／カイロミクロン形成阻害作用	ミクロソームトリグリセリド転送タンパク質(MTP)阻害作用		ロミタビドメシル酸塩	内ー1	カプセル剤		ジャクスタビッドカプセル	
		高トリグリセリド血症	トリグリセリド低下作用	リポタンパクリパーゼ活性作用			デキストラン硫酸ナトリウム	内ー1	錠剤		MDSコーワ錠	
		高脂質血症に伴う随伴症状	コレステロール低下作用	コレステロール異化排泄作用			トコフェロールニコチン酸エステル	内ー2 内ー1	細粒剤 カプセル剤		ユベラン細粒 ユベランカプセル	
2	高脂血症用剤	高コレステロール血症	コレステロール低下作用	LDL受容体分解阻害作用	PCSK9阻害作用		エボロクマブ(遺伝子組換え)	注ー2	キット		レパーサ皮下注シリ ンジ	
								注ー2	キット		レパーサ皮下注ベン	
							アリロクマブ(遺伝子組換え)	注ー2	キット		ブララエント皮下注 シリンジ ブララエント皮下注 ベン	

219 その他の循環器官用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品	線引き
1	その他の循環器官用剤	末梢循環障害	末梢血行改善作用	血小板凝集抑制作用			トコフェロールニコチン酸エステル	内-2 内-1	細粒剤 カプセル剤		ユベラN細粒 ユベラNカプセル	
							トコフェロール酢酸エステル	内-2 内-1 内-1	顆粒剤 錠剤 カプセル剤		ユベラ錠 ユベラ顆粒	
			末梢血管拡張作用 血管拡張作用＋子宮筋弛緩作用	血管平滑筋直接弛緩作用 β受容体刺激作用			ヘプロニカート	内-1	錠剤		ヘプロニカート錠	
							インクスブリン塩酸塩	内-1	錠剤		ズファジラン錠	
		高カリウム血症	血中カリウム低下作用	NaイオンとKイオンの交換作用		イオン交換樹脂	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム	内-2 内-3	散剤 ドライシロップ剤		ケイキサレート散 ケイキサレードライシロップ	
				CaイオンとKイオンの交換作用		イオン交換樹脂	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	内-2 内-3 内-3 内-3	散剤 ドライシロップ剤 ゼリー 液剤		カリメート散 カリメートドライシロップ アーガメイトゼリー カリメート経口液	
		高リン血症	血中リン低下作用	高分子による吸着作用		イオン交換樹脂	セベラマー塩酸塩	内-1	錠剤		レナジェル錠 フォスブロック錠	
							ビキサロマー	内-1 内-2	カプセル剤 顆粒剤		キックリンカプセル キックリン顆粒	
				金属イオンとリン酸イオンの結合			炭酸ランタン水和物	内-5 内-2	チュアブル 顆粒剤		ホスレノールチュアブル錠 ホスレノール顆粒分包	
							クエン酸第二鉄水和物 スクロオキシ水酸化鉄	内-1 内-5	錠剤 チュアブル		リオナ錠 ビートルチュアブル錠	
		慢性動脈閉塞症	血管拡張作用	プロスタグランジンE1作用			リマブrostアルファデクス	内-1	錠剤		オバルモン錠 プロレナール錠	
		慢性脳循環障害	脳血流増加作用				イブジラスト	内-1	カプセル剤		ケタスカプセル	
							イフェンブロジル酒石酸塩	内-1 内-2	錠剤 細粒剤		セロクラール錠 セロクラール細粒	
				コリンアセチルトランスフェラーゼ活性化作用			ニセルゴリン	内-2 内-1	散剤 錠剤		サアミオン散 サアミオン錠	
		高血圧症又は狭心症と、高コレステロール血症又は家族性高コレステロール血症を併発している患者		Caチャネル遮断作用＋HMG-CoA還元酵素阻害作用		配合剤	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物	内-1	錠剤		カデュエット配合錠	
2	その他の循環器官用剤	慢性動脈閉塞症	血管拡張作用	プロスタグランジンE1作用			アルプロスタジル	注-1 注-2	注射薬 キット		リブル注 リブルキット注	
							アルプロスタジルアルファデクス	注-1	注射薬		タンデトロン注射用20	
		末梢循環障害	血管拡張作用＋子宮筋弛緩作用	β受容体刺激作用			イソクスブリン塩酸塩	注-1	注射薬		ズファジラン注	
		意識障害(脳虚血症状を含む)	配合剤(脳血流量／酸素消費量増加作用／頭蓋内圧降下作用)	浸透圧作用		配合剤	濃グリセリン／果糖	注-1	注射薬		グリセオール注	
							ファスジル塩酸塩水和物	注-1	注射薬		エリル注S	
			血管拡張作用	蛋白リン酸化酵素阻害作用			オザグレルナトリウム	注-1 注-2	注射薬 キット		カタクロット注 オキリコン注シリンジ	
			血小板凝集抑制作用	トロンボキサンA2阻害作用								
		脳血栓症急性期	血液抗凝固作用	抗トロンビン作用			アルガトロバン	注-1	注射薬			

							注-2	キット		アルガトロバン注シ リンジ10mg「NP」	
	術中・術後・外傷後及び薬物中毒時の急性腎不全の予防・治療、眼内圧降下	浸透圧利尿作用／脳圧降下作用／眼内圧降下作用				D-マンニトール	注-1	注射薬		マンニゲン注射液	
		配合剤（浸透圧利尿作用／脳圧降下作用／眼内圧降下作用）			配合剤	D-ソルビトール/D-マンニトール	注-1	注射薬		マンニトールS	
	未熟児動脈管開存症	動脈管閉鎖作用				インドメタシンナトリウム	注-1	注射薬			

221 呼吸促進剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
2	呼吸促進剤	呼吸抑制時(急性)	末梢性化学受容器を介して呼吸中枢への選択的刺激作用				ドキシプラム塩酸塩	注-1	注射薬		ドプラム注射液	
			呼吸中枢刺激作用				ジモルホラミン	注-1	注射薬		テラプテク静注	
			オピエート受容体拮抗作用				ナロキソン塩酸塩	注-1	注射薬		塩酸ナロキソン注射液	
							レバロルフアン酒石酸塩	注-1	注射薬		ロルフアン注射液	
			ベンゾジアゼピン受容体拮抗作用				フルマゼニル	注-1	注射薬		アネキセート注	
3	呼吸促進剤	呼吸窮迫症候群	呼吸窮迫症改善作用	肺胞の気-液界面の表面張力を低下させて肺の虚脱を防止し、肺の安定した換気能力の維持作用		牛肺抽出物	肺サーファクタント	外-2	吸入剤		サーファクテン	

222－224 鎮咳剤・去痰剤

内注外 分類名 区分	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	鎮咳及び去痰	鎮咳作用／去痰作用	喀痰溶解作用／気道内分泌液増加作用／鎮咳作用			エブラジノン塩酸塩	内－1	錠剤		レスブレン錠	
			咳中枢抑制作用／気道内分泌液増加作用			チベピジンヒベンズ酸塩	内－2 内－1 内－3 内－4	散剤 錠剤 シロップ剤 ドライシロップ [®] 剤		アスベリン散 アスベリン錠 アスベリンシロップ アスベリンドライシロップ	
			咳中枢抑制作用／去痰作用			シャゼンソウエキス	内－2	末剤			
			配合剤(咳中枢抑制作用＋気道分泌促進作用＋喀痰粘度低下作用)		配合剤	ジヒドロコデインリン酸塩／エフェドリ ン塩酸塩／塩化アンモニウム	内－3	シロップ剤		セキコデシロップ	
			配合剤(咳中枢抑制作用＋気道分泌促進作用)			デキストロメトルフアン臭化水素酸塩 ／クレゾールスルホン酸カリウム	内－3	シロップ剤		メジコンシロップ	
			配合剤(咳中枢抑制作用＋気道内 分泌液増加作用)			オウヒエキス／コデインリン酸塩	内－3	液剤		濃厚プロチンコデイン液	
			配合剤(咳中枢抑制作用＋去痰作 用)			キキョウ流エキス／シャゼンソウエ キス／シャクヤクエキス	内－3	液剤		マルコホンA液	
	鎮咳	鎮咳作用	咳中枢抑制作用			ペントキシペリリンクエン酸塩	内－2 内－1 内－1	細粒剤 錠剤 カプセル剤		トクレスパンスールカプ セル	
						デキストロメトルフアン臭化水素酸塩	内－2 内－2 内－1	散剤 細粒剤 錠剤		メジコン散 メジコン錠	
						ジメモルフファンリン酸塩	内－2 内－1 内－3	散剤 錠剤 シロップ剤		アストミン散 アクトミン錠 アストミンシロップ	
						コデインリン酸塩	内－2 内－2 内－1	末剤 散剤 錠剤		リン酸コデイン リン酸コデイン10倍散 リン酸コデイン錠	
						ジヒドロコデインリン酸塩	内－2 内－2	末剤 散剤		リン酸ジヒドロコデイン	
						ノスカピン	内－2	末剤		ノスカピン	
						クロベラスチン	内－2 内－1 内－3	散剤 錠剤 シロップ剤		フスタゾール散 フスタゾール糖衣錠 フスタゾールシロップ	
						ペンプロベリンリン酸塩	内－1	錠剤		フラベリック錠	
						クロフェダノール塩酸塩	内－2 内－1	顆粒剤 錠剤		コルドリン顆粒 コロドリ [®] 錠	
			気管支拡張作用	β 受容体刺激作用		メチルエフェドリン塩酸塩	内－2	散剤		ネオドリ [®] ン散	
						エフェドリン塩酸塩	内－2 内－2 内－1	末剤 散剤 錠剤		塩酸エフェドリン 塩酸エフェドリン散 塩酸エフェドリン錠	
						メキシフェナミン塩酸塩	内－1	錠剤		フェナミン錠「トール」	
			配合剤(咳中枢抑制作用＋気管支 拡張作用＋抗ヒスタミン作用)		配合剤	ジブロフィリン／メキシフェナミン塩 酸塩／ノスカピン／クロルフェニラ ミンマレイン酸塩	内－1	カプセル剤		アストーマカ [®] セル	
						ジブロフィリン／エフェドリン塩酸塩 10 mg／パバベリン塩酸塩／ノスカ ピン／ジフェンヒドラミン塩酸塩	内－1	錠剤		アストフィリン	
						dl-メチルエフェドリン塩酸塩／ノスカ ピン6 mg／クロルフェニラミンマレイ ン酸塩	内－3	シロップ剤		強カセキールシロップ	
						ジヒドロコデインリン酸塩／dl-メチル エフェドリン塩酸塩／クロルフェニラ ミンマレイン酸塩	内－2 内－1 内－3	散剤 錠剤 シロップ剤		フスタコデイン クロフェドリンS錠 ライトゲンシロップT	

			配合剤(咳中枢抑制作用＋気管支拡張作用＋抗ヒスタミン作用＋鎮静作用＋鎮痛作用)		配合剤	ジプロフィリン／ジヒドロコデインリン酸塩／dl-メチルエフェドリン塩酸塩／ジフェンヒドラミンサリチル酸塩／アセトアミノフェン／プロモバレリル	内ー1	錠剤		カフコデ錠「モハン」	
			配合剤(咳中枢抑制作用＋気管支拡張作用＋鎮静作用)		配合剤	ブロキシフィリン／エフェドリン塩酸塩／フェノバルビタール	内ー1	錠剤		アストモリジン配合胃溶錠	
	去痰	去痰作用	喀痰粘度低下作用			L-メチルシステイン塩酸塩 L-カルボシステイン L-エチルシステイン塩酸塩 フドステイン	内ー1 内ー2 内ー1 内ー4 内ー3,4	錠剤 細粒剤 錠剤 シロップ剤 ドライシロップ剤		ベクタイト錠 ムコダイン細粒 ムコダイン錠 ムコダインシロップ チスタニン糖衣錠 クリアナール錠 スペリア内用液	
			肺表面活性物質分泌促進作用／気道内分泌液増加作用			アンブロキソール塩酸塩 ブロムヘキシン塩酸塩	内ー2 内ー1 内ー1 内ー3 内ー4 内ー2 内ー1 内ー3	細粒剤 錠剤 カプセル剤 シロップ剤 ドライシロップ剤 細粒剤 錠剤 シロップ剤		フストレス細粒 ムコソルバン錠 ムコソルバンLカプセル ムコソルバンシロップ ムコソルバンドライシロップ ムコソルバン液 ビソルボン細粒 ビソルボン錠 ビソルボンシロップ	
			気道内分泌液増加作用			桜皮エキス セネガ	内ー3 内ー3	液剤 シロップ剤		プロチン液 セネガシロップ	
			配合剤(気道分泌促進作用＋喀痰溶解作用)		配合剤	アンモニア水／ウイキョウ油	内ー3	液剤		アンモニア・ウイキョウ精	
2	鎮咳及び去痰	鎮咳作用／去痰作用				グアイフェネシン	注ー1	注射薬		フストジル注射液	
	鎮咳	気管支拡張作用	β受容体刺激作用(非選択性)			メチルエフェドリン塩酸塩 エフェドリン塩酸塩	注ー1 注ー1	注射薬 注射薬		メチエフ注射液 塩酸エフェドリン注射液	
		鎮咳作用				デキストロメトルファン臭化水素酸塩	注ー1	注射薬		ハイフスタンM注	
	去痰	去痰作用	肺表面活性物質の分泌促進作用／気道内分泌液増加作用			ブロムヘキシン塩酸塩	注ー1	注射薬		コフメジン注射液	
3	去痰	去痰作用	気道粘液溶解作用			アセチルシステイン	外ー2	吸入剤		ムコフィリン液	
			気道内分泌液増加作用			ブロムヘキシン塩酸塩	外ー2	吸入剤		ビソルボン吸入液	

225 気管支拡張剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分名	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	気管支拡張剤	気管支喘息	気管支拡張作用	β 受容体刺激作用(非選択性)			トリメチノール塩酸塩	内-2 内-1 内-4	散剤 錠剤 シロップ剤		イノリン散 イノリン錠 イノリンシロップ	
				β 2受容体刺激作用(選択性)			サルブタモール硫酸塩	内-1 内-4	錠剤 シロップ剤		ベネトリン錠 ベネトリンシロップ	
							テルブタリン硫酸塩	内-2 内-1 内-4	細粒剤 錠剤 シロップ剤		ブリカニール細粒 ブリカニール錠 ブリカニールシロップ	
							クレブテロール塩酸塩	内-2 内-1	顆粒剤 錠剤		スピロベント顆粒 スピロベント錠	
							プロカテロール塩酸塩	内-2 内-1 内-4 内-3, 4	顆粒剤 錠剤 シロップ剤 ドライシロップ剤		メブチン顆粒 メブチンミニ錠 メブチンシロップ メブチンドライシロップ	
							フェノテロール臭化水素酸塩	内-1 内-3 内-4	錠剤 シロップ剤 ドライシロップ剤		ペロテック錠 ペロテックシロップ ボルボノールドライシロップ	
							ツロブテロール塩酸塩	内-1 内-4	錠剤 ドライシロップ剤		ホクナリン錠 ホクナリンドライシロップ	
				ホスホジエステラーゼ阻害作用			アミノフィリン	内-2 内-1	末剤 錠剤		ネオフィリン末 ネオフィリン錠	
							プロキシフィリン	内-2 内-1	末剤 錠剤		モノフィリン	
							テオフィリン	内-2 内-1 内-1 内-3,4 内-3,4	顆粒剤 錠剤 カプセル剤 シロップ剤 ドライシロップ剤		テオロング顆粒 テオロング錠 スロービッド テオドールシロップ テオドールドライシロップ	
							テオフィリン(小)	内-4	液剤		アブネカット経口10mg	
							無水カフェイン	内-4	液剤		レスビア静注・経口液	
			配合剤(気管支拡張作用)	β 受容体刺激作用(非選択性)／喀痰溶解作用／喀痰粘度低下作用		配合剤	イソブレナリン塩酸塩／プロナーゼ	内-1	カプセル剤		イソパール・P	
				β 受容体刺激作用(非選択性)			イソブレナリン塩酸塩	注-1	注射薬		プロタノールL注	
2	気管支拡張剤	気管支喘息		β 2受容体刺激作用(選択性)			テルブタリン硫酸塩	注-1	注射薬		ブリカニール注射液	
				ホスホジエステラーゼ阻害作用			アミノフィリン	注-1 注-2	注射薬 キット		アミノフィリン注射液 ネオフィリン注点滴用バッグ	
							プロキシフィリン	注-1	注射薬		モノフィリン注	
							ジプロフィリン	注-1	注射薬		ネオフィリンM注	
							アミノフィリン(小)	注-1	注射薬		アブニシオン注15mg	
							無水カフェイン	注-1	注射薬		レスビア静注・経口液	
3	気管支拡張剤	気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患	気管支拡張作用	β 受容体刺激作用(非選択性)			トリメチノール塩酸塩	外-2	吸入剤		イノリン吸入液	

						イソプレナリン塩酸塩	外-2	吸入剤		アスプール液	
			β 2受容体刺激作用(選択性)	速効型		プロカテロール塩酸塩	外-2 外-9	吸入剤 キット		メブチン吸入液 メブチンクリックヘラー 10 μ g	
						フェノテロール臭化水素酸	外-2	吸入剤		ペロテックエロゾル	
						サルブタモール硫酸塩	外-2	吸入剤		ベネトリン吸入液	
				持続型		ツロブテロール	外-5	貼付剤		ホクナリンテープ	
						サルメテロールキシナホ酸	外-2	吸入剤		セレベント25ロタディ スク、セレベント50ロタ ディスク	
							外-9	キット		セレベント50ディスク	
						インダカテロールマレイン酸 塩	外-2	吸入剤		オンプレス吸入用カプ セル	
						ホルモテロールフマル酸塩 水和物	外-9	キット		オーキシス9 μ gター ビュヘイラー	
		配合剤(気管支拡張作用)	β 受容体刺激作用/抗炎症作用		配合剤	サルメテロールキシナホ酸 /フルチカゾンプロピオン酸 エステル	外-2 外-9	吸入剤 キット		アドエアディスク	
						ホルモテロールフマル酸塩 水和物/ブテゾニド	外-9	キット		シムビコートタービュヘ イラー	
						フルチカゾンプロピオン酸エ ステル/ホルモテロールフ マル酸塩水和物	外-9	キット		フルティフォームエア ゾール	
						ビランテロールトリフェニル 酢酸塩/フルチカゾンフラン カルボン酸エステル	外-9	キット		レルベアエリプタ	
			β 受容体刺激作用/抗コリン作用		配合剤	インダカテロールマレイン酸 塩/グリコピロニウム臭化 ウメクリジニウム臭化物/ブ ランテロールトリフェニル 酢酸塩	外-2 外-9	吸入剤 キット		ウルティプロ吸入用カ プセル	
						チオトロピウム臭化物水和 物/オロダテロール塩酸塩	外-9	キット		アノーロエリプタ	
			ホスホジエステラーゼ阻害作用/気管 支平滑筋弛緩作用		配合剤	dl-メチルエフェドリン塩酸塩 /ジプロフィリン	外-6	坐剤		アニスーマ	
		抗炎症作用				フルチカゾンプロピオン酸エ ステル	外-2	吸入剤		フルタイドロタディ スク、フルタイドディスカ	
						ブデゾニド	外-2	吸入剤		バルミコートタービュヘ イラー	
						ブデゾニド(小)	外-2	吸入剤		バルミコート吸入液	
						シクレソニド	外-2	吸入剤		オルベスコインヘラー	
						モメタゾンフランカルボン酸 エステル	外-9	キット		アズマネックスインヘ ラー	
						ベクロメタゾンプロピオン酸 エステル	外-2	吸入剤末 剤		ペコタイド100インヘ ラー、キュバール50 エアゾール、リノコー ト、アルデシンAQ	
気管支拡張剤	気管支喘息、慢性閉塞性肺 疾患	気管支拡張作用	抗コリン作用			イプラトロピウム臭化物	外-2	吸入剤		アトロベント	
				持続型		チオトロピウム臭化物水和	外-9 外-2	キット 吸入剤		スピリーバレスピマ ット スピリーバ吸入用カプ セル	

						グリコピロニウム臭化物	外-2	吸入剤		シーブリ吸入用カプセル
						アクリジニウム臭化物	外-9	キット		エクリラジェヌエア
						ウメクリジニウム臭化物	外-9	キット		エンクラッセエリプタ

226 含そう剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分名	剤形区分	剤形	用法	主な製品	線引き
3	含そう剤	咽頭炎,扁桃炎,口内炎,急性菌肉炎,舌炎,口腔 創傷	創傷治癒促進作用	白血球遊走阻止作用／ヒス タミン遊離抑制作用			アズレンスルホン酸ナトリウム	外－8	含嗽剤			
			配合剤(創傷治癒促進作用)				アズレンスルホン酸ナトリウム ／炭酸水素ナトリウム	外－8	含嗽剤			
		口腔内の消毒	殺菌作用	細胞質膜破壊作用			ドミフェン臭化物	外－8	トローチ			
				蛋白質の酸化による細胞破 壊作用			ホビドンヨード	外－8	含嗽剤			
		歯科用:口腔内の消毒,抜歯創の感染予防	殺菌作用	蛋白変性作用			ベンゼトニウム塩化物	外－8	含嗽剤			

229 その他の呼吸器官用薬

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分名	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
3	その他の呼吸 器官用薬	嚢胞性線維症における肺機能の改善	DNA選択的加水分解作用				ドルナーゼ アルファ (遺伝子組換え)	外-2	吸入剤		ブルモザイム吸入液	

231 止しゃ剤・整腸剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	止しゃ剤、整腸剤	消化管内ガスによる腹部症状	消化管内ガス駆除作用	消泡作用			ジメチコン	内-1	錠剤	1日3回	ガスコン	
								内-2	散剤、細粒剤	1日3回	ガスコン	
								内-3	シロップ剤	1日3回	ガスコンドロップ	
		下痢症	止瀉作用	抗コリン作用			ロペラミド塩酸塩	内-1	錠剤、カプセル剤	1日1～2回	ロペミン	
								内-2	細粒剤	1日1～2回	ロペミン	
							ロペラミド塩酸塩(小)	内-2	細粒剤	1日2～3回	ロペミン	
								内-4	ドライシロップ剤	1日2～3回	ロベカルド	
				収れん作用			タンニン酸アルブミン	内-2	末剤	1日3～4回		
							次硝酸ビスマス	内-2	末剤	1日2～3回		
							次炭酸ビスマス	内-2	末剤	1日3～4回	次炭酸ビスマス「ホエイ」	
				吸着作用			薬用炭	内-2	末剤	1日数回		
							天然ケイ酸アルミニウム	内-2	末剤	1日3～4回	アドソルビン	
				腸内腐敗・発酵抑制作用／ぜん動抑制作用			ベルベリン塩化物	内-1	錠剤	1日3回	塩化ベルベリン錠	
							ベルベリン塩化物水和物／ゲンノショウコエキス	内-1	錠剤	1日3回	フェロベリン配合錠	
		腸内菌叢異常		腐敗細菌増殖抑制作用		(乳酸菌)	ビフィズス菌製剤(1)	内-2	散剤	1日3回	ビフィズゲン	
							ビフィズス菌製剤(2)	内-2	散剤	1日3回	ビフィダー	
							ビフィズス菌製剤(3)	内-2	散剤	1日3回	ミルフリーズ-5	
							ビフィズス菌製剤(4)	内-2	散	1日3回	ラックビー微粒	
							ビフィズス菌製剤	内-1	錠	1日3回		
							ラクトミン	内-2	末剤	1日3回	ビオフェルミン	
								内-2	散剤			
							有胞子性乳酸菌製	内-2	散剤	1日3回	ラクボン	
							カゼイ菌製剤	内-2	散剤	1日3回	ビオラクチス	
						(酪酸菌)	酪酸菌製剤	内-1	錠剤	1日3回	ミヤBM錠	
								内-2	細粒剤	1日3回	ミヤBM細粒	
		抗生物質・化学療法剤投与時の腸内菌叢異常	整腸作用	腐敗細菌増殖抑制作用			耐性乳酸菌製剤(2)	内-2	散剤	1日3回	エンテロノン-R	
							耐性乳酸菌製剤(3)	内-1	錠剤	1日3回	ビオフェルミンR	
								内-2	散剤	1日3回	ビオフェルミンR	
							耐性乳酸菌製剤(4)	内-2	散剤	1日3回	ラックビーR	
		腸内菌叢異常	配合剤(整腸作用)	腐敗細菌増殖抑制作用		配合剤	ビフィズス菌配合剤	内-2	散剤	1日3回	ビオスミン	
							酪酸菌配合剤	内-1	錠剤	1日3回	ビオスリー	
								内-2	散剤		ビオスリー	
		抗生物質・化学療法剤投与時の腸内菌叢異常					耐性乳酸菌配合剤	内-1	カプセル剤	1日3回	ポリラクトン	
								内-2	散剤	1日3回	ラクスパン	
							耐性乳酸菌配合剤	内-1	カプセル剤	1日3回	レベニン	
		過敏性腸症候群	便通調整作用	消化管平滑筋直接作用			トリメプテンマレイン酸塩	内-1	錠剤	1日3回	セレキノン	
				消化管内水分保持作用／消化管内容物輸送調節作用				内-2	細粒剤	1日3回	セレキノン	
							ポリカルボフィルカルシウム	内-2	細粒剤	1日3回	コロネル	
								内-1	錠剤	1日3回		

2	止しゃ剤・整腸 剤	下痢症	止瀉作用	殺菌・蠕動抑制作用			ペルペリン硫酸塩	注-1	注射薬	1日1回皮下 又は筋注	ストブニン	
---	--------------	-----	------	-----------	--	--	----------	-----	-----	----------------	-------	--

232-234 消化性潰瘍用剤・健胃消化剤・制酸剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	消化性潰瘍用 剤等	胃潰瘍、十二指腸潰瘍	胃酸分泌抑制作用	ヒスタミンH2受容体遮断作用			シメチジン	内-1	錠剤	1日2回	タガメット	
								内-2	細粒剤			
							ラニチジン塩酸塩	内-1	錠剤	1日1～2回	ザンタック	
							ファモチジン	内-1	錠剤	1日1～2回	ガスター	
								内-2	散剤			
							ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩	内-1	カプセル剤	1日1～2回	アルタット	
								内-2	細粒		アルタット細粒	
							ニザチジン	内-1	カプセル剤	1日1～2回	アシンン	
								内-1	錠剤			
							ラフチジン	内-1	錠剤	1日1～2回	プロテカジン	
							オメプラゾール	内-1	錠剤	1日1回	オメプラール	
							ランソプラゾール	内-1	カプセル剤	1日1回	タケブロン	
								内-1	錠剤			
							ラベプラゾールナトリウム	内-1	錠剤	1日1回	バリエット	
							エソメプラゾールマグネシウム水和物	内-1	カプセル剤	1日1回	ネキシウムカプセル	
	胃潰瘍	胃酸分泌抑制作用	ムスカリンM1受容体遮断作	抗ガストリン作用			ボノプラザンフマル酸塩	内-1	錠剤	1日1回	タケキャブ	
							ビレンゼピン塩酸塩	内-1	錠剤	1日3～4回	ガストロゼピン	
								内-2	細粒剤			
							糖タンパク	内-1	錠剤	1日3～4回	プロミド	
							多糖体	内-3	液剤	1日3～4回	アルロイドG	
								内-4	トライシロップ [®] 剤			
							含アルミニウム	内-2	細粒剤	1日3回	アルサルミン	
								内-2	顆粒剤			
								内-3	液剤			
							アルジオキサ	内-1	錠剤	1日3～4回	イサロン	
								内-2	細粒剤			
								内-2	顆粒剤			
	粘膜保護作用						イソプレノイド [®]	内-1	カプセル剤	1日2～3回	ゲファニール	
							ヘンズアミド [®]	内-1	錠剤	1日3回	ドグマチール	
								内-1	カプセル剤			
								内-2	細粒剤			
							メチルメチオニンスルホニウムクロライド	内-1	錠剤	1日3回	キャベジンU	
							アミノ酸	内-2	顆粒剤	1日3～4回	グルミン	
							レーグルタミン	内-2	顆粒剤	1日3～4回	グルミン	
							イソプレノイド [®]	内-1	カプセル剤	1日3回	セルベックス	
								内-2	細粒剤			
							エカベトナトリウム	内-2	顆粒剤	1日2回	ガストローム	
							亜鉛錯体	内-2	顆粒	1日2回	プロマック	
								内-1	錠剤			
							アズレン誘導体	内-2	顆粒	1日2回	アズロキサ	
								内-1	錠		アズロキサ錠	
								内-1	カプセル剤	1日3～4回	ノイエル	
								内-2	細粒剤			
							ベネキサートベータデクス塩酸塩	内-1	カプセル剤	1日2回	ウルグート	
							レバミピド	内-1	錠剤	1日3回	ムコスタ	
								内-2	顆粒剤			
							ソファルコン	内-1	錠剤	1日3回	ソロン	
								内-1	カプセル剤			
								内-2	細粒剤			
							イルソグラージンマレイン酸塩	内-1	錠剤	1日1～2回	ガスロンN	
								内-2	細粒剤			

				ビペリジルヘンズアミド	トロキシビド	内-1 内-2	錠剤 細粒剤	1日3回	アブレース	
					アズレンスルホン酸ナトリウム	内-1 内-2 内-2	錠剤 細粒剤 顆粒剤	1日3回	アズノール	
		プロスタグランジン様作用		プロスタグランジン誘導体	ミソプロストール	内-1	錠剤	1日4回	サイトテック	
胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍の自覚症状改善	配合剤(胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍の自覚症状改善)	酸中和作用 + アセチルコリン受容体拮抗作用 + 粘膜修復作用		配合剤	水酸化アルミニウム/ベータナート塩酸塩/Ｌ-グルタミン ケイ酸マグネシウム/臭化フロバンテリン/銅クロロフィリンナトリウム(2) ケイ酸マグネシウム/臭化フロバンテリン/銅クロロフィリンナトリウム(3)	内-2 内-1 内-2	顆粒剤 錠剤 散剤	1日3回 1日3～4回 1日3～4回	複合エビサネートG メサフィリン錠 メサフィリン配合散	
	配合剤(制酸作用 + 粘膜保護作用)	酸中和作用 + 粘膜修復作用		配合剤	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム/メチルメチオニンスルホニウムクロライド	内-2	散剤	1日3回	キャベジンUコーワ散	
	配合剤(制酸作用 + 胃酸分泌抑制作用)	酸中和作用 + アセチルコリン受容体拮抗作用		配合剤	水酸化アルミニウム/酸化マグネシウム/ジサイロミン	内-2	顆粒剤	1日3～4回	コランチル顆粒	
	配合剤(粘膜保護作用 + 粘膜保護作用)	粘膜修復作用 + 粘膜修復作用		配合剤	アズレンスルホン酸ナトリウム/Ｌ-グルタミン	内-2 内-2 内-1	顆粒剤 細粒剤 錠剤	1日3～4回	マーズレン	
胃酸過多、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃炎	制酸作用	酸中和作用		アルミニウム塩	乾燥水酸化アルミニウムゲル	内-2	細粒剤	1日数回	アルミゲル	
				カルシウム塩	合成ケイ酸アルミニウム 沈降炭酸カルシウム	内-2 内-1 内-2	末剤 錠剤 細粒剤	1日3～4回 1日3～4回 1日3回	ノルモザン 炭カル	
				ナトリウム塩	炭酸水素ナトリウム	内-2	末剤	1日数回		
				マグネシウム塩	酸化マグネシウム	内-1 内-2 内-2	錠剤 末剤 細粒剤	1日数回 1日数回	マグラックス	
					炭酸マグネシウム	内-2	末剤	1日数回		
					水酸化マグネシウム	内-1 内-3	錠剤 液剤	1日数回	ミルマグ	
					ケイ酸マグネシウム	内-2	末剤	1日数回		
	配合剤(制酸作用 + 制酸作用)	酸中和作用 + 酸中和作用		配合剤	水酸化アルミニウムゲル/水酸化マグネシウム	内-3	液剤	1日数回	マーロックス	
胃炎等の疼痛	局所麻酔作用	活動電位伝達抑制作用			アミノ安息香酸エチル	内-2	末剤	1日3回	アミノ安息香酸エチル	
					オキセサゼイン	内-1 内-2	錠剤 顆粒剤	1日3～4回 1日3～4回	ストロカイン錠 ストロカイン顆粒	
					ビペリジノアセチルアミノ安息香酸エチル	内-1 内-2	錠剤 顆粒剤	1日1～4回 1日1～4回	ニチカイン錠 ニチカイン顆粒	
低酸症	胃酸補充作用	胃酸様作用			希塩酸	内-3	液剤			
主に胃液分泌促進	食欲増進作用	苦味健胃作用			コンズランゴ	内-3	液剤	1日3回		
					ホミカ	内-2	末剤 散剤	1日3回		
						内-3	液剤	1日3回		
					センブリ	内-2	散剤	1日3回		
消化器不定愁訴(食欲不振、胃部不快感など)	配合剤(制酸作用+健胃作用+消化補助作用)	酸中和作用+苦味健胃作用+芳香健胃作用+消化酵素作用		配合剤	炭酸水素ナトリウム/炭酸カルシウム/メタケイ酸アルミン酸マグネシウム/オウレン/ケイヒ/ウイキョウ/チヨウジ/ショウキョウ/サンショウ/カンゾウ/効チアスターゼ	内-2	散剤	1日3回	S・M散	

					炭酸水素ナトリウム／炭酸カルシウム／メタケイ酸アルミン酸マグネシウム／オウレン／ケイヒ／ウイキョウ／ショウジ／ショウキョウ／サンショウ／カンゾウ／ビオチン／アスターゼ	内-2	散剤	1日3回	マナミンTM散	
		酸中和作用+苦味健胃作用+芳香健胃作用+炭水化物消化酵素作用		配合剤	炭酸水素ナトリウム／炭酸マグネシウム／炭酸カルシウム／水酸化アルミ／ニガキ／オウバク／ケイヒ／ウイキョウ／ショウキョウ／カンゾウ／ジアスメン	内-2	散剤	1日3回	つくしA・M散	
					炭酸水素ナトリウム／炭酸カルシウム／メタケイ酸アルミン酸マグネシウム／オウレン／ケイヒ／ウイキョウ／ショウジ／ショウキョウ／サンショウ／カンゾウ／シアスターゼ	内-2	散剤	1日2～3回	FK散	
		酸中和作用+苦味健胃作用+炭水化物消化酵素作用		配合剤	炭酸水素ナトリウム／ケンチアノ／シアスターゼ	内-2	散剤	1日3回	ビットサン	
	配合剤(制酸作用+健胃作用)	酸中和作用+苦味健胃作用+芳香健胃作用+鎮痙・鎮痛作用		配合剤	炭酸水素ナトリウム／ゲンチアナ／メントール／ロートエキス散	内-2	散剤	1日3回	ベルサン	
		酸中和作用+苦味健胃作用+芳香健胃作用		配合剤	炭酸水素ナトリウム／ケンチアノ／ケイヒ／ショウキョウ／サンショウ／メントール	内-2	散剤	1日3回	ピアサン	
		酸中和作用+苦味健胃作用		配合剤	炭酸水素ナトリウム／センブリ	内-1	錠剤	1日3回	センブリ・重曹錠	
		酸中和作用+苦味健胃作用		配合剤	炭酸水素ナトリウム／ニガ	内-2	散剤		健胃散「スズ」	
タンパク質の消化異常	タンパク質消化補助作用	タンパク分解酵素作用			含糖ペプシン	内-2	末剤	1日3回		
炭水化物の消化異常	炭水化物消化補助作用	炭水化物分解酵素作用			アスベルギルス属菌由来消化酵素	内-2	末剤	1日3回	タカチアスターゼ	
					ジアスターゼ	内-2	末剤	1日3回		
乳糖不耐症	乳糖消化補助作用	乳糖分解酵素作用			β-ガラクトシダーゼ(ベニシリウム)	内-2	細粒剤	1回	ミルラクト	
					ガラクトシダーゼ	内-2	散剤 顆粒剤	1回	ガラントーゼ	
消化異常	消化補助作用	膵消化酵素作用			バンクレアチン(ブタ)	内-2	末剤	1日3回		
膵外分泌機能不全における膵消化酵素の補充	消化補助作用	膵消化酵素作用			バンクレリパーゼ	内-1 内-2	カプセル剤 顆粒剤	1日3回	リバクレオンカプセル	
消化異常	配合剤(消化補助作用)	炭水化物分解酵素作用+タンパク分解酵素作用+膵消化酵素作用		配合剤	サナクターゼ配合剤	内-1	錠剤 カプセル剤	1日3回	エクセラーゼ	
						内-2	顆粒剤	1日3回	エクセラーゼ	
					ジアスターゼ配合剤(1)	内-1 内-2	カプセル剤 顆粒剤	1日3回 1日3回	タフマックE タフマックE	
					ジアスターゼ配合剤(2)	内-2	顆粒剤	1日3回		
					ビオチアスターゼ1000配合剤	内-1	カプセル剤	1日3回	フェルターゼ	
					ビオチアスターゼ2000配合剤	内-1	カプセル剤	1日3回	セブニー・P	

							ヒロダーゼ配合剤	内-1	カプセル剤	1日3回	ボリトーゼ	
							膵臓性消化酵素配合剤(1)	内-2	顆粒剤	1日3回	ボリトーゼ	
2	消化性潰瘍用剤等	上部消化管出血	胃酸分泌抑制作用	ヒスタミンH2受容体遮断作用			シメチジン	注-1	注射薬	1日4回6時間ごとに緩徐に静注、点滴静注	タガメット	
							ラニチジン塩酸塩	注-1 注-2	注射薬 キット	1日3～4回静注又は筋注	ザンタック	
							ファモチジン	注-1	注射薬	1日2回12時間ごとに緩徐に静注、点滴静注	ガスター	
							ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩	注-1	注射薬	1日2回12時間ごとに緩徐に静注、点滴静注	アルタット	
				ムスカリンM1受容体遮断作用			ピレンゼピン塩酸塩	注-1	注射薬	1日2回緩徐に静注、点滴静注	ガストロゼピン	
		経口投与と不可能な出血を伴う胃潰瘍、十二指腸潰瘍	胃酸分泌抑制作用	プロトンポンプ阻害作用			オメプラゾールナトリウム	注-1	注射薬	1日2回点滴静注、静注	オメプラール注用20	
							ランソプラゾール	注-1	注射薬	1日2回点滴静注、静注	タケブロン静注用	
		胃潰瘍、十二指腸潰瘍	粘膜保護作用	粘膜修復作用			スルピリド	注-1	注射薬	1日2回筋注	ドグマチール	
							メチルメチオニンスルホニウムクロライド	注-1	注射薬	1日1～2回静注	キャベジンU	
							幼牛血液抽出物	注-1	注射薬	1日1回	ソルコセリル	
		慢性胃炎	消化液分泌促進作用	副交感神経刺激作用			カルニチン塩化物	注-1	注射薬	1日1回皮下、筋注又は静注	エントミン	

235 下剤・浣腸剤

内注 外区	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	下剤、浣腸剤	便秘症	瀉下作用	浸透圧性作用(腸内水分吸収阻止)		塩類	酸化マグネシウム	内-1	錠剤	1日数回		
								内-2	末剤	1日数回		
							炭酸マグネシウム	内-2	末剤	1日数回		
							水酸化マグネシウム	内-1	錠剤	1日数回	ミルマグ錠	
								内-3	液剤		ミルマグ内用懸濁液	
							硫酸マグネシウム	内-2	末剤	1回		
						糖類	ラクツロース(小)	内-2	散剤	1日3回	モニラック	
								内-3	シロップ剤	1日3回	モニラック	
				膨潤作用(腸内水分吸収阻止)			カルメロースナトリウム	内-2	末剤	1日3回		
				腸管刺激作用		(リチノール酸)	ヒマシ油、加香ヒマシ油	内-3	液剤	とん用		バルコーゼ
							ジフェノール系	内-1	錠剤	1日1回	ラキソベロン	
						アントラキノン配糖体	ビスコスルファートナトリウム	内-2	カプセル剤	1日1回	ピコダルム	
								内-3	顆粒剤	1日1回	ラキソベロン液、スナイリンドライシロップ	
							液剤、ドライシロップ剤					
							カスカラサグラダ流エキス	内-3	液剤			
						センノシド		内-1	錠剤	1日1回	ブルゼニド	
								内-2	顆粒剤	1日1回	ソルドールE	
							センナエキス	内-1	錠剤	1日1回	ヨーデルS	
				浸透圧性作用			人工カルルス塩	内-2	末剤	1日1回		
			配合剤(瀉下作用)	腸管刺激作用+腸管刺激作用		配合剤	センナ/センナ実	内-2	顆粒剤	1日1~2回	アローゼン	
							ダイオウ/センナ	内-1	錠剤	1日3回	セチロ	
				腸管刺激作用+健胃作用+芳香健胃作用+殺菌収斂作用		配合剤	センナ/カンゾウ/ウイキョウ/イオウ	内-2	散剤	1日3回	複方カンゾウ散	
				界面活性作用+腸ぜん動促進作用		配合剤	ジオクチルソジウムスルホサクシネート/カサンスラノール	内-1	錠剤	1日1回、1日2~3回	ベンコール配合錠	
		乳幼児の便秘	瀉下作用	腸ぜん動促進作用	発酵作用		マルツエキス	内-4	液剤	1日2~3回	マルツエキス	
		大腸検査及び大腸手術時の前処置	腸管内容物排泄作用	腸管内への水分移行作用			クエン酸マグネシウム	内-2	散剤	水に溶かし服用	マグコロールP	
								内-3	液剤		マグコロール	
			配合剤(腸管内容物排泄作用)	腸管内洗浄作用		配合剤	ナトリウム・カリウム配合剤	内-2	散剤	水に溶かし経口投与	ニフレック配合内用剤	
							ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合剤	内-2	散剤	水に溶かし経口投与	モビブレップ配合内用剤	
							ビスコスルファートナトリウム水和物・酸化マグネシウム・無水クエン酸	内-2	散剤	水に溶かし経口投与	ピコブレップ配合内用剤	
		大腸検査の前処置					リン酸二水素ナトリウム水和物・無水リン酸水素二ナトリウム	内-1	錠剤	1回5錠	ビジクリア	
		慢性便秘症(器質的疾患による便秘を除く)	瀉下作用	腸液分泌促進作用			ルビプロストン	内-1	カプセル剤	1日2回	アミティーザカプセル	
		便秘型過敏性腸症候群					リナクロチド	内-1	錠剤	1日1回	リンゼス錠	
3	下剤、浣腸剤	便秘	排便促進作用	直腸粘膜刺激作用			ビサコジル	外-6	坐剤	1日1~2回	テレミンソフト	

				潤滑・浸透圧性水分保持作用			グリセリン	外-7	浣腸剤	1回	グリセリン浣腸液	
			配合剤(排便促進作用)	炭酸ガス産生+炭酸ガス産生促進作用		配合剤	炭酸水素ナトリウム/ 無水リン酸二水素ナトリウム	外-6	坐剤	1回	新レシカルボン	

2 3 6 利胆剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用 3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	利胆剤	胆石、胆汁うっ滞	利胆作用	胆汁酸様作用			ケノデオキシコール酸	内-1	カプセル剤	1日2～3回		
							ウルソデオキシコール酸	内-1	錠剤	1日3回		
			排胆作用	コリン様作用(Oddi括約筋弛緩作用)			トレビプトン	内-2	顆粒剤	1日3回		
								内-1	錠剤	1日3回		
								内-2	細粒剤	1日3回		
2	利胆剤	胆汁うっ滞	利胆作用	水分増大作用			デヒドロコール酸	注-1	注射薬	1日1回静注		

239 鎮吐剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	鎮吐剤	消化器不定愁訴(悪心・嘔吐・食欲不振など)	消化管運動改善作用	ドパミン受容体拮抗作用		ベンズアミド	メクロプラミド	内-1	錠剤	1日2～3回	プリンペラン錠	
								内-2	細粒剤	1日2～3回	プリンペラン細粒	
								内-3	シロップ剤	1日2～3回	プリンペランシロップ	
				ドパミンD2受容体拮抗作用		ベンツイミダゾール	ドンペリドン	内-1	錠剤	1日3回	ナウゼリン	
								内-2	細粒剤	1日3回	ナウゼリン	
							ドンペリドン(小)	内-4	ドライシロップ剤	1日3回	ナウゼリン	
				ドパミンD2受容体拮抗作用／アセチルコリンエステラーゼ阻害作用		ベンズアミド	イトブリド塩酸塩	内-1	錠剤	1日3回	ガナトン	
				セロトニン5-HT4受容体刺激作用(アセチルコリン遊離促進)		ベンズアミド	モサブリドクエン酸塩	内-1	錠剤	1日3回	ガスモチン	
								内-2	散剤		ガスモチン	
				消化管平滑筋直接作用			トリメプチンマレイン酸塩	内-1	錠剤	1日3回	セレキノ	
								内-2	細粒剤		セレキノ	
		機能性ディスペプシアにおける食後膨満感、上腹部膨満感、早期満腹感	消化管運動改善作用	アセチルコリンエステラーゼ阻害作用			アコチアミド塩酸塩水和物	内-1	錠剤	1日3回	アコファイド錠	
		抗悪性腫瘍剤投与に伴う悪心・嘔吐	制吐作用	セロトニン5-HT3受容体拮抗作用			グラニセトロン塩酸塩	内-2	細粒剤	1日1回	カイトリル細粒	
								内-1	錠剤		カイトリル錠	
								内-3	ゼリー			
								内-2	細粒剤	1日1回	カイトリル	
							オンダンセトロン塩酸塩	内-1	錠剤	1日1回	ゾフラン	
								内-3	シロップ剤	1日1回	ゾフラン	
							オンダンセトロン	内-1	錠剤	1日1回	ゾフランザイデス	
							アザセトロン塩酸塩	内-1	錠剤	1日1回	セロトーン	
							ラモセトロン塩酸塩	内-1	錠剤	1日1回	ナゼアOD	
							インジセトロン塩酸塩	内-1	錠剤	1日1回	シンセロン錠	
				サブスタンスP/ニューロキニン(NK1)受容体拮抗作用			アプレビタント	内-1	カプセル	1日1回	イメンドカプセル	
		消化管内ガスによる腹部症状	消化管内ガス駆除作用	消泡作用			ジメチコン	内-1	錠剤	1日3回	ガスコン	
								内-2	散剤	1日3回	ガスコン	
								内-3	散剤、細粒シロップ剤	1日3回	ガスコンドロップ	
2	鎮吐剤	消化器不定愁訴(悪心・嘔吐・食欲不振など)	消化管運動調整作用	ドパミン受容体拮抗作用			メクロプラミド塩酸塩	注-1	注射薬	1日1～2回筋注又は静注	プリンペラン	
		術前・術後の悪心・嘔吐 抗癌剤投与による悪心・嘔吐	条件反射抑制作用 制吐作用	ドパミン受容体拮抗作用 セロトニン5-HT3受容体拮抗作用			ブロクロルペラジン	注-1	注射薬	1日1回筋注	ノバミン	
							グラニセトロン塩酸塩	注-1	注射薬	1日1回静注又は点滴静注	カイトリル	
								注-2	キット	1日1回点滴静注	カイトリル点滴静注用3mg/バッグ	
							アザセトロン塩酸塩	注-1	注射薬	1日1回静注	セロトーン	
							オンダンセトロン塩酸塩	注-1	注射薬	1日1回緩徐に静注	ゾフラン	
								注-2	キット			
							パロノセトロン塩酸塩	注-1	注射薬	1日1回静注又は点滴静注	アロキシ静注	
								注-2	キット	1日1回静注又は点滴静注	アロキシ点滴静注バッグ	
							ラモセトロン塩酸塩	注-1	注射薬	1日1回静注	ナゼア	

				サブスタンスP/ニューロキニン(NK1)受容体拮抗作用			ホスアプレピタントメグルミン	注-1	注射薬	1日1回点滴静注	プロイメンド点滴静注用	
3	鎮吐剤	消化器不定愁訴(悪心・嘔吐・食欲不振など)	消化管運動改善作用	ドパミンD2受容体拮抗作用			ドンペリドン	外-6	坐剤	1日2回	ナウゼリン	
							ドンペリドン(小)	外-6	坐剤	1日2～3回	ナウゼリン	

239 その他の消化器官用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	止しゃ剤・整腸 剤	潰瘍性大腸炎	消炎作用	(免疫抑制作用)		5-アミノサリチル酸	メサラジン	内-1 内-2	錠剤 顆粒剤	1日3回	ペンタサ錠 ペンタサ顆粒	
							メサラジン	内-1	錠剤	1日3回	アサコール錠	
							メサラジン	内-1	錠剤	1日1回	リアルタ錠	
							サラゾスルファピリジン	内-1	錠剤	1日4～6回	サラゾピリン	
		クローン病	抗炎症作用	ステロイドレセプター結合作用		ステロイド	ブデソニド	内-1	カプセル剤	1日1回	ゼンタコートカプセル	
	その他の消化 器官用剤	頭頸部の放射線治療に伴う口腔乾燥症状の改善	唾液分泌促進作用	ムスカリン受容体刺激作用			ピロカルピン塩酸塩	内-1	錠剤		サラジェン	
		シェーグレン症候群患者の口腔乾燥症状				キヌクリジン誘導体	セビメリン塩酸塩水和物	内-1	カプセル剤		エボザックカプセル	
		タバコ、医薬品等の誤飲時における催吐	催吐作用	5-HT ₃ 受容体刺激作用		アルカロイド	トコン	内-2	末剤			
3	止しゃ剤・整腸 剤	潰瘍性大腸炎	消炎作用	(免疫抑制作用)		5-アミノサリチル酸	メサラジン	外-7 外-6	注腸剤 坐剤	1日1剤	ペンタサ ペンタサ坐剤	
							サラゾスルファピリジン	外-6	坐剤	1日2回	サラゾピリン	
							ステロイドレセプター結合作用					
							ステロイド	外-6 外-7	坐剤 注腸液	1日1～2回 1回	リンデロン ステロネマ	

241－249 ホルモン剤・抗ホルモン剤

内注 外区	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	ホルモン剤・抗 ホルモン剤	中枢性尿崩症・尿浸透圧あるいは尿比重の 低下に伴う夜尿症	抗利尿作用	脳下垂体ホルモン；バソプレ シン様（腎尿細管水再吸収 促進）作用		ペプチド（バソ プレシン誘導 体）	デスモプレシン酢酸塩水和 物	内-1	錠剤	1日1回 1日1～3回	ミニリンメルトOD錠	
		甲状腺機能低下症	甲状腺ホルモン補充作用			T3、T4	乾燥甲状腺（食用獣由来）	内-2	末剤	1日15～40mg開始、維持量1日 40～200mg	チラーヂン	
						T3	リオチロニンナトリウム	内-1	錠剤	初回量1日 5～25ugを1～2週 間間隔で少しずつ増量し、維持 量1日25～75ug	チロナミン	
						T4	レボチロキシンナトリウム	内-1	錠剤	1日1回 0.025～0.4mg、一般 に0.025～0.1mg/kg開始、維 持量 0.1～0.4mg	チラーヂンS	
						レボチロキシンナトリウム （小）	内-2	散剤	乳幼児：1日1回 10ug/kg、 未熟児：1日1回 5ug/kg開 始、8日目から1回 10ug/kg	チラーヂンS		
		甲状腺機能亢進症	甲状腺機能抑制作用	抗甲状腺ホルモン作用			チアマゾール	内-1	錠剤	初期量1日30mgを3～4回で、 重症の場合1日40～60mg、機 能亢進症状がほぼ消失したな ら1～4週間ごとに漸減し、維持 量1日 5～10mgを1～2回	メルカゾール	
							プロピルチオウラシル	内-1	錠剤	初期量1日300mgを3～4回で、 重症の場合1日400～600mg、 機能亢進症状がほぼ消失した なら1～4週間ごとに漸減し、維 持量1日 50～100mgを1～2回	チウラジール	
		著しい消耗状態	蛋白合成促進作用	蛋白同化ホルモン作用	ステロイドレセ プター結合／特 異的蛋白生 成促進作用	ステロイド	メテノロン酢酸エステル	内-1	錠剤	1回 100mg、1～2週間ごと	ブリモボラン	
		塩喪失型先天性副腎皮質過形成症、アジソ ン病	ナトリウム貯留作用	硬質副腎皮質ホルモン（アル ドステロン）作用		ステロイド（コ ルチゾン系）	フルドロコルチゾン酢酸エス テル	内-1	錠剤	1日0.02～0.1mg、1日2～3回 で	フロリネフ	
		副腎皮質機能不全、炎症性疾患、自己免疫 疾患、臓器移植、腫瘍	抗炎症作用／免疫抑制作 用	糖質副腎皮質ホルモン作用	ステロイドレセ プター結合、特 異的蛋白生 成促進作用	ステロイド（コ ルチゾン系）	コルチゾン酢酸エステル	内-1	錠剤	1日12.5～150mg、1日1～4回 で	コートン	
							ヒドロコルチゾン	内-1	錠剤	1日10～120mg、1日1～4回で	コートリル	
						ステロイド（プレ ドニゾン系）	プレドニゾン	内-1	錠剤	1日 5～60mg、1日1～4回で	プレドニン	
							メチルプレドニゾン	内-2	散剤	1日 5～60mg、1日1～4回で	プレドニゾン	
							メチルプレドニゾン	内-1	錠剤	1日 4～48mg、1日1～4回で	メドロール	
						ステロイド（フッ 素付加）	トリアムシノロン	内-1	錠剤	1日 4～48mg、1日1～4回で	レダコート	
							デキサメタゾン	内-1 内-3 内-1	錠剤 液剤 錠剤	1日 0.5～8mg、1日1～4回で 1日 0.15～4mg、1日1～4回で 1日40mg、1日1回、4日間	デカドロン デカドロンエリキシ レナデックス	
							ベタメタゾン	内-1 内-2 内-3	錠剤 散剤 シロップ剤	1日 0.5～8mg、1日1～4回で 1日 0.5～8mg、1日1～4回で 1日 0.15～4mg、1日1～4回で	リンデロン リンデロン リンデロン	
		副腎皮質ホルモン分泌過剰症	アルドステロン・コルチゾール分泌抑 制作用 ステロイド分泌改善作用	3 β -hydroxysteroid脱水素酵 素阻害作用 副腎皮質ホルモン合成阻害作 用		ステロイド	トリロスタン	内-1	錠剤	1日初期量 240mg、維持量240 ～480mg、3～4回で	デゾバン	
		透析施行中の腎性貧血	造血作用	骨髓 CFU-E（赤芽球コロニー 形成細胞）増加作用		非ステロイド	ミトタン	内-1	カプセル剤	1回500～1,000mg、1日3回か ら開始	オベプリム	
		蕁麻疹、湿疹・皮膚炎、薬疹、アレルギー 性鼻炎	配合剤（免疫抑制作用／鎮 痒作用）	ホスホリハートA2阻害／抗ヒス タミン作用		ステロイド（アン ドロスタン系） 配合剤	メピチオスタン ベタメタゾン／d-マレイン 酸クロルフェニラミン	内-1 内-3 内-1	錠剤 シロップ剤 錠剤	1回1～2錠 1回 5～10mL 1日20～50mg	セレスタミン セレスタミン エナロン	
		男子性腺機能不全	アンドロゲン補充作用	アンドロゲン作用		ステロイド	メチルテストステロン	内-1	錠剤			

血友病A、von Willebrand病	止血作用	内因性第VIII因子・von Willebrand因子放出作用		ペプチド(ハソ レン誘導体)	デスモブレシン酢酸エステ ル	注-1	注射薬	10～20分かけて緩徐に静注	デスモブレシン	
甲状腺機能亢進症	甲状腺機能抑制作用	抗甲状腺ホルモン作用			チアマゾール	注-1	注射薬	1日3～4回で、機能亢進症状 がほぼ消失したなら1～4週間 ごとに漸減	メルカゾール	
著しい消耗状態	蛋白合成促進作用	蛋白同化ホルモン作用		ステロイド(ノ ルテストステロ ン系)	ナンドロロンデカン酸エステ ル	注-1	注射薬	1回25～35mg、3週間ごとに筋 注	デカ-デュラボリン2 5	
					メテノロンエナント酸エステ ル	注-1	注射薬	1回100mg、1～2週間ごとに筋 注	プリモボラン・デポー 50mg	
急性低血圧・ショック、局所出血、局所麻酔薬 の作用延長、気管支けいれん、心停止		交感神経 α 、 β 受容体刺激 作用		カテコールアミ ン	アドレナリン	注-1 注-2	注射薬 キット	1回0.2～1mgを皮下注、筋注	ボスミン注	
						注-2	キット	1回0.15又は0.3mgを筋注	エビベン注射液	
急性低血圧・ショック	血圧上昇作用	交感神経 α 受容体刺激作 用		カテコールアミ ン	ノルアドレナリン	注-1	注射薬	点滴静注：1回1mg、皮下注 射：1回0.1～1mg	ノルアドリナリン	
急性心不全	利尿作用／血管拡張作用	α 型ヒト心房性Na利尿ペプ チド受容体刺激作用			カルペリチド	注-1	注射薬	1分間当たり0.1 μ g/kgを持続 静注	ハンブ注射用1000	
副腎皮質機能不全、炎症性疾患、自己免疫 疾患、臓器移植、腫瘍	抗炎症作用／免疫抑制作 用／代謝・循環改善作用	糖質副腎皮質ホルモン作用 (ステロイドレセプター結合、特異 的蛋白生成促進)		ステロイド(コ ルチゾン系)	ヒドロコルチゾンコハク酸エ ステルナトリウム	注-1	注射薬	静注、点滴静注、筋注：1回50 ～100mgを1日1～4回、緊急 時1回 1回250～1,000mgを静注又は 点滴静注	ソル・コーテフ	
					ヒドロコルチゾンリン酸エス テルナトリウム	注-1	注射薬	1日1回又は数回、1回100～ 1,000mgを静注又は点滴静注	ソル・コーテフ250	
				ステロイド(ブ レドニゾン系)	ブレドニゾンコハク酸エス テルナトリウム	注-1	注射薬	静注、筋注：1回10～50mg、3～ 6時間ごと、点滴静注：1回20～ 100mg、1日1～2回	水溶性ブレドニン	
					メチルブレドニゾンコハク 酸エステルナトリウム	注-1	注射薬	1回125～2000mgを緩徐に静注 又は点滴静注	ソル・メドロール	
					メチルブレドニゾン酢酸エ ステル	注-1	注射薬	筋注：1回40～120mg、1～2週 おき	デボ・メドロール	
				ステロイド(フッ 素付加)	トリアムシノロンアセトニド	注-1	注射薬	筋注：1回20～80mg、1～2週 おき、関節腔内注射等：1回2～ 40mg、原則として投与間隔2週 間以上	筋注用ケナコルトー A(4%)	
					デキサメタゾンバルミチン酸 エステル	注-1	注射薬	1回4mg、2週に1回静注	リメタゾン	
					デキサメタゾンリン酸エステ ルナトリウム	注-1	注射薬	静注、筋注：1回2～8mg、3～6 時間ごと、点滴静注：1回2～ 10mg、1日1～2回 1日1回又は数回0.5～4mg/kg 静注	コルゾン(0.4%,0.5%)	
					ベタメタゾンリン酸エステル ナトリウム	注-1	注射薬	静注、筋注：1回2～8mg、3～6 時間ごと、点滴静注：1回2～ 10mg、1日1～2回 1回0.5～4mg/kg静注	デカドロンS(2%)	
									リンデロン(0.4%)	
									リンデロン(2%)	
アレルギー性鼻炎、慢性関節リウマチ、関節 炎	配合剤(抗アレルギー、抗炎 症、免疫抑制作用)	糖質副腎皮質ホルモン作用 ／糖質副腎皮質ホルモン作 用		配合剤	ベタメタゾン酢酸エステル／ ベタメタゾンリン酸エステル ナトリウム	注-1	注射薬	筋注：1回0.1～1mL、症状によ り3～4時間ごと、関節腔内注 射等：1回0.1～1.5mL、原則と して投与間隔2週間以上、局所 皮内注射：1回1～3mL、鼻腔内 注入：1回1～3mL、1日1～数 回	リンデロン懸濁注	
男子性腺機能不全、男子不妊症	男性ホルモン補充作用			ステロイド	テストステロンプロピオン酸 エステル	注-1	注射薬	1回25～50mg、1～3日間ごと に筋注	エナルモン	
					テストステロンエナント酸エ ステル	注-1	注射薬	1回100mg、7～10日間ごとに 又は1回250mg、2～4週間ごと に筋注	エナルモンデポー	
前立腺肥大症	前立腺重量抑制作用	抗アンドロゲン作用		ステロイド	ゲストロンカブロン酸エス テル	注-1	注射薬	1週1回200mg殿筋注	デボスタット	
視床下部性性腺機能低下症	ゴナドトロピン分泌促進作用	下垂体受容体刺激作用		ペプチド(LH- RH)	ゴナドレリン酢酸エステル	注-1	注射薬	1日12回(2時間間隔)皮下注	ヒポクライン	

	低ゴナドトロピン性男子性腺機能低下症における精子形成の誘導	ゴナドトロピン作用(精子形成作用)／卵胞ホルモン作用			ホリトロピナルファ(遺伝子組換え)	注-1 注-2	注射薬 キット	週3回皮下投与	ゴナールエフ	
	中枢性思春期早発症	ゴナドトロピン分泌抑制作用	持続的下垂体前葉刺激作用(受容体 down regulation)		ペプチド(LH-RH誘導体)	注-1	注射用 (徐放製剤)	4週1回30ug/kg皮下注	リュープリン	
	更年期障害、乳汁分泌不全	細胞呼吸促進作用／創傷治癒促進作用			胎盤抽出物	注-1	注射薬	1日1回、毎日又は隔日皮下注	メルスモン	
	更年期障害	配合剤(ホルモン補充作用)	卵胞ホルモン作用／アンドロゲン作用		配合剤	エストラジオール／テストステロン(1)	注-1	注射薬	2～4週ごとに1回1mL筋注	エスジン・デボー
						エストラジオール／テストステロン(2)	注-1	注射薬	2～4週ごとに1回1mL筋注	ボセルモンデボー50mg
						エストラジオール／テストステロン	注-1	注射薬	1日1回又は隔日に1回1～2mL、筋注又は皮下注	ボセルモン結晶浮游液5.0mg
						エストラジオール吉草酸エステル／テストステロンエナント酸エステル	注-1	注射薬	2～4週ごとに1回1mL筋注	プリモジアン・デボー
	無月経	配合剤(ホルモン補充作用)	黄体ホルモン作用／卵胞ホルモン作用		配合剤	ヒドロキシprogesteronカプロン酸エステル／エストラジオールプロピオン酸エステル	注-1	注射薬	1週間に1回1mL筋注	E・P・ホルモンデボー
	機能性子宮出血					ヒドロキシprogesteronカプロン酸エステル／エストラジオール安息香酸エステル	注-1	注射薬	1週間に1回1mL筋注	ルテスデボー注
	卵巣機能低下	卵胞ホルモン作用			ステロイド(エストロゲン系)	エストラジオール安息香酸エステル	注-1	注射薬(懸濁)	1回0.1～5mg、隔日又は毎日1回筋注又は皮下注	オバホルモン水懸注
						エストラジオールプロピオン酸エステル	注-1	注射薬(油性)	1回1～10mg、1週～1カ月ごとに筋注	オバホルモンデボー
						エストラジオール吉草酸エステル	注-1	注射薬	1回5～10mg、1～4週間ごとに筋注	プロギノン・デボー
					ステロイド(エストロゲン系)	エストリオールトリプロピオン酸エステル	注-1	注射薬	1回5～10mg、7～10日ごとに皮下又は筋注	エストリール・デボー
						エストリオール	注-1	注射薬(懸濁)	1回5～10mg、7～10日ごとに皮下又は筋注	ホーリン
	月経異常、黄体機能不全	黄体ホルモン作用			ステロイド(エストロゲン前駆体)	プラステロン硫酸エステルナトリウム	注-1	注射薬	1回100～200mg、週2～3回静注	マイリス
					ステロイド(プロゲステロン系)	プロゲステロン	注-1	注射薬	1日10～50mg、1～2回に分け筋注	プロゲストン
						ヒドロキシprogesteronカプロン酸エステル	注-1	注射薬	1週1回65～125mg筋注	オオホルミンルテウムデボー
	排卵誘発	卵胞成熟作用	卵胞ホルモン作用		ペプチド	下垂体性性腺刺激ホルモン	注-1	注射薬	1日卵胞成熟ホルモンとして、75～150IUを連続筋注	ヒュメゴン
						精製下垂体性性腺刺激ホルモン	注-1	注射薬	1日卵胞成熟ホルモンとして、75～150IUを連続皮下注又は筋注	フェルティノームP
						フオリトロピンベータ(遺伝子組換え)	注-1 注-2	注射薬 キット	1日50IUを7日間連続皮下注又は筋注	フォリスチム
			黄体形成ホルモン作用		ペプチド	注射用ヒト絨毛性腺刺激ホルモン	注-1	注射薬	1日3000～5000単位を筋注	ゴナトロピン1000
						コリオゴナドトロピン アルファ(遺伝子組換え)	注-2	キット	1日1回250μg皮下投与	オビドレル
	子宮内膜症	下垂体反応性低下作用／ゴナドトロピン分泌抑制作用	持続的下垂体受容体刺激作用		ペプチド(LH-RH誘導体)	リュープロレリン酢酸塩	注-1 注-2	注射薬(徐放製剤) キット(徐放製剤)	4週に1回皮下注 4週に1回皮下注	リュープリン リュープリンキット
						ブセレリン酢酸塩	注-2	キット	4週に1回皮下投与	スプレキュアMP
						ゴセレリン酢酸塩	注-2	キット(徐放製剤)	4週ごとに前腹部皮下投与	ゾラデックスデポ1.8mg
	骨折の危険性の高い骨粗鬆症	骨形成促進作用				テリパラチド(遺伝子組換え)	注-2	キット	1日1回24カ月まで	フォルテオ皮下注キット600μg
						テリパラチド酢酸塩	注-1	注射薬	1週に1回皮下投与 72週まで	テリボン皮下注用
	脂肪萎縮症	糖代謝改善作用、脂質代謝改善作用				メトレレプチン(遺伝子組換え)	注-1	注射薬	1日1回皮下注	メトレレプチン皮下注用

3	ホルモン剤・抗 ホルモン剤	中枢性尿崩症	抗利尿作用	脳下垂体ホルモン；バソプレ シン様（腎尿細管水再吸収 促進）作用		ペプチド（バソ プレシン誘導 体）	デスモプレシン酢酸塩	外-2	噴霧剤 （点鼻液）	1日1～2回鼻腔内に投与	デスモプレシン	
									噴霧剤 （鼻腔内）	1日1～2回鼻腔内に投与	デスモプレシン・スプ レー	
		夜尿症	抗利尿作用	脳下垂体ホルモン；バソプレ シン様（腎尿細管水再吸収 促進）作用		ペプチド（バソ プレシン誘導 体）	デスモプレシン酢酸塩	外-2	噴霧剤 （鼻腔内）	1日1回鼻腔内に投与	デスモプレシン・スプ レー10協和	
		局所出血、鼻粘膜の充血、局所麻酔薬の作 用延長、気管支けいれん	末梢血管収縮／気管支拡 張作用	交感神経 α 、 β 受容体刺激 作用		カテコールアミ ン	アドレナリン	外-1	液剤	希釈し吸入、直接塗布、点鼻な ど	ボスミン	
		中枢性思春期早発症	ゴナドトロピン分泌抑制作用	持続的下垂体前葉刺激作 用（受容体 down regulation）		ペプチド（GnRH 誘導体）	ブセレリン酢酸塩	外-2	噴霧剤 （鼻腔内）	1日3～6回	スプレキュア	
		更年期障害、卵巣欠落症状（ホルモン補充療法）	卵胞ホルモン補充作用	ステロイドレセプター結合作用／ 特異的蛋白生成促進作用		ステロイド	エストラジオール	外-5	貼付剤	1枚を下腹部、背部のいずれか に貼付、2日ごとにはりかえる	エストラーナテープ	
							エストラジオール	外-1	軟膏（ゲ ル）剤	1日1回	ディビゲル	
			卵胞ホルモン補充作用／黄 体ホルモン補充作用				エストラジオール／ノルエチ ステロン酢酸エステル	外-5	貼付剤 （配合剤）	3～4日毎に1回	メノエイドコンビパッ チ	
		子宮内膜症、子宮筋腫	ゴナドトロピン分泌抑制作用	持続的下垂体前葉刺激作 用（受容体 down regulation）		ペプチド（GnRH 誘導体）	ブセレリン酢酸塩	外-2	噴霧剤 （鼻腔内） 回	月経周期1～2日目から1日3 回	スプレキュア	
							ナファレリン酢酸塩	外-2	噴霧剤 （鼻腔内） 回	月経周期1～2日目から1日2 回	ナサニール	
		過多月経	黄体ホルモン補充作用				レボノルゲストレル	外-6	錠剤	子宮腔内に装着する	ミレーナ	

251 泌尿器官用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き				
1	泌尿器官用剤	前立腺肥大に伴う排尿障害	配合剤(前立腺肥大の腺組織・周囲組織の浮腫性腫脹の消退)			配合剤	グルタミン酸／アラニン／アミノ酢酸	内－1	カプセル剤	1日3回	バラプロスト配合カプセル					
			配合剤(前立腺腫結合組織膨腫改善作用＋膀胱頸部周辺のうっ血・炎症消退作用＋膀胱排尿筋収縮力増強作用)			配合剤	オオウメガサソウエキス／ハコヤナギエキス／セイヨウオキナグサエキス／スギナエキス／コムギ胚芽油(1)	内－1	錠剤	1日3回	エビプロスタット配合錠					
			前立腺に対する消炎作用				セルニチンボーレンエキス	内－1	錠剤	1日2～3回	セルニルトン錠					
			α 1受容体遮断作用				タムスロシン塩酸塩	内－1	錠剤 カプセル剤	1日1回	ハルナールD錠					
							シロドシン	内－1	錠剤	1日2回	ユリーフ錠					
							ナフトビジル	内－1	錠剤	1日1回	フリバス錠					
							ウラビジル	内－1	カプセル剤	1日2回	エブランチルカプセル					
							テラゾシン塩酸塩	内－1	錠剤	1日2回	ハイトラシン錠					
							ブラゾシン塩酸塩	内－1	錠剤	1日2～3回	ミニブレス錠					
			ホスホジエステラーゼ5阻害作用					タダラフィル	内－1	錠剤	1日1回	ザルティア錠				
			過活動膀胱、神経因性膀胱、不安定膀胱における頻尿・尿意切迫感・尿失禁	膀胱平滑筋弛緩作用(抗コリン作用(抗ムスカリン作用))				オキシブチニン塩酸塩	内－1	錠剤	1日3回	ボラキス錠				
							ベンジル酸誘導体	プロピベリン塩酸塩	内－1 内－2	錠剤 細粒剤	1日1回	バップフォー錠 バップフォー細粒				
								ソリフェナシンコハク酸塩	内－1	錠剤	1日1回	ベシケア錠				
							酒石酸トルテロジン	内-1	カプセル剤	1日1回	デトルシートルカプセル					
							イミダフェナシン	内-1	錠剤	1日2回	ウリトス錠 ステープラ錠					
							フェソテロジンフマル酸塩	内-1	錠剤	1日1回	トビエース錠					
							選択的 β 3アドレナリン受容体刺激作用				ミラベグロン	内-1	錠剤	1日1回	ベタニス錠	
							神経性頻尿、慢性前立腺炎・慢性膀胱炎に伴う頻尿・残尿感	膀胱平滑筋弛緩作用／膀胱充満時律動収縮抑制作用				フラボキサート塩酸塩	内－1	錠剤	1日3回	ブラダロン錠
		内－2	顆粒	1日3回	ブラダロン顆											
		腹圧性尿失禁	膀胱平滑筋弛緩作用(β 2受容体刺激作用)／尿道括約筋収縮作用				クレンブテロール塩酸塩	内－1	錠剤	1日2回	スピロベント錠					
								内－2	顆粒	1日2回	スピロベント顆粒					
		尿路結石	尿路結石生成の要因を抑制＋排泄促進及び症状の緩解				ウラジログシエクス	内－1	錠剤	1日3回	ウロカルン錠					
		3	泌尿器官用剤	前立腺及び膀胱疾患の経尿道的手術時、その他泌尿器科手術時並びに術後の洗浄	尿道、膀胱の開存性の維持／内視鏡視野の確保／切除組織片・血液の除去				D－ソルピトール	外－1	液剤(灌流)	手術など必要に応じて適宜増減	ウロマチックS			
過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿及び切迫性尿失禁	膀胱平滑筋弛緩作用(抗コリン作用(抗ムスカリン作用))						オキシブチニン塩酸塩	外－5	貼付剤	1日1回1枚を貼付	ネオキシテープ					

252 生殖器官用剤

内注外 区分	分類名	主たる効能	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
3	生殖器官用剤	非特異性膣炎	自浄作用回復作用／膣粘膜 細胞角化促進作用／炎症に 対する膣抵抗増強作用 蛋白合成阻害作用				エストリオール	外－6	膣錠		ホーリンV錠	
						クロラムフェニコ ール系	クロラムフェニコ ール	外－6	膣錠		クロマイ膣錠	
		カンジダ起因膣炎、外陰膣炎	細胞質膜変性作用 細胞膜合成阻害作用			アゾール系 イミダゾール系	クロトリマゾール	外－6	膣錠		エンベシド膣錠	
							オキシコナゾール硝 酸塩	外－6	膣錠		オキシナゾールV100	
							ミコナゾール硝酸塩	外－6	膣坐剤		フロリド膣坐剤	
							イソコナゾール硝酸 塩	外－6	膣錠		アデスタンG100	
		トリコモナス膣炎	抗原虫作用				チニダゾール	外－6	膣錠		ハイシジン膣錠	
							メトロニダゾール	外－6	膣錠		メトロニダゾール錠	

253 子宮収縮剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分名	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	子宮収縮剤	子宮収縮促進並びに子宮出血の予防・治療 (胎盤娩出後、子宮復古不全、流産、人工妊 娠中絶) 妊娠末期における陣痛誘発並びに陣痛促進	子宮平滑筋選択的収縮作用 ／出血量減少作用(胎盤娩 出期短縮) 子宮頸管熟化作用／子宮収 縮作用／分娩誘発作用				メチルエルゴメトリン マレイン酸塩 ジノプロストン	内ー1	錠剤	1日2～4回 1時間ごとに6回	バルタンM錠 プロスタグランジンE 2	
2	子宮収縮剤	子宮収縮促進並びに子宮出血の予防・治療 (胎盤娩出前後、弛緩出血、子宮復古不全、 帝王切開術、流産、人工妊娠中絶) 子宮収縮の誘発、促進並びに子宮出血の治 療(分娩誘発、微弱陣痛、弛緩出血、胎盤娩 出前後、子宮復古不全、帝王切開術、流産、 分娩後の子宮弛緩、産褥時の出血)	子宮平滑筋選択的収縮作用 ／出血量減少作用(胎盤娩 出期短縮) 子宮収縮作用				エルゴメトリンマレイ ン酸塩 メチルエルゴメトリン マレイン酸塩 ヘフチド	注ー1	注射薬	1回0.2mg、皮下 注、筋注又は静 注 1回 0.1～0.2mg 静注、又は1回 0.2mg皮下注、筋 点滴静注	エルゴメトリン注射液 F メテナリン アトニー-O	
		妊娠末期における陣痛誘発・陣痛促進・分娩 促進、卵膜外投与(治療的流産)	子宮収縮作用／分娩誘発作 用				プロスタグランジンF2 α誘導体 ジノプロスト	注ー1	注射薬	1回緩徐に静注 点滴静注／持続 静注	プロスタルモン・F注 射薬50 プロスタルモン・F注 射薬100	
3	子宮収縮剤	妊娠中期の治療的流産	子宮収縮作用／子宮頸管拡 大作用				プロスタグランジンE1 誘導体 ゲメプロスト	外ー6	坐剤	3時間ごとに挿 入	フレグランディンP	

255 痔疾用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	痔疾用剤	痔核の症状の緩解	血栓、出血抑制作用／浮腫抑制作用／創傷治癒促進作用				トリベノシド	内ー1	カプセル剤	1日3回	モトクロン	
			循環機能調節作用／線維素溶解作用／抗炎症抗浮腫作用／組織修復作用				静脈血管薬エキス(雑食動物)	内ー1	舌下錠	1日3回	ヘモリンガル	
			肉芽形成促進作用／消炎、鎮痛作用				メリロートエキス	内ー1	錠剤	1日75～300mg、3回	タカベンス錠	
			配合剤(血栓器質化作用＋緩下作用)			配合剤	パラフレボン／センナ末	内ー1	錠剤	1日3回	サーカネットン	
			配合剤(消炎作用／抗浮腫作用＋血管壁透過性抑制作用／末梢循環促進作用／抗凝血作用／組織修復促進作用)				プロメライン／トコフェロール酢酸エステル	内ー1	錠剤	1日3～4回	ヘモナーゼ	
2	痔疾用剤	内痔核	上痔静脈圧迫閉塞作用／止血作用／痔核の硬化萎縮作用				フェノール	注ー1	注射薬	1回5mLを粘膜下に注射	パオスクレー	
			配合剤(炎症惹起作用／組織硬化作用／血流量減少作用)			配合剤	硫酸アルミニウムカリウム／タンニン酸	注ー1	注射薬	1つの主痔核あたり2%溶液として9～13mL	ジオン注生食液付、同無痛化剤付	
3	痔疾用剤	痔核・裂肛の症状の緩解	殺菌作用／局所の創傷治癒促進作用				大腸菌死菌	外ー1	軟膏剤	1日1～3回塗布又は注入	ポステリザン軟膏	
			配合剤(鎮痛作用＋粘膜保護作用)			配合剤	リドカイン／アミノ安息香酸エチル／次没食子酸ビスマス	外ー6	坐剤	1日1個、1日1～3回肛門内に挿入	ヘルミチンS坐剤	
			配合剤(局所感染防御作用／肉芽形成促進作用＋抗炎症作用)			配合剤	大腸菌死菌／ヒドロコルチゾン	外ー1	軟膏剤	1日1～3回塗布又は注入	強力ポステリザン(軟膏)	
								外ー6	坐剤	1日1～3回肛門内に挿入	ポステリザンF坐薬	
			配合剤(抗炎症作用＋殺菌作用＋鎮痛作用＋収斂、止血作用)			配合剤	ヒドロコルチゾン／硫酸フラジオマイシン／塩酸ジブカイン／エスクロシド	外ー1	軟膏剤	1日1～3回塗布又は注入	プロクトセディル軟膏	
								外ー6	坐剤	1日1～3回、1回1個肛門内に挿入	プロクトセディル坐薬	
			配合剤(抗炎症作用＋鎮痛作用)			配合剤	ジフルコルトロン吉草酸エステル／リドカイン	外ー1	軟膏剤	1日2回肛門内に注入	ネリプロクト軟膏	
								外ー6	坐剤	1日2回肛門内に挿入	ネリプロクト坐剤	
			配合剤(抗うつ血作用／血栓形成抑制作用／門脈血流量低下状態改善作用／浮腫抑制作用／血管透過性亢進抑制作用／創傷治癒促進作用＋末梢性鎮痛作用)			配合剤	トリベノシド／リドカイン	外ー1	軟膏剤	1日2回	ボラザG軟膏	
								外ー6	坐剤	1日2回朝夕塗布又は注入	ボラザG坐剤	

		肛門疾患における鎮痛・鎮 痙、肛門のびらん・炎症	配合剤(鎮けい作用／鎮痛作用＋ 局所収斂作用／止血作用)			配合剤	ロートエクス／タン ニン酸	外－6	坐剤	1日1～3回 肛門内に挿 入	ロートエクス・タンニ ン坐剤「サトウ」	
--	--	-----------------------------	---------------------------------	--	--	-----	------------------	-----	----	----------------------	------------------------	--

259 その他の泌尿器生殖器官用薬

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1		切迫早産、切迫流産	子宮収縮抑制作用	子宮筋β ₂ 受容体刺激作用 ／オキシトシン誘発作用			リトドリン塩酸塩	内-1	錠剤	1日3回	ウテメリン錠	
2	その他の泌尿 生殖器官用薬	切迫早産、切迫流産	子宮収縮抑制作用	子宮筋β ₂ 受容体刺激作用 ／オキシトシン誘発作用			リトドリン塩酸塩	注-1	注射薬	50mgを5%ブドウ糖 注射液又は10%マ ルトース注射液 500mLに希釈し、毎 分50μgから点滴静 注開始	ウテメリン注	
				Ca ²⁺ の細胞外流出促進作 用			硫酸マグネシウム／ ブドウ糖	注-1 注-2	注射薬 キット	初回量として4gを20 分以上かけて静注 後、毎時1gより持続 静脈内投与	マグセント注 マグセント注シリンジ	

2 6 1 外皮用殺菌消毒剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き				
3	外皮用殺菌用 剤	皮膚等の消毒	主として一般細菌/真菌/ウイルスに作用するもの	主としてグラム陽性菌(G+)/グラム陰性菌(G-)/結核菌/真菌/ウイルスに作用		塩素系	次亜塩素酸ナトリウム	外-1	液剤		ヤクラックスD					
						ヨウ素系	ヨウ素	外-1	液剤		ブレボダイン					
							ポビドンヨード	外-1	液剤 クリーム剤 ゲル		イソジン					
							ヨードホルム	外-1	末剤		イソジンゲル					
							ヨードチンキ	外-1	液剤		ヨードホルム					
											ヨードチンキ					
											希ヨードチンキ					
						アルコール系	イソプロパノール	外-1	液剤		消毒用イソプロピルアルコール					
							エタノール	外-1	液剤		エタノール 無水エタノール 消毒用エタノール					
						配合剤	イソプロパノール/メタノール変性アル	外-1	液剤		東豊消アル					
						細胞質アミノ基のアルキル化作用	アルデヒド系	ホルマリン	外-1	液剤		ホルマリン				
							フェノール系	レゾルシン	外-1	末剤		レゾルシン				
			クレゾール石ケン	外-1	液剤				クレゾール石ケン液							
			フェノール	外-1	液剤				フェノール フェノール水 液状フェノール 消毒用フェノール 消毒用フェノール水							
			主として一般細菌に作用するもの	主としてグラム陽性菌(G+)/グラム陰性菌(G-)に作用	第四級アンモニウム塩系	ベンザルコニウム塩化物	外-1	液剤		ザルコニン/オスバン						
										濃塩化ベンザルコニウム液50						
						ベンゼトニウム塩化物	外-1	液剤		ベゼトン液/ハイアミン液						
					両面界面活性剤系	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	外-1	液剤		サテニジン						
						(比較的低濃度)細胞膜障害作用。(比較的高濃度)蛋白/核酸の沈着作用 細胞呼吸酵素阻害作用	ビグアナイド系	クロルヘキシジングルコン酸塩	外-1	液剤		ヘキサック/ヒビテン				
							アクリノール	外-1	末剤 液剤		アクリノール					
					過酸化物系	過マンガン酸カリウム	外-1	末剤		過マンガン酸カリウム						
						オキシドール	外-1	液剤		オキシドール						
						マーキュロクロム	外-1	液剤		マーキュロクロム						
						クレオソート	外-1	末剤		クレオソート						
					ヨードチンキ塗布皮膚面のヨウ素の脱色	配合剤				配合剤	チオ硫酸ナトリウム/エタノール	外-1	液剤		ハイボエタノール	

263 化膿性疾患用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き	
3	化膿性疾患用 剤	膿皮症等／外傷等による二 次感染	主として一般細菌に作用す るもの	主としてグラム陽性菌(G(+))に 作用	蛋白合成阻害作用		フシジン酸ナトリウム	外－1	軟膏剤		フシジンレオ軟膏		
						アミノグリコシド系	フラジオマイシン硫酸塩	外－5	貼付剤		ソフラチュール貼付 剤		
			配合剤(主として一般細菌に 作用するもの)		蛋白合成阻害作用＋創傷清 浄化(壊死組織融解)／肉芽 組織新生促進作用	配合剤	フラジオマイシン硫酸塩／トリプシン	外－1	散剤		フランセチン・T		
					主としてグラム陽性菌(G(+))／グ ラム陰性菌(G(-))に作用	葉酸合成阻害作用	サルファ剤	スルファジアジン	外－1	軟膏剤		テラジア	
						蛋白合成阻害作用	テトラサイクリン系	テトラサイクリン塩酸塩	外－1	軟膏剤		アクロマイシン	
							クロラムフェニコール系	クロラムフェニコール	外－1	軟膏剤 液剤		クロロマイセチン	
							アミノグリコシド系	ゲンタマイシン硫酸塩	外－1	軟膏剤 クリーム剤		ゲンタシン	
			配合剤(主として一般細菌に 作用するもの)		蛋白合成阻害作用＋抗炎症 作用 細胞壁合成阻害＋蛋白合成 阻害	配合剤	クロラムフェニコール／フラジオマイシン 硫酸塩／ブレンデニゾロン	外－1	軟膏剤		クロマイーP		
				配合剤			バシトラシン／フラジオマイシン硫酸 塩 ポリミキシンB硫酸塩／オキシテラ サイクリン塩酸塩	外－1	軟膏剤		パラマイシン テラマイシン		
		外傷等による二次感染	主として一般細菌に作用す るもの	主としてグラム陰性菌(G(-))に 作用	細胞膜機能障害作用	ポリヘプテド系	ポリミキシンB硫酸塩	外－1	散剤	硫酸ポリミキシンB			
		熱傷、皮膚潰瘍等による創 面感染 ざ瘡	主として一般細菌／真菌に作 用するもの	主としてグラム陽性菌(G(+))／グ ラム陰性菌(G(-))／真菌に作用 主としてグラム陽性菌(G(+))に 作用	葉酸合成阻害作用＋細胞膜 ／細胞壁障害作用 核酸(DNA)合成阻害作用 蛋白合成阻害作用	サルファ剤	スルファジアジン銀	外－1	クリーム剤	ゲーベン			
							ニューキノロン系	ナジフロキサシン	外－1	軟膏剤 クリーム剤 液剤	アクアチム軟膏 アクアチムクリーム アクアチムローション		
								キノロン系	オゼノキサシン	外－1	ローション 剤	ゼビアクスローショ ン	
							リンコマイシン系	クリンダマイシンリン酸エス テル	外－1	ゲル ローション 剤	ダラシンTゲル ダラシンTローション		
ざ瘡／酒さ	配合剤(皮膚軟化／殺菌作用 ＋鎮痛／消炎作用)	角質-SH基縮合作用		配合剤	イオウ＋カンフル	外－1	液剤	イオウ・カンフルロー ション					

264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
3	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	湿疹、皮膚炎群等	抗炎症/鎮痛/鎮痒作用	ステロイド受容体と結合	(strongest)	ステロイド	クロベタゾールプロピオン酸エステル	外-1	軟膏剤	1日1～数回	デルモベート	
								外-1	クリーム剤 液剤	1日1～数回	デルモベート	
							ジフロラゾン酢酸エステル	外-1 外-1	軟膏剤 クリーム剤	1日1～数回	ジフラル	
					(very strong)	ステロイド	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	外-1 外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤	1日1～数回	リンデロン-DP	
							ジフルブレドナート	外-1 外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤	1日1～数回	マイザー	
							ジフルコルトロン吉草酸エステル	外-1 外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤	1日1～3回	ネリゾナ/ユニバーサル	
							フルオシノニド	外-1 外-1 外-2	軟膏剤 クリーム剤 液剤 噴霧剤	1日1～3回	トプシム	
							アムシノニド	外-1 外-1	軟膏剤 クリーム剤	1日1～数回	ビスダーム	
							ヒドロコルチゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	外-1 外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤	1日1～数回	バンデル	
							ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	外-1 外-1	軟膏剤 クリーム剤	1日1～数回	アンテベート	
							モメタゾンフランカルボン酸エステル	外-1 外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤	1日1～数回	フルメタ	
							デキサメタゾンプロピオン酸エステル	外-1 外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤	1日1～数回	メサデルム	
					(strong)	ステロイド	ベタメタゾン吉草酸エステル	外-1 外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤	1日1～数回	リンデロン-V/ベトネベート	
							ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	外-1 外-1	軟膏剤 クリーム剤	1日数回	プロパデルム	
							デキサメタゾン吉草酸エステル	外-1 外-1	軟膏剤 クリーム剤	1日1～数回	ボアラ/ザルックス	
							ブレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	外-1 外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤	1日1～数回	リドメックス	
							フルオシノロンアセトニド	外-1 外-1 外-2	軟膏剤 クリーム剤 液剤 噴霧剤	1日1～数回	フルコート	
							デブロンプロピオン酸エステル	外-1 外-1 外-5	軟膏剤 クリーム剤 液剤 貼付剤	1日1～数回 12か24時間ごと貼りか	エクラー	
					(medium)	ステロイド	トリアムシノロンアセトニド	外-1 外-1	軟膏剤 クリーム剤	1日2～3回	ケナコルトーA	
							ヒドロコルチゾン酪酸エステル	外-1	軟膏剤	1日1～数回	ロコイド	

						クロベタゾン酪酸エステル	外-1	クリーム剤			
						アルクロメタゾンプロピオン酸エステル	外-1 外-1 外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤	1日1～数回	キンダベート	
			(weak)	ステロイド		デキサメタゾン	外-1 外-1 外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤	1日2～3回	アルメタ	
						プレドニゾン	外-1 外-1	軟膏剤 クリーム剤	1日1～数回	プレドニゾン	
						フルドロキシコルチド	外-5	貼付剤	12か24時間ごと貼りか	ドレニゾン	
	配合剤(抗炎症/鎮痛/鎮痒作用)		(weak)	配合剤		デキサメタゾン/脱脂大豆乾留タール	外-1	軟膏剤	1日1～数回	グリメサゾン	
	鎮痒作用	温覚刺激作用				クロタミトン	外-1 外-1	クリーム剤	1日数回	オイラックス	
	配合剤(鎮痒作用)	温覚刺激作用＋ステロイド受容体と結合		配合剤		クロタミトン/ヒドロコルチゾン	外-1	クリーム剤	1日1～数回	オイラックスH	
	抗炎症/鎮痛作用	プロスタグランジン生成阻害作用等		プロピオン酸系		イブプロフェンピコノール	外-1	軟膏剤	1日数回。带状疱疹:1日1～2回。	スタデルム	
						スプロフェン	外-1 外-1	軟膏剤 クリーム剤	1日数回。带状疱疹:1日1～2回。	トバルジック	
				アントラニル酸系		ウフェナート	外-1 外-1	軟膏剤 クリーム剤	1日数回	コンベック	
						グリチルレチン酸	外-1 外-1	クリーム剤 軟膏剤	1日数回	デルマクリン デルマクリンA軟膏	
	抗炎症作用	抗ヒスタミン作用		ジフェンヒドラミン系		ジフェンヒドラミン	外-1	クリーム剤	1日数回	レスタミン	
						ジフェンヒドラミンラウリル硫酸塩	外-1	軟膏剤	1日数回	ベナパスタ	
	配合剤(防腐/消毒/鎮痒作用＋収斂/保護作用)			配合剤		フェノール/亜鉛華リニメント	外-1	軟膏剤	1日1～数回	カチリ	
湿疹、皮膚炎群等(湿潤を伴う又は二次感染併発)	局所感染防御/肉芽形成促進/抗炎症作用					混合死菌製剤	外-1	軟膏剤		エキザルベ	
	配合剤(抗炎症/鎮痛/鎮痒作用＋抗菌作用)	ステロイド受容体と結合＋蛋白合成阻害作用	(strong)	配合剤		フルオン/ロンアセトニド/フラジオマイシン	外-1	軟膏剤	1日1～数回	フルコートF	
						ベタメタゾン吉草酸エステル/フラジオマイシン	外-1	軟膏剤	1日1～数回	ベトネベートN	
						ベタメタゾン吉草酸エステル/ゲンタマイシン	外-1 外-1 外-1	軟膏剤 液剤 クリーム剤	1日1～数回	リンデロン-VG リンデロン-VGクリーム	
			(medium)	配合剤		ヒドロコルチゾン酢酸塩/ジフェンヒドラミン/フラジオマイシン	外-1	軟膏剤	1日1～数回	強カレスタミンコーチゾン	
						ヒドロコルチゾン/オキシテトラサイクリン塩酸塩	外-1	軟膏剤	1日1～数回	テラ・コートリル	
アトピー性皮膚炎	免疫抑制作用	サイトカイン産生抑制/肥満細胞・好酸球脱顆粒抑制/I抗原提示能抑制作用				タクロリムス水和物	外-1	軟膏剤	1日1～2回	プロトピック	
角化性皮膚疾患	保護作用	ムコ多糖類新陳代謝亢進作用				ビタミンA油	外-1	軟膏剤	1日2～3回	ザーネ	
	配合剤(保護作用＋皮膚血行促進作用)	ムコ多糖類新陳代謝亢進＋微小循環系賦活作用		配合剤		ビタミンA/トコフェロール	外-1	軟膏剤	1日1～数回	ユベラ	
	表皮細胞増殖抑制/分化誘導作用	1,25-(OH) ₂ D ₃ 受容体結合		活性型VD ₃		タカルシトール	外-1 外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤	1日1～2回	ボンアルファ	
						カルシボトリオール マキシカルシトール	外-1 外-1 外-1	軟膏剤 軟膏剤 液剤	1日2回 1日2回	ドボネックス オキサロール	
	配合剤(表皮細胞増殖抑制/分化誘導作用＋抗炎症/鎮痛/鎮痒作用)	1,25-(OH) ₂ D ₃ 受容体結合/ステロイド受容体結合		配合剤		カルシボトリオール水和物/ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	外-1	軟膏剤	1日1回	ドボベツ軟膏	

						マキサカルシオール／ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	外-1	軟膏剤	1日1回	マーデュオックス軟膏	
	皮膚刺激	局所刺激作用			生薬	カンタリスチンキ	外-1	液剤	少量(希釈)塗布	カンタリス	
	湿疹、皮膚炎等の消炎・収斂等	収斂作用				トウガラシチンキ	外-1	液剤	1日1～数回	トウガラシチンキ	
		収斂/消炎/保護/防腐作用			無機塩類	カラムン	外-1	液剤	1日1～数回	カラムン	
						酸化亜鉛	外-1	末剤	1日1～数回	酸化亜鉛	
						硫酸亜鉛	外-1	末剤		硫酸亜鉛	
						塩化亜鉛	外-1	末剤		塩化亜鉛	
						硫酸アルミニウムカリウム	外-1	末剤	希釈塗布	ミョウバン	
		配合剤(収斂/消炎/保護/防腐作			配合剤	酸化亜鉛/豚脂	外-1	軟膏剤	1日1～数回	ウイルソン	
						亜鉛華	外-1	軟膏剤	1日1～数回	サトウザルベ	
							外-5	貼付剤		ボチシート	
						アクリノール/チンク油	外-1	軟膏剤	1日1～数回	アクリノール・チンク油	
						亜鉛華デンプン	外-1	末剤	1日1～数回	亜鉛華デンプン	
	皮膚・粘膜の炎症の消炎・収斂	収斂作用				タンニン酸	外-1	末剤		タンニン酸	
		局所刺激作用			過酸化物系	過マンガン酸カリウム	外-1	末剤		過マンガン酸カリウム	
						アンモニア水	外-1	液剤	希釈塗布	アンモニア水	
	筋肉痛等の鎮痛、消炎	抗炎症/鎮痛作用	プロスタグランジン生成阻害作用等		アリール酢酸系	インドメタシン	外-1	軟膏剤	1日数回	インデバン	
							外-1	クリーム剤			
							外-1	液剤			
							外-5	貼付剤	1日2回	カトレップ	
					プロピオン酸系	ケトプロフェン	外-1	クリーム剤	1日数回	セクター	
							外-1	液剤		エバテック	
							外-1	ゲル			
							外-5	貼付剤	1日1回、2回	モーラス	
						フルルビプロフェン	外-5	貼付剤	1日2回	アドフィード	
						ロキソプロフェンナトリウム水和物	外-1	ゲル	1日数回	ロキシニン	
							外-5	貼付剤	1日1回		
					オキシカム系	ピロキシカム	外-1	軟膏剤	1日数回	フェルデン	
					アリール酢酸系	ジクロフェナクナトリウム	外-1	ゲル	1日数回	ナボール	
							外-1	クリーム剤	1日1回		
							外-1	液剤			
							外-5	貼付剤			
						フェルピナク	外-1	軟膏剤	1日数回	ナバゲルン	
							外-1	クリーム剤			
							外-1	液剤			
							外-5	貼付剤	1日2回	セルタッチ	
						サリチル酸メチル	外-1	液剤	局所塗布	サリチル酸メチル	
		配合剤(抗炎症/鎮痛作用)			配合剤	サリチル酸メチル/グリチルレチン	外-1	軟膏剤	1日1～数回	スチックゼノールA	
						サリチル酸メチル/ジフェンヒドラミン/サリチル酸グリコール/l-メントール/d-カンフル/ニコチン酸ベンジル	外-2	噴霧剤	1日1～数回	エアーサロンバス	
						サリチル酸メチル/カンフル/ハッカ油/ユーカリ油	外-1	軟膏剤	1日1～数回	ローテル	
						サリチル酸メチル/dl-カンフル/l-メントール	外-5	貼付剤	1日1～2回	MS冷シブ	
						サリチル酸グリコール/メントール	外-5	貼付剤	1日1～2回	GSプラスターC	
						サリチル酸メチル/dl-カンフル/トウガラシエキス	外-5	貼付剤	1日1～2回	MS温シブ	
						サリチル酸メチル/メントール/カンフル/ジフェンヒドラミン/ハッカ油/ノニル酸ワニリルアミド	外-5	貼付剤	1日1～2回	ハリホット	
						サリチル酸グリコール/ノニル酸ワニリルアミド	外-5	貼付剤	1日1～2回	GSプラスターH	
						エスフルルビプロフェン/ハッカ油	外-5	貼付剤	1日1回	ロコアテープ	
		抗炎症/鎮痛作用	局所血管拡張作用			カンフル	外-1	液剤	塗布又は塗擦	カンフル精	

						d-カンフル	外-1	末剤	塗布又は塗擦	d-カンフル	
						dl-カンフル	外-1	末剤	塗布又は塗擦	dl-カンフル	
		外傷後の腫脹・筋肉痛等	抗炎症/鎮痛/血流量増加作用等			ヘパリン類似物質	外-1 外-1 外-1 外-1	ゲル 軟膏剤 クリーム剤 液剤	1日1～数回	ヒルドイド	
			配合剤(抗炎症/鎮痛/血流量増加作用等)		配合剤	ヘパリン類似物質/サリチル酸/副腎エキス	外-1	クリーム剤 液剤	1日1～数回	モビラート/ゼスタック	
		外傷等の鎮痛	局所麻酔作用			アミノ安息香酸エチル	外-1	軟膏剤	適宜	アミノ安息香酸エチル	
		表皮に欠損のない打撲	局所血管収縮/局所保護作用			酢酸鉛	外-1	末剤	湿布	酢酸鉛	

265 感染性皮膚疾患用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
3	感染性皮膚疾患用剤	白癬、カンジダ症	皮膚糸状菌、カンジダ、真菌に抗菌作用	細胞膜合成阻害作用	スクアレンエポキシダーゼ選択阻害作用	アリルアミン系	テルピナフィン塩酸塩	外-1	クリーム剤	1日1回	ラミシール	
								外-1	液剤		ラミシール外用スプレー	
								外-2	噴霧剤			
						イミダゾール系	クロトリマゾール	外-1	軟膏剤	1日2～3回	タオンゲル／エンベシド	
								外-1	クリーム剤			
								外-1	液剤			
								外-8	トローチ	1日5回	エンベシドトローチ	
							オキシコナゾール硝酸塩	外-1	クリーム剤	1日2～3回	デリマイン	
								外-1	液剤			
							ビホナゾール	外-1	クリーム剤	1日1回	マイコスポール	
								外-1	液剤			
							ケトコナゾール	外-1	クリーム剤	1日1回	ニゾラル	
								外-1	液剤			
								外-2	噴霧剤			
							ラノコナゾール	外-1	軟膏剤	1日1回	アスタット	
								外-1	クリーム剤			
								外-1	液剤			
							ネチコナゾール塩酸塩	外-1	軟膏剤	1日1回	アトラント	
								外-1	クリーム剤			
								外-1	液剤			
							ミコナゾール硝酸塩	外-1	クリーム剤	1日2～3回	フロリードD	
							イソコナゾール硝酸塩	外-1	クリーム剤	1日2～3回	アデスタン	
							スルコナゾール硝酸塩	外-1	クリーム剤	1日2～3回	エクセルダーム	
								外-1	液剤			
							ルリコナゾール	外-1	クリーム剤	1日1回	ルリコン	
								外-1	液剤			
								外-1	軟膏		ルリコン軟膏	
						モルホリン系	アモロルフィン塩酸塩	外-1	クリーム剤	1日1回	ベキロン	
		白癬、疥癬	抗菌作用				モクタル	外-1	末剤	1日1～数回	モクタル	
			抗菌作用/角質軟化作用	角質-SH基縮合作用			イオウ	外-1	末剤	1日1～2回	イオウ	
		白癬	皮膚糸状菌に抗菌作用	細胞膜合成阻害作用	スクアレンエポキシダーゼ選択阻害作用	ベンジルアミン系	ブテナフィン塩酸塩	外-1	クリーム剤	1日1回	メンタックス	
								外-1	液剤			
								外-2	噴霧剤			
						チオカルバメート	リラナフタート	外-1	クリーム剤	1日1回	ゼフナート	
								外-1	液剤			
							トルナフタート	外-1	軟膏剤	1日2～3回	ハイアラージン	
								外-1	液剤			
		爪白癬	皮膚糸状菌(トリコフィトン属)に抗菌作用	細胞膜合成阻害作用	エルゴステロール合成阻害作用	トリアゾール系	エフィナコナゾール	外-1	液剤	1日1回	クレナフィン爪外用液	
						イミダゾール系	ルリコナゾール	外-1	液剤	1日1回	ルコナック爪外用液	
		単純疱疹／帯状疱疹	ヘルペスウイルス	核酸(DNA)合成阻害作用			アシクロビル	外-1	軟膏剤	1日数回	ゾピラックス	
								外-1	クリーム剤			
							ピダラシン	外-1	軟膏剤	1日1～4回	アラセナーA	

								外－１	クリーム剤			
	ウイルスに作用するもの	尖圭コンジローマ	免疫賦活作用	インターフェロン等産生促進作用/細胞性免疫応答賦活化作用			イミキモド	外－１	クリーム剤	１日１回週３回	ベセルナクリーム	

266 皮膚軟化剤（腐しよく剤を含む。）

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
3	皮膚軟化剤	角化症等	角質水分保持量増加作用/ 角質溶解作用			尿素	尿素	外－1	軟膏剤 クリーム剤 液剤 末剤	1日2～3回	ケラチナミン	
			角質溶解作用/防腐作用	細胞膨潤軟化作用		有機酸	サリチル酸	外－1 外－5	末剤 軟膏剤 貼付剤	1日1～2回 2～5日ごと	サリチル酸 スピール膏M	
		脂漏等の角質溶解	蛋白凝固/角質溶解作用				レゾルシン	外－1	末剤	1日1～2回	レゾルシン	
		手足のき裂性・落屑性皮膚 炎	配合剤(皮膚乾燥防止作用 ＋皮膚腐食/軟化作用)			配合剤	グリセリン＋水酸化 カリウム	外－1	液剤	1日1～数回	グリセリンカリ液	

267 毛髪用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
2	毛髪用剤	円形脱毛症	局所血管拡張作用				アセチルコリン塩化物	注－1	注射薬	1回0.1g数カ 所に週1回皮 内注	オビソート注	
3	毛髪用剤	円形脱毛症における脱毛防 止・発毛促進	局所血管拡張・発毛促進作 用	副交感神経刺激作用			カルプロニウム塩化物	外－1	液剤	1日2～3回 適量塗布	フロジン液	
		発毛促進	局所刺激作用			生薬	カンタリスチンキ	外－1	液剤	少量(希釈) 塗布	カンタリス	
							トウガラシチンキ	外－1	液剤	1日1～数回	トウガラシチンキ	

264・269・395・412 皮膚潰瘍用剤

内注 外区	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
3	皮膚潰瘍用剤	皮膚潰瘍	損傷皮膚組織修復作用/収斂作用				アルミニウムクロロヒドロキシアラントイネート	外-1	軟膏剤 パウダー剤		イサロバン イサロバン外用散	
			創傷治癒促進作用	血管新生作用等			トレチノイントコフェリル	外-1	軟膏剤	1日1～2回	オルセノン	
					サイクリックAMP誘導体増加作用	サイクリックAMP誘導体	ブクラデシンナトリウム	外-1	軟膏剤	1日1～2回	アクトシン	
					血小板凝集能抑制作用	プロスタグランジンE1誘導体	アルプロスタジルアルファデクス	外-1	軟膏剤	1日2回	プロスタンディン	
					FGF受容体特異的結合作用	線維芽細胞成長因子	トラフェルミン(遺伝子組換え)	外-2	噴霧剤	1日1回	フィブラストスプレー	
				組織呼吸促進作用			幼牛血液抽出物	外-1	軟膏剤	1日1～2回		
			配合剤(創傷治癒促進作用)	殺菌作用+創面清浄化作用		配合剤	ヨウ素	外-1	散剤	1日1回(2回)	カデックス	
								外-1	軟膏		カデックス軟膏	
				浮腫改善/線維芽細胞活性化作用+殺菌作用		配合剤	精製白糖/ポビドンヨード	外-1	軟膏剤	1日1～2回	ユーバスタ/イワデクト	
			抗炎症作用/組織修復作用	膿粘液分解作用/出血抑制作用			リゾチーム塩酸塩	外-1	軟膏剤		リフラップ軟膏	
				抗壊死/抗浮腫/蛋白産生阻止/表皮形成促進作用			ベンダザック	外-5 外-1	貼付剤 軟膏剤	1日数回	ピスタロン軟膏 リフラップシート ジルダザック	
			熱傷	硬組織形成誘導作用			水酸化カルシウム	外-1	液剤		石灰水	
			熱傷等の壊死組織除去等	壊死組織除去作用			プロメライン	外-1	軟膏剤		プロメライン軟膏	

269 その他の外皮用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	その他の外皮 用剤	乾癬	表皮細胞増殖抑制/分化誘 導作用			テトラエン誘導体	エトレチナート	内-1	カプセル剤	1日1～3回	チガソン	
		局所療法で効果不十分な尋 常性乾癬、関節症性乾癬	ホスホジエステラーゼ4(PD E4)阻害作用				アブレミラスト	内-1	錠剤	1日2回	オテズラ錠	
		白斑	光感受性増強作用				メトキサレン	内-1	錠剤	1日20mg2時 間後日光浴等	オクソラレン	
3	その他の外皮 用剤	白斑	光感受性増強作用				メトキサレン	外-1	軟膏剤 液剤	塗布し、1～2 時間後日光浴	オクソラレン	
		尋常性ざ瘡	毛包上皮細胞異常角化抑制 作用 角層剥離作用/抗菌作用				アダパレン	外-1	ゲル剤	1日1回塗布	ディフェリンゲル	
			配合剤(タンパク合成阻害作 用+角層剥離作用/抗菌作 用)			配合剤	過酸化ベンゾイル クリンダマイシンリン 酸エステル水和物 ／過酸化ベンゾイル	外-1	ゲル剤	1日1回塗布	ベピオゲル デュアック配合ゲル	
			配合剤(毛包上皮細胞異常 角化抑制作用+角層剥離作 用/抗菌作用)			配合剤	アダパレン／過酸化 ベンゾイル	外-1	ゲル剤	1日1回塗布	エビデュオゲル	
		がん性皮膚潰瘍部位の殺 菌・臭気の軽減	核酸(DNA)障害作用				メトロニダゾール	外-1	ゲル剤	1日1～2回塗布	ロゼックスゲル	

270-279 歯科用薬剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
2	歯科用局所麻酔剤	歯科領域における浸潤麻酔・伝達麻酔	局所麻酔作用	神経遮断作用	活動電位伝導抑制作用	アニリド系	メピバカイン塩酸塩	注-1	注射薬			
							リドカイン塩酸塩／エピネフリン酒石酸水素塩	注-1	注射薬		オーラ	
							リドカイン塩酸塩／アドレナリン	注-1	注射薬		キシシステシンA	
							プロメトカイン塩酸塩／フェリアレジン	注-1	注射薬		歯科用シタネストール オクタプレシン	
3	歯科用局所麻酔剤	歯科領域における表面麻酔	局所麻酔作用	神経遮断作用	活動電位伝導抑制作用	エステル型	アミノ安息香酸エチル	外-1	ゼリー		ビーゾカイン	
							テトラカイン塩酸塩	外-5	貼付剤		ハリケイン	
			配合剤(局所麻酔作用)			配合剤	アミノ安息香酸エチル／パラアチルアミノ安息香酸ジエチルアミエチル塩酸塩	外-1	ハスタ剤		ネオザロカインパスタ	
							アミノ安息香酸エチル／ジプロカイン塩酸塩	外-1	軟膏剤		プロネスバスタアロ	
	歯科用殺菌剤	慢性辺縁性歯周炎	主として一般細菌に作用	主としてグラム陽性菌(G(+))/グラム陰性菌(G(-))に作用	蛋白合成阻害作用	テトラサイクリン系	ミノサイクリン塩酸塩	外-1	軟膏剤		ペリオクリン	
		急性歯肉炎					テトラサイクリン塩酸塩	外-1	ハスタ剤		テトラサイクリンCM Cベイス	
		抜歯創等の感染予防					テトラサイクリン塩酸塩	外-8	トローチ		アクロマイシントローチ	
							オキシテトラサイクリン塩酸塩	外-8	錠剤		オキシテトラコーン	
						アミノグリコシド系	フランジオマイシン硫酸塩	外-8	含嗽剤		デンターグルF	
							ベンゼトニウム塩化物	外-8	含嗽剤		ネオステリングリーン	
			配合剤(殺菌作用+抗炎症作用)	主としてグラム陽性菌(G+)/グラム陰性菌(G-)/真菌	細網内皮系機能抑制作用+蛋白合成阻害作用	配合剤	エビシヒドロコレステリン/テトラサイクリン塩酸塩	外-1	軟膏剤		テトラサイクリン・プレステロン 歯科用軟	
		その他の歯科口腔用薬	辺縁性歯周炎	配合剤(抗炎症作用+抗菌作用+鎮痛作用)		配合剤	ヒドロコルチゾン酢酸エステル/ヒノキチオール	外-1	軟膏剤		ヒノボロン	
				配合剤(殺菌作用+抗炎症作用)		配合剤	クロルヘキシジン塩酸塩/ジフェニドラミン	外-1	軟膏剤		デスパコーワ	
		口内炎	主として一般細菌に作用	主としてグラム陽性菌(G+)/グラム陰性菌(G-))に作用	蛋白合成阻害作用	テトラサイクリン系	テトラサイクリン塩酸塩	外-8	トローチ剤		アクロマイシン	
			抗炎症/鎮痛作用	ステロイド受容体と結合		ステロイド	トリアムシノロンアセトニド	外-1	軟膏剤		口腔用ケナログ	
							デキサメタゾン	外-5	貼付剤		アフタッチ	
							ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	外-1	軟膏剤		デキササルチン/アフタゾロン	
								外-2	噴霧剤		サルコート	
	咽頭炎、扁桃炎/口内炎	抗炎症/創傷治癒促進/抗アレルギー作用					アズレンスルホン酸ナトリウム	外-8	トローチ剤		アズノールST	
			主として一般細菌/真菌に作用	主としてグラム陽性菌(G+)/真菌に作用			セチルピリジニウム塩化物	外-8	トローチ剤		スプロールトローチ	
			主として一般細菌に作用	主としてグラム陽性菌(G+)/グラム陰性菌(G-))に作用	脂肪可溶化/蛋白変性作用	陽イオン界面活性剤	デカリニウム塩化物	外-8	トローチ剤		SPTローチ	
					有機成分(酵素蛋白)酸化分解作用		ドミフェン臭化物	外-8	トローチ剤		オラドール	
		口腔乾燥症					複方ヨード・グリセリン	外-1	液剤		複方ヨード・グリセリン	
			唾液成分の補充				リン酸ニカリウム/無機塩類	外-2	噴霧剤		サリベート	
			配合剤(創面保護作用+鎮痛作用)			配合剤	酸化亜鉛/チオウン油	外-1	軟膏剤		サージカルバックN	
											ペリオドンタルパッ	
		歯周疾患の外科的手術後の創面包帯	止血作用/創傷充填作用	凝血物形成促進作用			酸化セルロース	外-5	貼付剤		デントセル、サージセル	
		歯科領域における手術後の止血	配合剤(止血作用+局所麻酔作用)			配合剤	塩化アルミニウム/セチルピリジニウム塩化物	外-1	ゼリー		歯科用TDゼット・ゼリー	
		口腔粘膜損傷の止血							液剤		歯科用TDゼット	
		歯周炎による歯槽骨の欠損	歯周組織再生促進作用	FGF受容体特異的結合作用			トラフェルミン(遺伝子組換え)	外-9	キット		リグロス	

290 その他の個々の器官系用医薬品

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分名	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	その他の個々の器官系用医薬品	乳児血管腫	β 受容体遮断作用				プロプラノロール塩 酸塩	内-4	シロップ 剤		ヘマンジオールシロップ 小児用	
2	その他の個々の器官系用医薬品	デュビュイトラン拘縮	コラーゲン分解作用				コラゲナーゼ(クロストリジウム ヒストリチクム)	注-1	注射薬		ザイヤフレックス注射 用	

311-318 ビタミン剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	ビタミン剤	ビタミンA欠乏症	ビタミンA補充作用	網膜機能維持・上皮組織分化誘導作用		レチノイド	ビタミンA	内-1	錠剤	1日2,000～4,000 ビタミンA単位	チョコラA錠	
							レチノールパルミチン酸エステル	内-2	末剤	1日2,000～4,000 ビタミンA単位	チョコラA末	
								内-3	液剤	1日2,000～4,000 ビタミンA単位 (補給)、1日3,000～ 100,000ビタミンA単	チョコラA滴	
		ビタミンA欠乏症、ビタミンD欠乏症	ビタミンA・D補充作用	網膜機能維持・上皮組織分化誘導／カルシウム代謝調節作用			肝油(魚由来)	内-3	液剤(油)	1日2,000～4,000 ビタミンA単位 (補給)、1日3,000～ 100,000ビタミンA単	肝油	
		ビタミンD代謝異常、副甲状腺機能低下症	ビタミンD補充作用	カルシウム代謝調節作用		活性型ビタミンD ₃	カルシトリオール	内-1	錠剤 カプセル剤	1日1回	ロカルトロール	
						活性型ビタミンD ₃ 誘導体	アルファカルシドール	内-1	錠剤 カプセル剤	1日1回	アルファロール	
								内-2 内-3	散剤 液剤	1日1回 1日1回	アルファロール アルファロール	
		骨粗鬆症	ビタミンD補充作用	カルシウム代謝調節作用		活性型ビタミンD ₃ 誘導体	エルデカルシトール	内-1	カプセル剤	1日1回		
		二次性副甲状腺機能亢進症	活性型ビタミンD ₃ 補充作用	副甲状腺ホルモン分泌抑制作用		活性型ビタミンD ₃ 誘導体	ファレカルシトリオール	内-1	錠剤	1日1回	ホーネル錠、フルスタン錠	
		ビタミンB1欠乏症	ビタミンB1補充作用	α-ケトグルタル酸脱炭酸酵素補酵素作用		ビタミンB1(カルボキシアミド前駆体)	チアミン塩化物塩酸塩	内-2	散剤	1日1～3回	塩酸チアミン散	
						ビタミンB1誘導体	セトチアミン塩酸塩(セチアミン塩酸塩)	内-1	錠剤	1日5～100mg	ジセタミン	
							オクトチアミン	内-1	錠剤	1日25～100mg	ノイビタ	
							チアミンジスルフィド	内-1	錠剤	1日1～3回	アクチビン	
							ビスベンチアミン	内-1	錠剤	1日5～100mg	ベストン	
							フルスルチアミン	内-1	錠剤	1日5～100mg	アリナミンF	
							ペンフォチアミン	内-1	錠剤	1日5～100mg		
		ビタミンB2欠乏症	ビタミンB2補充作用	酸化還元酵素補酵素作用		ビタミンB2	リボフラビン	内-2	散剤	1日1～3回	強カビスラーゼ末	
							酪酸リボフラビン	内-1	錠剤	1日2～3回	ハイボン	
								内-2	細粒剤 顆粒剤	1日2～3回	ハイボン	
						ビタミンB2補酵素	フラビンアデニンジヌクレオチド	内-1 内-3	錠剤 シロップ剤	1日1～3回 1日1～3回	フラビタン フラビタン	
		ニコチン酸欠乏症	抗ペラグラ因子補充作用	NAD,NADP,脱水素酵素反応補酵素作用		NAD,NADP前駆体	ニコチン酸	内-1	錠剤	1日25～200mg	ナイクリン	
							ニコチン酸アミド	内-2	散剤	1日25～200mg	ニコチン酸アミド散	
		パントテン酸欠乏症	パントテン酸補充作用	CoA,脂肪・タンパク質,炭水化物代謝補酵素作用		CoA構成成分	パントテン酸カルシウム	内-2	散剤 末剤	1日1～3回	パンカル散	
						CoA前駆体	パンテチン	内-1 内-2	錠剤 散剤	1日1～3回 1日1～3回	パントシン パントシン	
									細粒剤			
		ビタミンB6欠乏症	ビタミンB6補充作用	アミノ酸・タンパク質代謝補酵素		ビタミンB6	ピリドキシン塩酸塩	内-1 内-2	錠剤 散剤 末剤	1日10～100mg 1日10～100mg	アデロキシ アデロキシ	
						ビタミンB6補酵素型	ピリドキサルリン酸エステル	内-1	錠剤	1日1～3回	ピロミジン	
							ピリドキサルリン酸エステルカルシウム	内-2	散剤	1日1～3回	アデロキサール	
		葉酸欠乏症	葉酸補充作用	核酸代謝補酵素作用			葉酸	内-1 内-2	錠剤 散剤	1日2～3回 1日2～3回	フォリアミン 葉酸10倍散	

		ビタミンB12欠乏症、巨赤芽球性貧血、悪性貧血に伴う神経障害 末梢性神経障害	ビタミンB12補充作用 神経再生促進作用	核酸代謝・ヘム合成補酵素作用		ビタミンB12補酵素型	コバマミド	内-1	錠剤 カプセル剤	1日1～3回	ハイコパール	
				核酸代謝・ヘム合成補酵素作用		ビタミンB12補酵素型	メコバラミン	内-1	錠剤 カプセル剤 細粒剤	1日3回	メチコパール	
		ビタミンB群、タンパク質の摂取不良	栄養補充作用	ビタミンB・タンパク補給			乾燥酵母	内-2	末剤	1日3回	メチコパール 乾燥酵母エビオス	
		ビタミンC欠乏症	ビタミンC補充作用	還元作用			アスコルビン酸	内-2	散剤 顆粒剤 末剤	1日1～数回	ハイシー	
		ビタミンE欠乏症、末梢循環障害、過酸化脂質の増加防止	ビタミンE補充作用	抗酸化作用			トコフェロール酢酸エステル	内-1	錠剤 カプセル剤	1日2～3回	ユベラ	
								内-2	顆粒剤	1日2～3回	ユベラ	
		ビタミンK欠乏症	止血機構賦活作用	プロトロンビン合成促進作用		ビタミンK1	フィトナジオン	内-1	錠剤 カプセル剤	1日5～15mg	ケーワン	
						ビタミンK2	メナテトレノン	内-1	散剤	1日5～15mg	ケイツー	
							メナテトレノン(小)	内-3	カプセル剤 シロップ剤	1日2回 1日1回	ケイツー	
		ビオチン欠乏性湿疹・皮膚炎	皮膚炎改善作用	カルボキシル基転移反応補酵素作用			ビオチン	内-2	散剤	1日1～3回	ビオチン散	
								内-3	シロップ剤	1日1～3回	ビオチンドライシロップ	
		ビタミン欠乏症	配合剤(ビタミンB群補充作用)	ビタミンB1+B6+B12作用		配合剤	チアミン硝酸塩／ピリドキシン塩酸塩／ヒドロキソコバラミン酢酸塩	内-1	錠剤	1日1回	トリドセラン	
							チアミンスルフィド／ピリドキシン塩酸塩／シアノコバラミン(2)	内-1	錠剤	1日1～3回	アリチア	
							チアミンスルフィド／ピリドキサルリン酸エステル／ヒドロキソコバラミン(3)	内-1	カプセル剤	1日1～3回	O・S・T・ミックス	
							ベンゾチアミン／ピリドキシン塩酸塩／シアノコバラミン(1)	内-1	カプセル剤	1日1～3回	ビタメジン	
								内-2	散剤	1日0.25～0.75g	ビタメジン	
				ビタミンB1+B2+B6+B12作用		配合剤	オクトチアミン／リボフラビン／ピリドキシン塩酸塩／シアノコバラミン	内-1	錠剤	1日1～3回	ノイロビタミン	
							フルスチアミン塩酸塩／リボフラビン／ピリドキサルリン酸エステル／ヒドロキソコバラミン酢酸塩(1)	内-1	錠剤 カプセル剤	1日1～3回	ビタノイリン	
				ビタミンB2+B6作用		配合剤	リボフラビン／ピリドキシン塩酸塩	内-1	錠剤	1日1～3回	強力ビフロキシ	
				ビタミンB2+B6+ニコチン酸+パントテン酸作用		配合剤	リボフラビン／ピリドキシン塩酸塩／ニコチン酸アミド／パントテン酸カルシウム	内-2	顆粒剤	1日1～3回	デルバント	
			配合剤(ビタミンC補充作用+パントテン酸補充作用)	ビタミンC+パントテン酸作用		配合剤	アスコルビン酸／パントテン酸カルシウム(1)	内-1	錠剤	1日1～3回	シナール	
								内-2	顆粒剤	1日1～3回	シナール	
			配合剤(ビタミン補充作用)	ビタミンA+B1+B2+B6+B12+C+D+E+ニコチン酸+パントテン酸作用		配合剤	レチノールパルミチン酸エステル／チアミン硝酸塩／リボフラビン／ピリドキシン塩酸塩／シアノコバラミン／アスコルビン酸／エルゴカルシフェロール／トコフェロール酢酸エステル／パントテン酸カルシウム／ニコチン酸アミド／葉酸	内-2	末剤	1日1～2g	バンビタン	
2	ビタミン剤	ビタミンA欠乏症	ビタミンA補充作用	網膜機能維持・上皮組織分化誘導作用		レチノイド	レチノールパルミチン酸エステル	注-1	注射薬	1日3,000～100,000ビタミンA単	チョコラA	
		二次性副甲状腺機能亢進症	活性型ビタミンD3補充作用	副甲状腺ホルモン分泌抑制作用		活性型ビタミンD ₃ 誘導体	マキサカルシトール	注-1	注射薬	1回2.5～10ugを週3回、透析回路静脈側に注入	オキサロール注	
							カルシトリオール	注-1	注射薬	1回0.5～1.5ugを週3回、静注	ロカルトリオール注	
		ビタミンB1欠乏症	ビタミンB1補充作用	α-ケトグルタル酸脱炭酸酵素補酵素作用		ビタミンB1	チアミン塩化物塩酸塩	注-1	注射薬	1日1～50mg皮下・筋注又は静注	アベリー	

				ビタミンB1誘導体	フルスルチアミン塩酸塩	注-1	注射薬	1日 5～100mg静注	アリナミンF	
					チアミンジスルフィド	注-1	注射薬	1日5～100mg皮下、筋注又は緩徐に静注	ネオラミン	
					プロスルチアミン	注-1	注射薬	1日10mg静注	アリナミン	
				ビタミンB1補酵素型	コカルボキシラーゼ	注-1	注射薬	1日1～50mg皮下、筋注又は静注	アリチラーゼ	
ビタミンB2欠乏症	ビタミンB2補充作用	酸化還元酵素補酵素作用		ビタミンB2	リボフラビンリン酸エステルナトリウム	注-1	注射薬	1日2～30mg皮下、筋注又は静注	ピスラーゼ	
				ビタミンB2補酵素型	フラビンアデニンジヌクレオチド	注-1	注射薬	1日1～2回皮下、筋注又は静注	フラビタン	
ニコチン酸欠乏症	ニコチン酸補充作用	NAD,NADP,脱水素酵素反応補酵素作用		NAD,NADP前駆体	ニコチン酸	注-1	注射薬	1日10～100mg皮下、筋注又は静注	ナイクリン	
パントテン酸欠乏症	パントテン酸補充作用	CoA,脂肪,タンパク質,炭水化物代謝補酵素作用		CoA前駆体	パンテチン	注-1	注射薬	1日1～2回筋注又は静注	パントシン	
					パンテノール	注-1	注射薬	1日1～2回筋注又は静注	パントール	
ビタミンB6欠乏症		アミノ酸・タンパク質代謝補酵素作用		ビタミンB6	ピリドキシン塩酸塩	注-1	注射薬	1日1～2回皮下、筋注又は静注	アデロキシシン	
				ビタミンB6補酵素型	ピリドキサルリン酸エステル	注-1	注射薬	1日1～2回皮下、筋注又は静注	ピロミジン	
葉酸欠乏症	葉酸補充作用	核酸代謝補酵素作用			葉酸	注-1	注射薬	1日1回皮下又は筋注	フォリアミン	
ビタミンB12欠乏症、巨赤芽球性貧血、悪性貧血に伴う神経障害	ビタミンB12補充作用	核酸代謝・ヘム合成補酵素作用		ビタミンB12補酵素型	コバマミド	注-1	注射薬	1回0.5～1mgまで、筋注	カロマイドS	
					ヒドロキシコバラミン酢酸塩	注-1	注射薬	1回1mgまで、筋注又は静注	フレスミンS	
					シアノコバラミン	注-1	注射薬	1回1mg、皮下注、筋注又は静注	シアノコバラミン	
末梢性神経障害、ビタミンB12欠乏による巨赤芽球性	ビタミンB12補充作用＋神経再生促進作用	核酸代謝・ヘム合成補酵素作用		ビタミンB12補酵素型	メコバラミン	注-1 注-2	注射薬 キット	1日1回0.5mg、週3回筋注又は静注 1日1回0.5mg、週3回筋注又は静注	メチコパール ハイトコバミンM注500μgシリンジ	
ビタミンC欠乏症	ビタミンC補充作用	還元作用			アスコルビン酸	注-1	注射薬	1日1～数回、皮下注、筋注又は静注	ビスコリン	
ビタミンK欠乏症	止血機構賦活作用	プロトロンビン合成促進作用		ビタミンK1	フィナジオン	注-1	注射薬	1日5～15mg等、皮下、筋注又は静注	ケーアイン	
				ビタミンK2	メナテレノン	注-1	注射薬	1日1回10～20mg、静注	ケイツーN静注	
ビオチン欠乏性湿疹・皮膚炎	ビオチン補充作用	カルボキシル基転移反応補酵素作用			ビオチン	注-1	注射薬	1日0.5～2mg皮下、筋注又は静注	ビオチン	
ビタミン欠乏症	配合剤(ビタミンC+L-システイン補充作用)	ビタミンC+チオール酵素(SH酵素)賦活作用		配合剤	アスコルビン酸/L-システイン	注-1	注射薬	1日1～2回、皮下、筋注又は静注	クリストファン	
	配合剤(ビタミンB1+B2+C補充作用)	ビタミンB1+B2+C作用		配合剤	チアミン塩酸塩/リボフラビンリン酸エステルナトリウム/アスコルビン酸	注-1	注射薬	1日5～10mLを糖液等に混じ、静注又は点滴静注	ビスコン	

			配合剤(ビタミンB群補充作用)	ビタミンB2+B6作用		配合剤	フラビンアデニンジヌクレオチド/ピ リドキサルリン酸エステル	注-1	注射薬	1日1～2回、皮 下、筋注又は静 注	ライボミンS	
				ビタミンB1+B6+B12作用		配合剤	チアミン塩酸塩/ピリドキシン塩酸 塩/シアノコバラミン	注-1	注射薬	1日1回2mL、皮 下、筋注又は静 注	ダイビタミックス	
							チアミンジスルフィド/ピリドキシン塩 酸塩/ヒドロキシコバラミン酢酸塩	注-1	注射薬	1日1回10mLを 緩徐に静注	ネオラミン・スリー ビー	
							チアミン/フォスフェイトシスルフィド/ピリドキ シン塩酸塩/シアノコバラミン	注-1	注射薬	1日1回10mLを 緩徐に静注又は 点滴静注	ビタメジン	
			配合剤(ビタミン類補充作用)	ビタミンB1+B2+B6+ニコチン酸+パ ントテン酸+ビタミンC作用		配合剤	チアミン塩酸塩/リボフラビンリン酸 エステルナトリウム/ピリドキシン塩 酸塩/ニコチン酸アミド/パントノー ル/アスコルビン酸	注-1	注射薬	1日1～3回、皮 下、筋注又は静 注	シーバラ	
	高カロリー静脈栄養時のビタ ミン補給		配合剤(ビタミン類補充作用 (葉酸、ビタミンB12、ピオチン、ビタ ミンKなし))			配合剤	ビタミンA/ビタミンB1/ビタミンB2/ニコチ ン酸/パントテン酸/ビタミンB6/ビ タミンC/ビタミンE	注-1	注射薬	1日1回、点滴静 注	M.V.I.	
			配合剤(ビタミン類補充作用 (ビタミンKなし))			配合剤	葉酸/ビタミンB12/ピオチン	注-2	キット	1日1回、点滴静 注	M.V.I.キット	
							ビタミンA/ビタミンB1/ビタミンB2/ニコチ ン酸/パントテン酸/ビタミンB6/ビ タミンC/ビタミンE	注-1	注射薬	1日1回、点滴静 注	M.V.I.-3	
							ビタミンA/ビタミンB1/ビタミンB2/ニコチ ン酸/パントテン酸/ビタミンB6/葉酸/ビ タミンB12/ビタミンC/ビタミンD/ビ タミンE/ピ オチン/ビタミンK (2)	注-2	キット	1日1回、点滴静 注	ネオM.V.I.-9	
			配合剤(ビタミン類補充作用)			配合剤	ビタミンA/ビタミンB1/ビタミンB2/ニコチ ン酸/パントテン酸/ビタミンB6/葉酸/ビ タミンB12/ビタミンC/ビタミンD/ビ タミンE/ピ オチン/ビタミンK (6)	注-1	注射薬	1日1回、点滴静 注	M.V.I.-12キット	
							ビタミンA/ビタミンB1/ビタミンB2/ニコチ ン酸/パントテン酸/ビタミンB6/葉酸/ビ タミンB12/ビタミンC/ビタミンD/ビ タミンE/ピ オチン/ビタミンK (4)(7)	注-1	注射薬	1日1回、点滴静 注	オーツカMV注	
								注-1	注射薬	1日1回、点滴静 注	マルタミン	
								注-1	注射薬	1日1回、点滴静 注	ネオラミン・マルチV	
								注-2	キット	1日1回、点滴静	ビタジェクト	

1 2 4 ・ 3 2 1 ・ 3 2 2 ・ 3 3 1 無機質製剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	無機質製剤	低カルシウム血症	カルシウムの補給			カルシウム製剤	乳酸カルシウム	内-2	末剤		乳酸カルシウム	
							グルコン酸カルシウム	内-2	末剤		カルチコール	
							塩化カルシウム	内-2	末剤		塩化カルシウム	
							Ｌ-アスパラギン酸カルシウム	内-1	錠剤		アスパラ-CA	
		RANKL阻害剤(デノスマブ (遺伝子組換え)等)投与に 伴う低カルシウム血症	カルシウムの補給(ビタミンD 補充療法)			配合剤	リン酸水素カルシウム	内-2	末剤		リン酸水素カルシウ	
							沈降炭酸カルシウム/コレカルシフェ ロール/炭酸マグネシウム	内-1	錠剤		デノスタチュアブル配 合錠	
		甲状腺腫、甲状腺機能低下	ヨードの補給			ヨウ素製剤	ヨウ化カリウム	内-1 内-2	丸剤 末剤		ヨウ化カリウム	
							ヨウ素レシチン	内-1 内-2	錠剤 散剤		ヨウレチン	
		鉄欠乏性貧血	鉄の補給			鉄製剤	硫酸鉄	内-1	錠剤		フェロ・グラデュメット	
							フマル酸第一鉄	内-1	カプセル剤		フェルム	
							溶性ピロリン酸第二鉄	内-3	シロップ剤		インクレミン	
							クエン酸第一鉄ナトリウム	内-1 内-2	錠剤 顆粒剤		フェロミア	
		低カリウム血症				カリウム製剤	塩化カリウム	内-1 内-2 内-3	錠剤 末剤 液剤		スローケー	
							酢酸カリウム	内-3	液剤		酢酸カリウム液	
							Ｌ-アスパラギン酸カリウム	内-1 内-2	錠剤 散剤		アスパラK	
							グルコン酸カリウム	内-1 内-2	錠剤 細粒剤		グルコンサンK	
		脱水症等における電解質の 補給	配合剤(水分、カリウム、マグネシ ウムの補給)			配合剤	ナトリウム/カリウム/マグネシウム	内-2	顆粒剤		ソリター-T	
		低カリウム状態におけるカリ ウム補給	配合剤(カリウム、マグネシウ ムの補給)			配合剤	アスパラギン酸カリウム/マグネシウ ム	内-1	錠剤		アスパラ	
		低リン血症	配合剤(リンの補充)			配合剤	リン酸水素ナトリウム一水和物／ 無水リン酸水素二ナトリウム	内-2	顆粒剤		ホスリボン配合顆粒	
2	無機質製剤	低カルシウム血症	カルシウムの補給			カルシウム製剤	グルコン酸カルシウム	注-1	注射薬		カルチコール	
							塩化カルシウム	注-1	注射薬		塩カル	
		鉄欠乏性貧血	鉄の補給			鉄製剤	含糖酸化鉄	注-1	注射薬		フェジン	
		低カリウム血症	カリウムの補給			カリウム製剤	塩化カリウム	注-1	注射薬		K. C. L.	
							Ｌ-アスパラギン酸カリウム	注-1 注-2	注射薬 キット		アスパラK アスパラギン酸カリウ ム注10mEqキット 「テルモ」(10mL)	
		低マグネシウム血症	マグネシウムの補給			マグネシウム製剤	硫酸マグネシウム	注-1 注-2	注射薬 キット		コンクライト-Mg メディジェクトMg	
							リン酸二カリウム	注-2	キット		リン酸2カリウム注	
		電解質補液の電解質補正	リン酸の補正			リン酸塩	リン酸二カリウム	注-2	キット		10%塩化ナトリウム 注射液	
			ナトリウムの補正			ナトリウム製剤	塩化ナトリウム	注-1 注-2	注射薬 キット		コンクライト-L	
			カリウムの補正			カリウム製剤	乳酸ナトリウム	注-1	注射薬		コンクライト-K KCL注10mEqキッ ト「テルモ」(10mL) KCL注20mEqキッ ト「テルモ」(20mL)	
							塩化カリウム	注-1 注-2	注射薬 キット			
		低カリウム状態におけるカリ ウム補給	低クロルアルカロシスの是正			アンモニウム製剤	塩化アンモニウム	注-1	注射薬		コンクライトA	
			配合剤(カリウム、マグネシウ ムの補給)			配合剤	アスパラギン酸カリウム/マグネシウ ム	注-1	注射薬		アスパラ	
		高カリウム-静脈栄養時の亜 鉛、鉄、銅、マンガ、ヨウ素	配合剤(微量元素の補給)			配合剤	塩化マンガ、硫酸亜鉛	注-1	注射薬		エレメンミック	
								注-2	キット		エレメンミック注キット	

		アシドーシス	アシドーシス改善作用	酸性物質の中和作用			炭酸水素ナトリウム	注－1 注－2	注射薬 キット		メイロン	
			配合剤(アシドーシス改善作用)	血中CO2減少作用		配合剤	トロメタモール/塩化ナトリウム/塩化カリウム/水酢酸	注－1	注射薬		サムセット	

3 2 3 糖類剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	糖類剤	経口的栄養補給, ブドウ糖負荷試験	経口的栄養補給, ブドウ糖負荷試験			六炭糖	ブドウ糖	内ー2	末剤			
2	糖類剤	脱水症, 低血糖等	水・エネルギー補給			六炭糖	ブドウ糖	注ー1 注ー2	注射薬 キット			
		注射剤の溶解希釈剤				六炭糖	ブドウ糖(5%)	注ー2	キット			
		糖尿病等のエネルギー補給	水・エネルギー補給			六炭糖	果糖	注ー1	注射薬			
						二糖類	マルトース	注ー1	注射薬			
						五炭糖アルコール	キシリトール	注ー1	注射薬			
								注ー2	キット			

3 2 5 たん白アミノ酸・脂肪製剤

内注 外区	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き					
1	たん白アミノ酸・脂肪製剤	低タンパク血症等におけるアミノ酸補給				アミノ酸	総合アミノ酸製剤	内ー2	顆粒剤		ESポリタミン配合顆粒						
		低タンパク血症等における腎不全時のアミノ酸補給 末代償性肝硬変患者の低アルブミン血症改善				アミノ酸	腎不全用アミノ酸製剤	内ー2	顆粒剤		アミュー配合顆粒						
						分岐鎖アミノ酸	イソロイシン/ロイシン/バリン	内ー2	顆粒剤		リーバクト配合顆粒						
								内ー3	ゼリー		リーバクト配合経口ゼリー						
		栄養管理				経腸栄養剤	消化態	内ー2	散剤		エレンタールP乳幼児用配合内用剤						
								内ー2	散剤		エレンタール配合内用剤						
								内ー3	液剤		ツインラインNF配合経腸						
								内ー3	液剤		エンシュア・リキッド						
							半消化態	内ー3	半固形剤		ラコールNF配合経腸用半固形剤						
								内ー3	液剤		ラコールNF配合経腸用液						
内ー3	液剤								エネーボ配合経腸用液								
肝不全用成分栄養剤	内ー2							散剤		アミノレバンEN配合散 ヘバンED配合内用剤							
2	たん白アミノ酸・脂肪製剤	慢性肝障害時における脳症の改善				アミノ酸	肝不全用アミノ酸製剤	注ー1	注射薬		アミノレバン点滴静注						
		低タンパク血症等における腎不全時のアミノ酸補給				アミノ酸	腎不全用アミノ酸製剤	注ー1	注射薬		モリヘバミン点滴静注						
											キドミン輸液						
											ネオアミュー輸液						
		低タンパク血症等におけるアミノ酸補給	配合剤			配合剤	小児用高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤	注ー1	注射薬		ブレアミンーP注射液						
							高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤	注ー1	注射薬		モリブロンF輸液						
							総合アミノ酸製剤(ソルビトール加)	注ー1	注射薬		ハイ・ブレアミンS						
							総合アミノ酸製剤(ブドウ糖加)	注ー1	注射薬		プラスアミン輸液						
							アミノ酸/糖/電解質	注ー1	注射薬		アミカリック輸液						
		低タンパク血症等におけるアミノ酸・電解質・水分の補給	配合剤			配合剤		注ー2	キット		アミノフリード輸液						
							アミノ酸/糖/電解質/ビタミンB1	注ー2	キット		ビーフリード輸液 アミグランド輸液 パレセーフ輸液						
							アミノ酸/糖/電解質/水溶性ビタミン	注ー2	キット		パレプラス輸液						
							経中心静脈栄養の場合のアミノ酸・電解質・水分・カロリー補給	配合剤			配合剤	アミノ酸/糖/電解質	注ー2	キット		ビーエヌツイン1号輸液	
												アミノ酸/糖/電解質/ビタミン	注ー2	キット		フルカリック1号輸液 ネオバレン1号輸液 エルネオバ1号輸液 エルネオバNF1号輸液	
		術前術後、急・慢性消化器疾患等における栄養補給	熱量・必須脂肪酸補給				ダイズ脂肪	ダイズ油注射液	注ー1	注射薬		イントラリビッド輸液 イントラリボス輸液					

3 2 7 特殊ミルク製剤

内注 外区	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	特殊ミルク製剤	フェニルケトン尿症					フェニルアラニン除去ミルク	内ー2	末剤		フェニルアラニン除去ミ ルク	
		メープルシロップ尿症					ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミ ルク	内ー2	末剤		ロイシン・イソロイシン・ バリン除去ミルク	

3 3 1 血液代用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き	
2	血液代用剤	注射剤の溶解希釈/細胞外液の欠乏					生理食塩液	注－1 注－2	注射薬 キット		生食注 生食注TN		
		細胞外液の補給					リンゲル液	注－1	注射薬		リンゲル液		
		細胞外液の補給/代謝性アシドーシス補正					乳酸リンゲル液	注－1	注射薬		ラクテック		
		ブドウ糖加	乳酸リンゲル液	注－1	注射薬		ラクテックD						
		ソルビトール加	乳酸リンゲル液	注－1	注射薬		ラクテックG						
		マルトース加	乳酸リンゲル液	注－1	注射薬		ラクトリンゲルM						
			酢酸リンゲル液	注－1	注射薬		ウーイーンF						
			ブドウ糖加	酢酸リンゲル液	注－1	注射薬		ウーイーンD					
		血漿増量	血漿増量作用/末梢血管血 流改善作用	粘稠度低下作用		デキストラン製剤	デキストラン40/乳酸リンゲル	注－1	注射薬		低分子デキストランL 注、サヴィオゾール		
							デキストラン40/ブドウ糖	注－1	注射薬		低分子デキストラン 糖注		
				粘稠度低下作用/浸透圧維 持作用			ヒドロキシエチルデンプン70000	注－1	注射薬		サリンヘス、ヘスバ ンダー		
							ヒドロキシエチルデンプン130000	注－1	注射薬		ボルベン輸液		
		水分/電解質の補給						開始液	注－1	注射薬		KN補液1A、1B	
								脱水補充液	注－1	注射薬		KN補液2A、2B	
							低濃度糖	維持液	注－1	注射薬		KN補液3A、3B	
								高濃度糖	維持液	注－1	注射薬		KN補液MG3
									維持液(複合糖加)	注－1	注射薬		トリフリード
							電解質高張	維持液	注－1	注射薬		ソリタックスーH	
								術後回復液	注－1	注射薬		KN補液4A、4B	
								電解質キシリトール輸液	注－1	注射薬		クリニザルトB、S	

3 3 2 止血剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	止血剤	出血傾向・出血	止血作用	毛細管抵抗増強作用	血管透過性抑制作用		カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム	内－1 内－2 内－2	錠剤 散剤 細粒		アドナ	
			配合剤(止血作用) 止血作用	抗プラスミン作用		配合剤	アドレノクロムゲアニルヒドラゾンメシル酸塩 カルバゾクロム/アスコルビン酸 トラネキサム酸	内－1 内－1 内－2 内－2 内－3 内－4	錠剤 錠剤 カプセル剤 散剤 細粒剤 シロップ シロップ		S・アドクノン オフタルムK トランサミン	
		上部消化管出血	止血作用	トロンビン作用			トロンビン	内－2	細粒剤		トロンビン	
2	止血剤	出血傾向/出血	止血作用	毛細管抵抗増強作用 抗プラスミン作用	血管透過性抑制作用		カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム トラネキサム酸	注－1 注－1 注－2	注射薬 注射薬 キット		アドナ トランサミン 10%トランサボン注 シリンジ	
				トロンビン様作用		酵素	ヘモコアグラゼ	注－1	注射薬		レプチラーゼS	
			ヘパリン過量投与時の中和	ヘパリン拮抗作用		強塩基性ポリヘ プチド	プロタミン硫酸塩	注－1	注射薬		硫酸プロタミン	
		食道静脈瘤		血管内皮細胞障害作用			モノエタノールアミノオレイン酸塩	注－1	注射薬		オルダミン	
		一次性下肢静脈瘤(伏在静脈瘤の本幹を除く)硬化退縮	止血作用	血管内皮細胞障害作用/組織 繊維化作用			ポリドカノール	注－1	注射薬		ポリドカスクレロール	
3	止血剤	出血	止血作用	トロンビン作用			トロンビン	外－1 外－9	パウダー剤 キット		トロンビン トロンビン液モチダソ フトボトル	
				出血部位被覆作用、血小板 機能亢進作用、フィブリン形 成促進作用、赤血球凝集作 用		アルギン酸系	アルギン酸ナトリウム	外－1	パウダー剤		アルト	
		止血、創腔充填	止血作用	凝結塊形成作用		セルロース系	酸化セルロース	外－5	貼付剤		オキシセル/サージ セル	
		止血、褥瘡潰瘍	止血/癒着防止作用				ゼラチン	外－5	貼付剤		スポンゼル、ゼル フォーム	

333・339 血液凝固・血小板凝集阻止剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き		
1	血液凝固・血小板凝集阻止剤	血栓塞栓症	血液凝固阻止作用	抗ビタミンK作用		クマリン系	ワルファリンカリウム	内-1 内-2	錠剤 顆粒剤		ワーファリン			
		非弁膜症性心房細動患者における 虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の 発症抑制	血液凝固阻止作用	直接トロンビン阻害作用			ダビガトランエチキシラート メタンスルホン酸塩	内-1	カプセル剤		ブラザキサ			
			血液凝固阻止作用	第Ⅹa因子阻害作用			リバーロキサバン	内-1 内-2	錠剤 細粒剤		イグザレルト錠 イグザレルト細粒分 包			
					アビキサバン	内-1	錠剤		エリキュース錠					
		下肢整形外科手術施行患者にお ける静脈血栓塞栓症の発症抑制 非弁膜症性心房細動患者にお ける虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の 発症抑制					エドキサバン	内-1	錠剤		リクシアナ錠			
		慢性動脈閉塞症に伴う虚血性諸症 状の改善/心臓弁置換後の血栓・ 塞栓の抑制	血小板凝集抑制作用	ADP受容体拮抗作用			チクロピジン塩酸塩	内-1	錠剤		パナルジン錠			
		虚血性脳血管障害(心原性脳塞栓 症を除く)後の再発抑制 経皮的冠動脈形成術が適用される 虚血性心疾患					クロピドグレル硫酸塩	内-2 内-1	細粒剤 錠剤		パナルジン細粒 ブラビックス錠			
							プラスグレル塩酸塩	内-1	錠剤		エフィエント錠			
								チカグレロル	内-1	錠剤		ブリリタ錠		
	慢性動脈閉塞症に伴う虚血性諸症 状の改善/心臓弁置換後の血栓・ 塞栓の抑制	血小板凝集抑制作用/血管 拡張作用	プロスタグランジンI2放出促進・増 強作用				ジピリダモール	内-1 内-1	錠剤 カプセル剤		ベルサンチン錠 ベルサンチン-Lカプ セル			
			7-デヒドロシグナール増加作用		PGI2誘導体	ペラプロストナトリウム	内-1	錠剤		ドルナー錠 プロサイリン錠				
					PGE1誘導体	リマプロストアルファデクス	内-1	錠剤		オバルモン錠 プロレナール錠				
				EPA含量増加作用		EPA	イコサペント酸エチル	内-1	カプセル剤		エバデールS			
			5HT2受容体拮抗作用			サルボグレート塩酸塩	内-1 内-2	錠剤 細粒剤		アンブラーク錠 アンブラーク細粒				
			ホスホジエステラーゼ阻害作用			シロスタゾール	内-1 内-2 内-3	錠剤 散剤 ゼリー		プレタール				
		狭心症等の血栓形成抑制	血小板凝集抑制作用	トロンボキサンA2産生抑制 作用	シクロオキシゲナーゼ阻害作用		アスピリン	内-1	錠剤		バイアスピリン錠			
			配合剤(血小板凝集抑制作 用/血小板凝集抑制作用)	配合剤	アスピリン/ダイアルミニ アスピリン/クロピドグ レル硫酸塩	内-1 内-1	錠剤 錠剤		バファリン配合錠 コンブラピン配合錠					
		経皮的冠動脈形成術が適用される 虚血性心疾患	配合剤(血小板凝集抑制作 用/ADP受容体拮抗作用)	配合剤	アスピリン/ランソプラ ゾール	内-1	錠剤		タケルダ配合錠					
		経皮的冠動脈形成術が適用される 虚血性心疾患(胃潰瘍又は十二指 腸潰瘍の既往がある患者に限る)	配合剤(血小板凝集抑制作 用/胃酸分泌抑制作用)	配合剤										
		待機的な観血的手技を予定してい る慢性肝疾患患者における血小板 減少症の改善	トロンボボエチン受容体刺激 作用				ルストロンボバグ	内-1	錠剤		ムルプレタ錠			
		2	血液凝固・血小板凝集阻止剤	採取血液の凝固防止	血液凝固阻止作用	血液凝固Ⅳ因子(カルシウ ムイオン)捕捉作用		オキシカルボン酸 系	輸血用ケエン酸ナトリウム	注-1	注射薬		チトラミン	
				汎発性血管内血液凝固症(DIC)	血液凝固因子活性阻害作用 /アンチトロンビンⅢ結合作用	血液凝固因子活性阻害作用 /アンチトロンビンⅢ結合作用	非選択的Ⅹa及びトロンビン 阻害	未分画ヘパリン	ヘパリンカルシウム	注-1 注-2	注射薬 キット		ヘパリン	
選択的Ⅹa阻害	低分子ヘパリン					ヘパリンナトリウム	注-1	注射薬		ノボ・ヘパリン				
	低分子ヘパリン					ダナバロイドナトリウム	注-1	注射薬		オルガラ				
トロンビン活性阻害作用、プ ロテインC活性化作用	アンチトロンビンⅢ結合作用					選択的Ⅹa阻害	糖蛋白質	トロンボモデュリン アル ファ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		リコモジュリン		
下肢整形外科手術施行患者にお ける静脈血栓塞栓症の発症抑制	アンチトロンビンⅢ結合作用			アンチトロンビンⅢ結合作用	選択的Ⅹa阻害		フォンタバリヌクスナトリウ ム	注-1	注射薬		アリクストラ			
						低分子ヘパリン	注-2	キット		クレキサナ皮下注 キット				
血液体外循環時の灌流血液の凝固 防止(血液透析)						低分子ヘパリン	ダルテバリンナトリウム	注-1 注-2	注射薬 キット		フラグミン ダルテバリンNaシリ ンジ5000「HK」			
							バルナバリンナトリウム	注-1 注-2	注射薬 キット		ローヘバ ローヘバ注シリンジ			
							レバリンナトリウム	注-1	注射薬		クリバリン/ローモ リン			

339 その他の血液・体液用薬

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	その他の血液・ 体液用薬	放射線による白血球減少症	白血球増加作用	白血球減少抑制作用			アデニン	内ー1	錠剤		ロイコン	
			造血機能回復効果	血液幹細胞増加作用			セファランチン	内ー1 内ー2	錠剤 末剤		セファランチン	
2	その他の血液・ 体液用薬	骨髄移植後の顆粒球数増進	顆粒球・単球増加作用	G-CSF/M-CSF作用			ミリモスチム	注ー1	注射薬		ロイコブロール	
		放射線・抗がん剤投与等による白 血球減少症	白血球増加作用	CSFの内因的な誘導促進作用			結核菌熱水抽出物	注ー1	注射薬		アンサー	
			造血機能回復作用	白血球減少抑制作用 血液幹細胞増加作用			アデニン	注ー1	注射薬		ロイコン	
							セファランチン	注ー1	注射薬 +L2		セファランチン	
		抗がん剤投与等による好中球減少 症	好中球増加作用	G-CSF作用		G-CSF	フィルグラステム(遺伝子組換え) レノグラステム(遺伝子組換え) ナルトグラステム(遺伝子組換え) ベグフィルグラステム(遺伝子組換え)	注ー1 注ー2 注ー1 注ー1 注ー2	注射薬 キット 注射薬 注射薬 キット		グラン ノイトロジン ノイアップ ジーラスタ皮下注	
		自家末梢血幹細胞移植のための 造血幹細胞の末梢血中への動員 促進	CXCケモカイン受容体4拮抗作用				ブレリキサホル	注ー1	注射薬		モンビル皮下注	
		腎性貧血(透析施行中等を含む)	赤血球増加作用	造血前駆細胞に対するコロニー形 成亢進作用		ヒトエリスロポエチ ン	エポエチンアルファ (遺伝子組換え) エポエチン ベータ (遺伝子組換え) ダルベポエチン アルファ(遺伝 子組換え) エポエチン ベータ ベゴル(遺 伝子組換え)	注ー1 注ー2 注ー1 注ー2 注ー2	注射薬 キット 注射薬 キット キット		エスポー エボジン ネスブ注射液ブラシ リンジ ミルセラ注シリンジ	
		穿頭・開頭手術時の洗浄、脊髄疾 患手術時の洗浄及び神経内視鏡 手術時の灌流	配合剤			配合剤	ブドウ糖・塩化ナトリウム・塩化 カリウム・塩化マグネシウム・塩 化カルシウム水和物・リン酸二 水素カリウム・炭酸水素ナトリ ウム	注ー2	キット		アートセブ脳脊髄 手術用洗浄灌流液	
		ダビガトランの抗凝固作用の中和	血液凝固阻止剤の中和作用	ダビガトランの中和作用			イダルシズマブ(遺伝子組換	注ー1	注射薬		プリズバインド	

3 4 1 人工腎臓用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
2	人工腎臓用剤	急性・慢性腎不全	透析原理による血液浄化	重炭酸による体液の酸塩基平衡の是正	ブドウ糖添加による透析液の浸透圧上昇	Ca通常濃度		注－1	透析ろ過用剤		キンダリー液AF－1号	
								注－1	透析ろ過用剤		AK－ソリタ・C	
								注－1	透析ろ過用剤		キンダリー液AF－2号	
						Ca通常濃度		注－1	透析ろ過用剤		キンダリー液AF－2P号	
								注－1	透析ろ過用剤		キンダリー2D号	
								注－1	透析ろ過用剤		キンダリー2D号	
						Ca低濃度		注－1	透析ろ過用剤		AK－ソリタ・FL	
								注－1	透析ろ過用剤		AK－ソリタ・FP	
								注－1	透析ろ過用剤		キンダリー3D号	
								注－1	透析ろ過用剤		AK－ソリタ・M	
			ろ過と液補充による血液浄化	酢酸による体液の酸塩基平衡の是正	ブドウ糖添加による透析液の浸透圧上昇			注－1	透析ろ過用剤		AK－ソリタ	
								注－1	透析ろ過用剤		キンダリー液2号	
								注－1	透析ろ過用剤		AK－ソリタ・B	
								注－1	透析ろ過用剤		AK－ソリタ・B	
			ろ過と液補充による血液浄化	重炭酸による体液の酸塩基平衡の是正/血清電解質濃度の是正				注－1	透析ろ過用剤		バイフィル－S、バイフィル専用炭酸水素ナトリウム補充液、バイフィル専用炭酸水素ナトリウム補充液	
				血清電解質濃度の是正				注－1	透析ろ過用剤		HF－ソリタ、サブラッドA	
				重炭酸による体液の酸塩基平衡の是正				注－1	透析ろ過用剤		サブラッドB	

3 4 2 腹膜透析用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
2	腹膜透析用剤	急性・慢性腎不全	ブドウ糖低濃度	Ca通常濃度	Mg通常濃度	排尿用バッグなし		注－1	透析ろ過用剤			
								注－1	透析ろ過用剤			
						排尿用バッグ付き		注－1	透析ろ過用剤			
					Mg低濃度	排尿用バッグなし		注－1	透析ろ過用剤			
						排尿用バッグ付き		注－1	透析ろ過用剤			
				Ca低濃度	Mg通常濃度	排尿用バッグなし		注－1	透析ろ過用剤			
						排尿用バッグ付き		注－1	透析ろ過用剤			
					Mg低濃度	排尿用バッグなし		注－1	透析ろ過用剤			
						排尿用バッグ付き		注－1	透析ろ過用剤			
			ブドウ糖中濃度	Ca通常濃度	Mg通常濃度	排尿用バッグなし		注－1	透析ろ過用剤			
						排尿用バッグ付き		注－1	透析ろ過用剤			
					Mg低濃度	排尿用バッグなし		注－1	透析ろ過用剤			
						排尿用バッグ付き		注－1	透析ろ過用剤			
				Ca低濃度	Mg通常濃度	排尿用バッグなし		注－1	透析ろ過用剤			
						排尿用バッグ付き		注－1	透析ろ過用剤			
					Mg低濃度	排尿用バッグなし		注－1	透析ろ過用剤			
						排尿用バッグ付き		注－1	透析ろ過用剤			
			ブドウ糖高濃度	Ca通常濃度	Mg通常濃度	排尿用バッグなし		注－1	透析ろ過用剤			
								注－1	透析ろ過用剤			
						排尿用バッグ付き		注－1	透析ろ過用剤			
					Mg低濃度	排尿用バッグなし		注－1	透析ろ過用剤			
						排尿用バッグ付き		注－1	透析ろ過用剤			
				Ca低濃度	Mg通常濃度	排尿用バッグなし		注－1	透析ろ過用剤			
						排尿用バッグ付き		注－1	透析ろ過用剤			

					Mg低濃度	排尿用バッグなし		注－1	透析ろ過用剤			
						排尿用バッグ付き		注－1	透析ろ過用剤			
		慢性腎不全	膠質浸透圧物質による浸透圧			排液用バッグなし	イコデキストリン配合剤	注－1	透析ろ過用剤			
						排液用バッグ付き	イコデキストリン配合剤	注－1	透析ろ過用剤			

391 肝臓疾患用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	肝臓疾患用剤	高ビリルビン血症(閉塞性黄疸を除く)における肝機能の改善	虚血、低酸素条件下で肝機能恒常性維持作用				アミノエチルスルホン酸	内-2	散剤	1日3回	タウリン散「大正」	
		慢性肝疾患における肝機能の改善	代謝改善、重金属解毒作用	チオール基による代謝障害阻止作用／肝臓保護作用／抗アレルギー作用			チオプロニン	内-1	錠剤	1日3回	チオラ錠100	
			細胞の代謝反応促進作用				プロトボルフィリンニナトリウム	内-1	錠剤	1日3回		
			肝解毒機能増強作用／抗脂肪肝作用／肝細胞再生促進作用				ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン散	内-1	錠剤	1日2～3回	リバオール	
								内-2	散剤	1日2～3回	リバオール	
			細胞内酵素活性維持作用／細胞内脂質異常改善作用／血中タンパク分画改善作用				ポリエンホスファチジルコリン	内-1	カプセル剤	1日3回	EPL	
			肝実質細胞保護作用／肝実質再生促進作用				肝臓加水分解物	内-1	錠剤	1日3回	レナルチン腸溶錠	
		代償性肝硬変における肝機能の改善	肝タンパク代謝改善作用	蛋白合成・蛋白代謝改善による肝機能賦活作用／肝繊維化進展抑制作用			マロチラート	内-1	錠剤	1日3回	カンテック錠	
		HBs抗原陽性B型慢性肝炎におけるウイルスマーカーの改善	免疫賦活作用	ウイルス感染細胞破壊作用／抗体産生能増強による抗原排除促進作用			プロバゲルマニウム	内-1	カプセル剤	1日3回	セロシオン	
		高アンモニア血症	血中アンモニア低下作用	腸管内pH低下作用／アンモニア生成吸収抑制作用			ラクツロース	内-2	散剤	1日3回	ラクツロース・末「日研」	
								内-3	シロップ剤	1日3回	ラクツロース・シラップ「日研」	
2	肝臓疾患用剤							内-3	ゼリー	1日3回	カロリールゼリー	
							ラクチトール水和物	内-2	末剤	1日3回	ポルトラック	
			配合剤(血中アンモニア増加抑制作用)	血中アンモニア濃度調整作用		配合剤	Ｌ-アルギニン／Ｌ-アルギニン塩酸塩	内-2	顆粒剤	1日3～6回	アルギU顆粒	
		尿素サイクル異常症	血中アンモニア増加抑制作用	血中アンモニア濃度調整作用			フェニル酪酸ナトリウム	内-1	錠剤	1日3～6回	ブフェニール錠	
								内-2	顆粒剤	1日3～6回	ブフェニール顆粒	
		N-アセチルグルタミン酸合成酵素欠損症、イソ吉草酸血症、メチルマロン酸血症、プロピオン酸血症による高アンモニア血症	カルバモイルリン酸合成酵素I活性化作用	血中アンモニア濃度調整作用			カルグルミン酸	内-1	錠剤	1日2～4回	カーバグル分散錠	
		肝性脳症における高アンモニア血症の改善	核酸(RNA)合成阻害作用				リファキシミン	内-1	錠剤	1日3回	リフキシマ錠	
		小児ストロフルス、湿疹・皮膚炎、蕁麻疹、皮膚そう痒症、口内炎、フリクテン、薬疹・中毒疹。慢性肝疾患における肝機能異常の改善	配合剤(抗炎症作用／解毒作用／抗ウイルス作用＋偽アルドステロン症抑制作用)			配合剤	グリチルリチン／グリシン／システイン	注-1	注射薬	1日1回静注	強カネオミノファーゲンシー	
								注-2	キット	1日1回静注		
		高アンモニア血症	血中アンモニア低下作用	肝アルギナーゼ活性化作用			グルタミン酸アルギニン	注-1	注射薬	1日1～数回点滴静注	アルギメート	
			血中アンモニア増加抑制作用	血中アンモニア代謝促進作用			塩酸L-アルギニン	注-1	注射薬	1時間以上かけて点滴静注	アルギU注	
		慢性肝疾患における肝機能の改善	肝再生(肝細胞増殖)促進作用／抗脂肪肝作用				胎盤加水分解物	注-1	注射薬	1日1回皮下又は筋注	ラエンネック	
			細胞成分の保護、活性化作用	酸化還元反応への関与		還元型グルタチオン	グルタチオン	注-1	注射薬	1日1回筋注又は静注	グルタチオン	
			配合剤(蛋白質合成促進作用＋肝組織血流増加作用＋生体内代謝亢進作用)			配合剤	肝臓エキス／フラビンアデニンジスクレオチド	注-1	注射薬	1日1～2回皮下、筋又は静注	アデラピン	

392 解毒剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	解毒剤	鉛中毒	鉛中毒解毒作用	鉛イオンとキレート形成			エデト酸カルシウム 二ナトリウム	内ー1	錠剤	1日2～3回	ブライアンS錠	
		薬物中毒、アセトン血性嘔吐症（自 家中毒、周期性嘔吐症）、金属中 毒、妊娠悪阻、晩期妊娠中毒	薬物中毒解毒作用	助酵素的応、メルカプツール 酸の生成／その他の解毒機 構への関与／SH酵素・そ 他の細胞成分の保護活性化 ／酸化還元反応への関与		還元型グルタチオ ン	グルタチオン	内ー1	錠剤	1日1～3回	タチオン	
		薬物中毒（アセトアミノフェン過量摂 取時の解毒）	薬物中毒解毒作用			グルタチオン前駆 体	アセチルシステイン	内ー2 内ー3	散剤 液剤	1日1～3回 初回に 140mg/kg、その 後4時間毎に 70mg/kgを17回、 経口もしくは経胃 又は経十二指腸 投与	タチオン アセチルシステイン 内用液17.6%「セ ンジュ」	
		ウイルソン病(肝レンズ核変性症)	重金属解毒作用	血清銅と可溶性キレート形成 による尿排泄促進作用			D-ペニシラミン	内ー1	カプセル剤	1日1～数回	メタルカプターゼ	
				銅吸収阻害作用			トリエンチン塩酸塩	内ー1	カプセル剤	1日2～4回（ペ ニシラミンに不耐 性の場合）	メタライト	
							酢酸亜鉛水和物	内ー1	錠剤	1日3回	ノベルジン錠	
		輸血による慢性鉄過剰症（注射用 鉄キレートが不適当な場合）	鉄排泄作用				デフェラシロクス	内ー1	錠剤	1日1回	エクジェイド懸濁用 錠	
		慢性腎不全（進行性）における尿毒 症症状の改善および透析導入の遅	腎不全病態悪化抑制作用	消化管内での尿毒症毒素吸 着・排泄作用		多孔質炭素	球形吸着炭	内ー1 内ー2	カプセル剤 細粒剤	1日3回 1日3回	クレメジン	
		自家中毒・薬物中毒における吸着 及び解毒	自家中毒・薬物中毒解毒作 用				薬用炭	内ー2	末剤	1日数回	薬用炭	
		葉酸代謝拮抗剤の毒性軽減	抗葉酸代謝拮抗剤	核酸合成再開作用			ホリナートカルシウム	内ー1	錠剤	1日4回（6時間 間隔）	ロイコボリン	
		ホリナート・テカフル・ウラシル療法・結腸・ 直腸癌に対するテカフル・ウラシルの 抗腫瘍効果の増強	抗腫瘍効果増強作用	チミジル酸合成酵素の解離 遅延作用	還元物 （5,10-メチレ ンテトラヒド ロ葉酸）が FdUMPとチ ミジル酸合 成酵素と三 元複合体を 形成		ホリナートカルシウム	内ー1	錠剤	1日3回	ユーゼル錠25mg	
2	解毒剤	薬物中毒、アセトン血性嘔吐症（自 家中毒、周期性嘔吐症）、慢性肝疾 患における肝機能の改善	薬物中毒解毒作用	助酵素的応、メルカプツール 酸の生成／その他の解毒機 構への関与／チオール酵素 （SH酵素）・その他の細胞成 分の保護活性化／酸化還元 反応に関与		還元型グルタチオ ン	グルタチオン	注ー1	注射薬	1日1回筋注及 び静注	グルタチン注射用	
		薬物中毒の際の排泄促進（ただし、 pHの上昇により尿中排泄の促進さ れる薬物に限る）	薬物中毒解毒作用	制酸作用／中和作用			炭酸水素ナトリウム	注ー1 注ー2	注射薬 キット	1日1回静注	重ソー注	
		薬物中毒		メチル基転位、チオール基の 供給関与／抗脂肝作用		含硫アミノ酸	L-メチオニン	注ー1	注射薬	1日1回皮下又 は静注	L-メチオニン注射 液	

		ロクロニウム臭化物又はベクロニウム臭化物による筋弛緩状態からの回復	ロクロニウム臭化物又はベクロニウム臭化物との包接体の形成			スガマデクスナトリウム	注-1	注射薬	1日1回静注	ブリディオ静注	
		ヒ素、水銀、鉛、銅、金、ビスマス、クロム、アンチモン中毒	重金属解毒解毒作用	体内チオール基系酵素と金属イオンとの結合阻害作用／重金属と結合し可溶性キレート形成による体外排泄作用		ジメルカプロール	注-1	注射薬	1日目は6時間間隔で4回、2日目以降は1日1回筋注	バル筋注	
		鉛中毒	鉛解毒作用	金属イオンとキレート形成		エデト酸カルシウム二ナトリウム	注-1	注射薬	最初の5日間点滴静注	ブライアン点滴静注	
		シアンおよびシアン化合物による中毒、ヒ素剤による中毒	解毒作用	ミトコンドリア内の酵素、ロダナーゼにより、シアンと反応し、チオシアン酸塩を生成		チオ硫酸ナトリウム	注-1	注射薬	静注	デトキソール	
		シアン及びシアン化合物による中毒		水酸イオンとシアンイオンの置換によるシアノコバラミンの形成・尿中排泄作用		ヒドロキシコバラミン	注-1	注射薬	静注	シアノキット	
		エチレングリコール中毒、メタノール中毒	毒性代謝物生成抑制作用	肝臓アルコールデヒドロゲナーゼ阻害作用		ホメピゾール	注-1	注射薬	12時間毎に点滴静注	ホメピゾール点滴静注	
		中毒性メトヘモグロビン血症	メトヘモグロビン還元作用			メチルチオニウム塩化物水和物	注-1	注射薬	5分以上かけて静脈内投与	メチレンブルー静注	
		有機リン剤の解毒	有機リン剤中毒解毒作用			ヨウ化ブラリドキシム	注-1	注射薬	静注	パム静注	
		原発性及び続発性ヘモクロマトーシスにおける鉄排泄増加	鉄排泄作用	生体内で貯蔵鉄と特異的に結合し、キレート化合物ferrioxamineBを形成し腎より排泄		メシル酸デフェロキサミン	注-1	注射薬	1日1～2回で、筋注	デスフェラル注射用	
		イホスファミド投与による泌尿器系障害発現抑制	イホスファミド尿中代謝物の膀胱への接触抑制			メスナ	注-1	注射薬	1日3回静注	ウロミテキサン注	
		葉酸代謝拮抗薬の毒性軽減	抗葉酸代謝拮抗剤	核酸合成再開作用		ホリナートカルシウム	注-1	注射薬	1日4回(6時間間隔)	ロイコボリン注	
		レボホリナート、フルオロウラシル療法：胃がん(手術不能又は再発)および結腸、直腸がんに対するフルオロウラシルの抗腫瘍効果の増強	抗腫瘍効果増強作用	チミジル酸合成酵素の解離遅延作用	還元物(5,10-メチレンテトラヒドロ葉酸)がFdUMPとチミジル酸合成酵素と三元複合体を形成	レボホリナートカルシウム	注-1	注射薬	静注、1週間ごとに6回繰り返した後、2週間休薬	アイソボリン点滴静注用	
		チオクト酸の重要が増大した際の補給(激しい肉体労働時)、Leigh症候群(亜急性壊死脳脊髄炎)	代謝性薬物中毒解毒作用	生体内エネルギー産生亢進作用	TCAサイクルの代謝活性亢進	チオクト酸	注-1	注射薬	1日1回10～25mg、静注、筋注又は皮下注	チオトミン注	
		アントラサイクリン系抗悪性腫瘍剤の血管外漏出	トポイソメラーゼⅡ阻害作用			デクスラゾキサン	注-1	注射薬	血管外漏出後6時間以内。3日間連続投与。	サビーン点滴静注用	

393 習慣性中毒用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	習慣性中毒用 剤	慢性アルコール中毒者及び過飲酒 者に対する抗酒療法	抗酒作用	飲酒時の血中アルデヒド濃 度を上昇	アルデヒド脱水酵素阻害		シアナミド	内ー3	液剤	1日1～2回		
							ジスルフィラム	内ー2	末剤	1日1～3回		

394 痛風治療剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	痛風治療剤	痛風発作の緩解及び予防	痛風発作緩解作用	白血球の尿酸貪食作用／貪食好中球の脱顆粒阻止による白血球メーバ様運動抑制			コルヒチン	内－1	錠剤	1日6～8回	コルヒチン錠	
		痛風	血中尿酸値抑制作用	尿酸排泄促進作用	尿酸の尿細管再吸収抑制作用	安息香酸誘導体	プロベネシド	内－1	錠剤	1日2～4回	ベネシッド錠	
		痛風、高尿酸血症を伴う高血圧症の場合における高尿酸血症の改善					ベンズブロマロン	内－1	錠剤	1日1～3回	ユリノーム錠	
		痛風・高尿酸血症					アロプリノール	内－1	錠剤	1日2～3回	ザイロリック錠	
			尿酸生成の抑制	キサンチンオキシダーゼ阻害作用(還元型)	キサンチンオキシダーゼ阻害作用(酸化型、還元型)		フェブキシostat	内－1	錠剤	1日1回	フェブリク錠	
							トピロキシostat	内－1	錠剤	1日2回	トピロリック錠 ウリアデック錠	
		痛風並びに高尿酸血症における酸性尿の改善、アシドーシス	配合剤(代謝産物の重炭酸塩が生体において塩基として作用することによる酸性尿、アシドーシス改善作用)			配合剤	クエン酸カリウム ／クエン酸ナトリウム	内－1 内－2	錠剤 散剤	酸性尿:1日3回、アシドーシス:1日3～4回	ウラリット配合錠 ウラリットーU配合散	

395 酵素製剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
2	酵素製剤	脳血栓症、末梢動、静脈閉塞症	血栓溶解作用				ウロキナーゼ	注－1	注射薬	用時静注／ 点滴静注／ 冠動注		
		急性心筋梗塞における冠動脈血栓の溶解					モンテプラゼ(遺伝子組換え)	注－1	注射薬	静注	クリアクター注	
							アルテプラゼ(遺伝子組換え)	注－1	注射薬	静注	アクチバシン注	
		ゴーシェ病の諸症状(貧血、血小板減少症、肝脾腫及び骨症状)の改善	グルコセレブロシダーゼ作用				イミグルセラゼ(遺伝子組換え)	注－1	注射薬	点滴静注	セレザイム注200U	
							ベラグルセラゼ アルファ(遺伝子組換え)	注－1	注射薬	点滴静注	ピプリブ点滴静注用	
		ファブリー病	ガラクトシダーゼ作用				アガルシダーゼ ベータ(遺伝子組換え)	注－1	注射薬	点滴静注	ファブラザイム点滴静注用5mg	
							アガルシダーゼ アルファ(遺伝子組換え)	注－1	注射薬		リブレガル点滴静注用	
		ムコ多糖症Ⅰ型	α -L-イズロニダーゼ作用				ラロニダーゼ(遺伝子組換え)	注－1	注射薬	点滴静注	アウドラザイム点滴静注液	
		ムコ多糖症Ⅱ型	イズロン酸-2-スルファターゼ作用				イデュルスルファーゼ(遺伝子組換え)	注－1	注射薬	点滴静注	エラブレース点滴静注液	
		ムコ多糖症ⅣA型	N-アセチルガラクトサミン-6-スルファターゼ作用				エロスルファーゼ アルファ(遺伝子組換え)	注－1	注射薬	点滴静注	ビミジム点滴静注液	
		ムコ多糖症Ⅵ型	アリルスルファターゼB作用				ガルスルファーゼ(遺伝子組換え)	注－1	注射薬	点滴静注	ナグラザイム点滴静注液	
		糖原性Ⅱ型	酸性 α -グルコシダーゼ作用				アルグルコシダーゼ アルファ(遺伝子組換え)	注－1	注射薬	点滴静注	マイオザイム点滴静注用	
		低ホスファターゼ症	組織非特異型アルカリホスファターゼ作用				アスホターゼ アルファ(遺伝子組換え)	注－1	注射薬	皮下注	ストレンジック皮下注	
		ライソゾーム酸性リパーゼ欠損症(コレステロールエステル蓄積症、ウォルマン病)	ライソゾーム酸性リパーゼ作用				セベリパーゼ アルファ(遺伝子組換え)	注－1	注射薬	点滴静注	カヌマ点滴静注液	
		慢性動脈閉塞症(バージャー病、閉塞性動脈硬化症)の虚血性諸症状の改善、振動病における末梢循環障害の改善、突発性難聴における聴力の回復と自覚症状の改善	末梢循環改善作用	フィブリノゲン低下作用作用／フィブリノーゲン/フィブリン分解産物(FDP)の増加／ユーグロブリン溶解時間短縮作用／プラスミノーゲン量及び α 2-プラスミンインヒビターの減少作用等			バトロキシピン	注－1	注射薬	点滴静注	デフィブラーゼ	
		がん化学療法に伴う高尿酸血症	尿酸直接分解作用				ラスブリカーゼ(遺伝子組換え)	注－1	注射薬	点滴静注	ラスリテック点滴静注用	

396 糖尿病用薬

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き	
1	糖尿病用薬	インスリン非依存型糖尿病 (2型糖尿病)	膵β細胞刺激によるインスリン分泌促進作用			スルホニルウレア	アセトヘキサミド	内ー1	錠剤	1日1回又は2回	ジメリン錠		
							クロルプロバミド	内ー1	錠剤	1日1回	アベマイド錠		
							グリクロピラミド	内ー1	錠剤	1日1回	デアメリンS錠		
							トルブタミド	内ー1	錠剤	1日1回又は2回	ヘキストラスチノン錠		
								内ー2	散剤	1日1回又は2回	ヘキストラスチノン散		
							グリベンクラミド	内ー1	錠剤	1日1回又は2回	オイグルコン錠 ダオニール錠		
							グリクラジド	内ー1	錠剤	1日1回又は2回	グリミクロン錠		
							グリメピリド	内ー1	錠剤	1日1～2回	アマリール錠		
			膵β細胞刺激によるインスリン分泌促進作用(短時間速			フェニルアラニン誘導体	ナテグリニド	内ー1	錠剤	1日3回	スターシス錠 ファスティック錠		
						ベンジルコハク酸誘導体	ミチグリニドカルシウム水和物	内ー1	錠剤	1日3回	グルファスト錠		
						安息香酸誘導体	レバグリニド	内ー1	錠剤	1日3回	シュアポスト錠		
			インスリン抵抗性改善作用	細胞内インスリン情報伝達機構正常化作用／末梢(骨格筋、脂肪組織)での糖代謝増強作用 肝の糖新生抑制作用／腸管からのグルコース吸収抑制作用／末梢での糖利用促進		チアゾリジン誘導体	ピオグリタゾン塩酸塩	内ー1	錠剤	1日1回	アクトス錠		
			ジペプチジルペプチダーゼ4阻害作用	インクレチン分解抑制作用		ビグアナイド	メトホルミン塩酸塩	内ー1	錠剤	1日2～3回	グリコラン錠 メトグルコ錠		
							ブホルミン塩酸塩	内ー1	錠剤	1日2～3回	ジベトス錠		
								シタグリブチンリン酸塩水和物	内ー1	錠剤	1日1回	ジャヌビア錠 グラクティブ錠	
								アログリブチン安息香酸塩	内ー1	錠剤	1日1回	ネシーナ錠	
								ビルダグリブチン	内ー1	錠剤	1日2回	エクア錠	
								リナグリブチン	内ー1	錠剤	1日1回	トラゼンタ錠	
								テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物	内ー1	錠剤	1日1回	テネリア錠	
								アナグリブチン	内ー1	錠剤	1日2回	スイニー錠	
								サキサグリブチン水和物	内ー1	錠剤	1日1回	オングリザ錠	
								トレラグリブチンコハク酸塩	内ー1	錠剤	1週間に1回	ザファテック錠	
								オマリグリブチン	内ー1	錠剤	1週間に1回	マリゼブ錠	
			SGLT2阻害作用					イブラグリフロジン レブロリン	内ー1	錠剤	1日1回	スーグラ錠	
								トホグリフロジン水和物	内ー1	錠剤	1日1回	デベルザ錠 アブルウェイ錠	
								ダパグリフロジンプロピレングリコール水	内ー1	錠剤	1日1回	フォシーガ錠	
								ルセオグリフロジン水和物	内ー1	錠剤	1日1回	ルセフィ錠	
								カナグリフロジン水和物	内ー1	錠剤	1日1回	カナグル錠	
								エンパグリフロジン	内ー1	錠剤	1日1回	ジャディアンス錠	

			配合剤(インスリン抵抗性改善作用)	細胞内インスリン情報伝達機構正常化作用／末梢(骨格筋、脂肪組織)での糖代謝増強作用＋肝の糖新生抑制作用／腸管からのグルコース吸収抑制作用／末梢での糖利用促進作用		配合剤	ピオグリタゾン塩酸塩／メトホルミン塩酸塩	内－1	錠剤	1日1回	メタクト配合錠LD,同HD	
			配合剤(インスリン抵抗性改善作用／ β 細胞刺激によるインスリン分泌促進作用)			配合剤	ピオグリタゾン塩酸塩／グリメピリド	内－1	錠剤	1日1回	ソニアス配合錠LD,同HD	
			配合剤(β 細胞刺激によるインスリン分泌促進作用(短時間速効型)／ α グルコシダーゼ阻害作用)			配合剤	ミチグリニドカルシウム水和物／ボグリボース	内－1	錠剤	1日3回	グルベス配合錠	
			配合剤(ジペプチジルペプチダーゼ4阻害作用／インスリン抵抗性改善作用)			配合剤	アログリプチン安息香酸塩／ピオグリタゾン塩酸塩	内－1	錠剤	1日1回	リオベル配合錠LD,同HD	
			配合剤(ジペプチジルペプチダーゼ4阻害作用／インスリン抵抗性改善作用)	インクレチン分解抑制作用＋肝の糖新生抑制作用／腸管からのグルコース吸収抑制作用／末梢での糖利用促進作用		配合剤	ビルダグリプチン／メトホルミン塩酸塩	内－1	錠剤	1日2回	エクメット配合錠LD,同HD	
							アログリプチン安息香酸塩／メトホルミン塩酸塩	内－1	錠剤	1日1回	イニシंक配合錠	
		糖尿病の食後過血糖	α グルコシダーゼ(腸管での二糖類から単糖類への分解酵素)阻害作用				アカルボース	内－1	錠剤	1日3回	グルコバイ	
							ボグリボース	内－1	錠剤	1日3回	ベイスン	
							ミグリトール	内－1	錠剤	1日3回	セイブル	
		糖尿病による末梢神経障害に伴う自覚症状	神経内ソルビトールの蓄積抑制作用	アルドース還元酵素阻害作用			エパルレストアット	内－1	錠剤	1日3回	キネダック錠	
			血漿内 β エンドルフィン増加作用／サブスタチンP遊離抑制作用／神経細胞膜Na ⁺ 電流抑制作用				メキシレチン塩酸塩	内－1	カプセル剤	1日3回	メキシチールカプセル	
2	糖尿病用薬	糖尿病(インスリン療法)	インスリン補充作用	インスリン受容体刺激作用／血糖降下作用		ポリペプチド(ヒトインスリン(遺伝子組換え))	インスリン(遺伝子組換えヒトインスリン)	注-1	注射薬	初期:1日3回食前皮下注	ヒューマリンR注	
								注-2	キット	初期:1日3回食前皮下注	ヒューマカートRキット	
						中性インスリン(遺伝子組換えヒトインスリン)		注-1	注射薬	初期:1日3回食前皮下注	ペンフィルR注	
								注-2	キット	初期:1日3回食前皮下注	ノボレットRキット	
						インソフェンインスリン水性懸濁液(遺伝子組換えヒトインスリン)		注-1	注射薬	初期:1日1回朝食前30分以内皮下注	ヒューマリンN	
								注-2	キット	初期:1日1回朝食前30分以内皮下注	ノボレットNキット	
			配合(混合)剤(インスリン補充作用)	インスリン受容体刺激作用／血糖降下作用		配合(混合)剤	水溶性インスリン／インソフェンインスリン(遺伝子組換えヒトインスリン)	注-1	注射薬	初期:1日2回朝夕食前30分以内皮下注	ペンフィル30R	

					注-2	キット	初期:1日2回朝夕食前30分以内皮下注	ノボレット30R	
インスリン補充作用	インスリン受容体刺激作用／血糖降下作用		ポリペプチド(ヒトインスリンアナログ)	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬	初期:1日3回食直前15分以内皮下注	ヒューマログ注バイアル100単位/mL、ヒューマログ注カート	
					注-2	キット	初期:1日3回食直前15分以内皮下注	ヒューマログ注キット	
				インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	注-1	注射薬	初期:1日3回食直前15分以内皮下注	ノボラビッド注100単位/mL、ノボラビッド注150、ノボラビッドノボラビッド注フレックスベン	
					注-2	キット	初期:1日3回食直前15分以内皮下注		
				インスリン グルリジン(遺伝子組換え)	注-1	注射薬	1日3回食直前15分以内皮下注	アビドラ注	
					注-2	カートキット	1日3回食直前15分以内皮下注	アビドラ注カートアビドラ注ロススター	
				インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬	初期:1日1回朝食直前15分以内皮下注	ヒューマログN注カート	
					注-2	キット	初期:1日1回朝食直前15分以内皮下注	ヒューマログN注キット	
				インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	注-1	注射薬	1日1回朝食前又は就寝前皮下注	ランタス注バイアル1000	
					注-2	キット	1日1回朝食前又は就寝前皮下注	ランタス注キット300	
配合(混合)剤(インスリン補充作用)	インスリン受容体刺激作用／血糖降下作用		ポリペプチド(ヒトインスリンアナログ)配合(混合)剤	インスリン リスプロ/中間型インスリン リスプロ	注-1	注射薬	1日1回皮下注	ランタスXR注ロススター	
					注-2	キット	1日1回皮下注		
				インスリン デテムル(遺伝子組換え)	注-1	注射薬	1日1回食前又は就寝前皮下注	レベミル注	
					注-2	キット	1日1回食前又は就寝前皮下注	レベミル注フレックスベン イノレット	
				インスリン デグルデク(遺伝子組換え)	注-1	注射薬	1日1回皮下注	トレシーバ注 ベンフィル	
					注-2	キット	1日1回皮下注	トレシーバ注 フレックスタッチ	
				インスリン アスパルト/中間型インスリン アスパルト	注-1	注射薬	初期:1日2回朝食直前、夕食直前15分以内皮下注	ヒューマログミックス25注カート	
					注-2	キット	初期:1日2回朝食直前、夕食直前15分以内皮下注	ヒューマログミックス25注キット	
					注-1	注射薬	初期:1日2回朝食直前、夕食直前15分以内皮下注	ヒューマログミックス50注カート	
					注-2	キット	初期:1日2回朝食直前、夕食直前15分以内皮下注	ヒューマログミックス50注キット	
					注-1	注射薬	初期:1日2回朝食直前、夕食直前15分以内皮下注	ノボラビッド30ミックス注	
					注-2	キット	初期:1日2回朝食直前、夕食直前15分以内皮下注	ノボラビッド30ミックス注 フレックスベン	
					注-2	キット	初期:1日2回朝食直前、夕食直前15分以内皮下注	ノボラビッド50ミックス注 フレックスベン	

							注-2	キット	初期:1日3回食 直前皮下注	ノボラビッド70ミックス 注 フレックスペン	
						インスリン デグルデ ク(遺伝子組換え)/ インスリン アスパル ト(遺伝子組換え)	注-1	注射薬	1日1回主たる食 事の直前、又は 1日2回朝食直 前、夕食直前	ライゾデグ配合注 ペンフィル	
							注-2	キット		ライゾデグ配合注 フレックスタッチ	
2型糖尿病	血糖低下作用	GLP-1受容体アゴニスト		GLP-1受容体アナロ グ	リラグルチド(遺伝子 組換え)		注-2	キット	1回0.9mgを1日1 回朝又は夕に皮 下注	ビクトーザ皮下注	
					エキセナチド		注-2	キット	1回10 μ gを1日2 回朝夕食前に皮 下注	バイエッタ皮下注	
							注-2	キット	2mgを週に1回、 皮下注射	ビデュリオン皮下注 用	
					リキシセナチド		注-2	キット	1回20 μ gを1日1 回朝食前に皮下 注	リクスマア皮下注	
					デュラグルチド(遺伝 子組換え)		注-2	キット	0.75mgを週に1 回、皮下注射	トルリシティ皮下注ア テオス	
インスリン受容体異常症	血糖低下作用	ソマトメジンC受容体刺激作 用		ポリペプチド(天然型 ヒトソマトメジンC)	メカセルミン(遺伝子 組換え)		注-1	注射薬	1回 0.1～ 0.4mg/kg 皮下 注	ソマゾン注射用	

244・247・248・311・398・399 骨代謝疾患用剤(カルシウム剤を除く)

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品	線引き
1	骨代謝疾患用 剤(カルシウム剤除 く)	骨粗鬆症／骨粗鬆症におけ る骨量減少・疼痛	骨形成促進作用	蛋白同化ホルモン作用		ステロイド	メテノロン	内-1	錠剤	1日10～20mg、2 ～3回	ブリモボラン	
			骨吸収抑制作用／骨形成促 進作用	カルシトニン分泌促進作用		イソフラボン系	イブリフラボン	内-1	錠剤	1日3回	オステン	
			骨形成促進作用／骨吸収抑 制作用	ビタミンD作用	骨代謝回転改善作用	活性型ビタミンD3	カルシトリオール	内-1	錠剤 カプセル剤	1日2回	ロカルトロール	
						活性型ビタミンD3 誘導体	アルファカルシドール	内-1	錠剤 カプセル剤	1日1回	アルファロール	
								内-2	散剤	1日1回	アルファロール	
								内-3	液剤	1日1回	アルファロール	
				ビタミンK作用	オステオカルシナーカルボ キシグルタミン酸残基生成作 用	ビタミンK2	メナテトレノン	内-1	カプセル剤	1日3回	グラケーカプセル 15mg	
			骨吸収抑制作用	破骨細胞活性抑制作用		ビスホスホン酸塩	エチドロン酸ナトリ ウム	内-1	錠剤	1日1回2週間投 与後10～12週間 休薬、周期的間 歇投与	ダイドロネル錠200	
							アレンドロン酸ナトリ ウム水和物	内-1 内-1 内-3	錠剤 錠剤 ゼリー	1日1回起床時 1週間に1回起床 時	フォサマック錠5、ポ ナロン錠5mg フォサマック錠35mg、 ボナロン錠35mg ボナロンゼリー	
							リセドロン酸ナトリウ ム水和物	内-1	錠剤	1日1回起床時 1週間に1回起床 時 月1回起床時	アクトネル錠2.5mg、 ベネット錠2.5mg アクトネル錠17.5mg、 ベネット錠17.5mg アクトネル錠75mg、 ベネット錠75mg	
							ミノドロン酸水和物	内-1	錠剤	1日1回起床時 4週に1回起床時	リカルボン錠1mg、ポ ノテオ錠1mg リカルボン錠50mg、 ボノテオ錠50mg	
							イバンドロン酸ナトリ ウム水和物	内-1	錠剤	月1回起床時	ボンビバ錠100mg	
		閉経後骨粗鬆症	骨吸収抑制作用	卵胞ホルモン作用		ステロイド	エストリオール	内-1	錠剤	1回1.0mg 1日 2回	エストリール	
			配合剤(骨吸収抑制作用)	卵胞ホルモン補充作用/黄体 ホルモン補充作用		配合剤	エストラジオール・レ ボノルゲストレル	内-1	錠剤	1日1錠	ウエルナラ配合錠	
			骨吸収抑制作用		選択的エストロゲン受容体モ ジュレーター	ベンゾチオフェン系	ラロキシフェン塩酸塩	内-1	錠剤	1日1回	エビスタ錠60mg	
							バゼドキシフェン酢酸 塩	内-1	錠剤	1日1回	ビビアント錠20mg	
2	骨代謝疾患用 剤(カルシウム剤除 く)	骨粗鬆症／骨粗鬆症におけ る疼痛	骨形成促進作用	蛋白同化ホルモン作用		ステロイド	ナンドロロンデカン酸 塩	注-1	注射薬	1回25～50mg、3 週間ごとに筋注	デカーデュラポリン	
							メテノロン	注-1	注射薬	1回100mg、1～2 週間ごとに筋注	ブリモボランデポー	
			配合剤(骨吸収抑制作用)	卵胞ホルモン作用+男性ホル モン作用		配合剤	エストラジオール吉 草酸エステル/テスト ステロンエナント酸 エステル	注-1	注射薬	2～4週ごとに1 回1mL筋注	ダイホルモンデポー	

				卵胞ホルモン作用+男性ホル モン作用+男性ホルモン作用		配合剤	エストラジオール吉 草酸エステル/テスト ステロンエナント酸 エステル/テストステ ロンプロピオン酸エス	注-1	注射薬	2～4週ごとに1 回1mL筋注	ボセルモンデポー	
			骨吸収抑制作用／骨形成促 進作用／血清Ca低下作用			カルシトニン誘導体	エルカトニン	注-1	注射薬	週2回筋注ほか	エルシトニン注10[疼 痛改善]、エルシト ニン注20S[骨粗鬆 ラスカルトン10ディス ボ]	
			骨吸収抑制作用／血清Ca・P 低下作用				サケカルシトニン	注-1	注射薬	週2回筋注	サーモトニン	
			骨吸収抑制作用	破骨細胞活性抑制作用		ビスホスホン酸塩	アレンドロン酸ナトリ ウム水和物	注-1	注射薬	4週に1回点滴静 注	ボナロン点滴静注	
							イバンドロン酸ナトリ ウム水和物	注-2	キット	1ヶ月に1回静注	ボンビバ静注シリン ジ	
							ゾレドロン酸水和物	注-1	注射薬	1年に1回	リクラスト点滴静注液	
				破骨細胞活性抑制作用(RA NK-RANKL結合阻害作			デノスマブ(遺伝子組 換え)	注-2	キット	6ヶ月に1回皮下 投与	ブラリア皮下注	
		悪性腫瘍による高Ca血症	血清Ca低下作用／骨吸収抑 制作用	破骨細胞活性抑制作用		ビスホスホン酸塩	パミドロン酸二ナトリ ウム	注-1	注射薬	4時間以上かけ て単回点滴静注	アレディア注	
							ゾレドロン酸水和物	注-1	注射薬	15分以上かけて 点滴静脈内投与	ゾメタ注射液4mg	
			血清Ca低下作用／骨吸収抑 制作用／骨形成促進作用			カルシトニン誘導体	エルカトニン	注-1	注射薬	週2回筋注ほか	エルシトニン注40	
		多発性骨髄腫による骨病変 及び固形癌骨転移による骨 病変	骨吸収抑制作用	破骨細胞活性抑制作用(RA NK-RANKL結合阻害作 用)			デノスマブ(遺伝子組 換え)	注-1	注射薬	4週に1回皮下投 与	ランマーク皮下注	

399 他に分類されない代謝性医薬品

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品	線引き
1	他に分類されない代謝性医薬品	頭部外傷後遺症	脳代謝賦活作用	リン酸供与体として各種の酵素を介し、糖質、脂肪、蛋白質の代謝に関与			アデノシン三リン酸二ナトリウム	内-1	錠剤	1日3回	アデホスコーフ腸溶錠	
							内-2	顆粒剤	1日3回	アデホスコーフ顆粒		
			中枢神経賦活作用	脳代謝促進作用	脳内グルコース代謝亢進作用 ヘキソキナーゼ活性化作用		メクロフェノキサート塩酸 γ-アミノ酪酸	内-1 内-1	錠剤 錠剤		ルシドリール錠 ガンマロン錠	
			慢性膵炎における急性症状の寛解	非ペプタイド蛋白分解酵素阻害作用			カモスタットメシル酸塩	内-1	錠剤	1日3回	フオイバン錠	
			高インスリン血症低血糖症	インスリン分泌抑制作用			ジアゾキシド	内-1	カプセル剤	1日2回又は3回	ジアゾキシドカプセ	
			湿疹、蕁麻疹、薬疹、中毒疹、尋常性座瘡、多型滲出性紅斑	皮膚代謝の正常化作用／抗アレルギー作用／解毒作用	チオール酵素(SH酵素)賦活作用		L-システイン	内-1 内-2	錠剤 末剤	1日2～3回	ハイチオール錠 ハイチオール散	
		カルニチン欠乏症	ミトコンドリア機能賦活作用	組織内における慢性的なカルニチン欠乏状態は正作用	過剰蓄積したプロピオニル基をプロピオニルカルニチンとして体外(尿中)へ排泄し、有害なプロピオニル基からミトコンドリア機能を保護し代謝賦活		レボカルニチン塩化物	内-1	錠剤	1日3回	エルカルチン錠	
							レボカルニチン	内-3、4 内-1	液剤 錠剤	1日3回	エルカルチンFF内用液 エルカルチンFF錠	
							サブプロブテリン塩酸塩	内-2	顆粒剤	1日1～3回	ビオブテン顆粒	
		ジヒドロビオプテリン合成酵素欠損、ジヒドロプテリジン還元酵素欠損に基づく高フェニルアラニン血症(異型高フェニルアラニン血症)における血清フェニルアラニン値の低下	肝臓、脳においてフェニルアラニン水酸化酵素、チロシン水酸化酵素、トリプトファン水酸化酵素の補酵素として働くことによるフェニルアラニン値低下作用									
		腎移植における拒否反応の抑制	プリン合成阻害	肝で6-メルカプトプリンに代謝され、プリン代謝拮抗作用	DNA、RNA合成阻害作用	プリン誘導体	アザチオプリン	内-1	錠剤	1日初期量 2～3mg/kg、維持量 0.5～1mg/kg	イムラン錠	
				プリンのde novo系合成を阻害する G1、S、G2期に作用		イミダゾール系	ミゾリピン	内-1	錠剤	1日初期量 2～3mg/kg、維持量 0.5～1mg/kg、1日1～3回	プレディニン錠	
		腎移植後の難治性拒絶反応の治療	プリン合成阻害	プリンのde novo系合成を阻害する、G1、S、G2期に作用	肝エステラーゼによりミコフェノール酸に代謝され、イノシンモノホスフェート脱水素酵素阻害作用		ミコフェノール酸モフェチル	内-1	カプセル剤	1日2回12時間毎	セルセプトカプセル	
								内-3	散剤		セルセプト懸濁用散	
		腎、肝、心、肺、脾移植における拒絶反応の抑制、骨髄移植における拒絶反応及び移植片対宿主病の抑制	免疫抑制作用	主にT細胞の分化・増殖抑制、G0→G1移行期に作用	カルシニューリンの活性化を阻害し、インターロイキン2(IL-2)等のサイトカイン産生抑制作用		シクロスポリン	内-1 内-2	カプセル剤 細粒剤	1日2回	サンディミュンカプセル ネオールカプセル シクロスポリン細粒	
								内-3	液剤		サンディミュン内用液	
							タクロリムス水和物	内-1 内-2	カプセル剤 顆粒剤	1日2回	プログラフカプセル プログラフ顆粒	
								内-1	カプセル剤	1日1回朝	グラセプターカプセル	
		心移植における拒絶反応の抑制	免疫抑制作用	主に、T細胞の分化・増殖抑制、G1→S移行期に作用			エベロリムス	内-1	錠剤	1日2回	サーティカン錠	
		皮膚エリテマトーデス、全身性エリテマトーデス	抗炎症作用、免疫調節作用				ヒドロキシクロロキン硫酸塩	内-1	錠剤	1日1回	ブラケニル錠	
		維持透析下の二次性副甲状腺機能亢進症	カルシウム受容体活性化作用	PTH分泌抑制作用			シナカルセト塩酸塩	内-1	錠剤	1日1回	レグバラ錠	

		特発性肺線維症	サイトカイン産生調節作用	増殖抑制作用		ビルフェニドン	内-1	錠剤	1日3回	ビレスバ錠	
			テロシキンナーゼ阻害作用	抗線維化及び抗炎症作用		ニンテダニブエタンスルホン酸塩	内-1	カプセル剤	1日2回	オフエバカプセル	
		慢性特発性血小板減少性紫斑病	トロンボポエチン受容体刺激作用			エルロンボバグ オラミン	内-1	錠剤	1日1回	レボレード錠	
		多発性硬化症の再発予防及び身体的障害の進行抑制	スフィンゴシン1-リン酸受容体機能的アンタゴニスト			フィンゴリモド塩酸塩	内-1	カプセル剤	1日1回	イムセラカプセル ジレニアカプセル	
			神経細胞保護作用、抗炎症作用			フマル酸ジメチル	内-1	カプセル剤	1日2回	テクフィデラカプセル	
		ニーマン・ピック病C型	グリコシルセラミド合成酵素阻害作用			ミグルスタット	内-1	カプセル剤	1日3回	プレーザベスカプセル	
		ホモシスチン尿症	メチル基供与によるホモシステイン低下作用			ベタイン	内-2	末剤	1日2回	サイスタダン原末	
		腎性シスチン症	ジスルフィド交換反応による細胞内シスチン濃度低下作用			システアミン酒石酸塩	内-1	カプセル剤	1日4回	ニシスタゴンカプセル	
		高チロシン血症Ⅰ型	4-ヒドロキシフェニルピルビン酸ジオキシゲナーゼ(HPPD)阻害作用			ニチシノン	内-1	カプセル剤	1日2回	オーファディンカプセル	
		ゴーシェ病の諸症状(貧血、血小板減少症、肝脾腫及び骨症状)の改善	グルコシルセラミド合成酵素阻害作用			エリグルスタット酒石酸塩	内-1	カプセル剤	1日2回	サデルガカプセル	
2	他に分類されない代謝性医薬品	進行する感音性難聴(音響外傷を含む)	結合織成分補充作用	尿量増加作用／尿蛋白減少作用／結合織コラーゲン繊維再生促進作用／コラーゲン線維安定化作用		コンドロイチン硫酸ナトリウム	注-1	注射薬	1日1回、静注又は筋注	1%コンドロン注	
		頭部外傷後遺症	脳代謝賦活作用	リン酸供与体として各種の酵素を介し、糖質、脂肪、蛋白質の代謝に関与		アデニン三リン酸二ナトリウム	注-1	注射薬	1日1～2回静注、筋注、皮下注又は1日1回点滴静注	アデニンP注射液10mg	
		頭部外傷に伴う意識障害	脳血流増加作用／脳代謝改善作用	上行性網様賦活系及び錐体外路系活性化作用		シチコリン	注-1 注-2	注射薬 キット	1日1～2回点滴静注	ニコリン	
		変形性膝関節症、肩関節周囲炎、(スベニール)慢性関節リウマチにおける膝関節痛	上皮細胞の接着・進展促進作用	履歴		ヒアルロン酸ナトリウム	注-1 注-2	注射薬 キット	1週間ごとに連続5回投与 1週間ごとに連続5回投与	アルツ アルツディスボ	
		保存的非薬物治療及び経口薬物治療が十分奏効しない疼痛を有する変形性膝関節症の患者の疼痛緩和	関節液の補填			ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマー／ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマービニルスルホン架橋	注-2	キット	1週間ごとに連続3回投与	サイビスクディスボ	
		急性肺炎、慢性再発性肺炎の急性増悪期、術後の急性肺炎	蛋白分解酵素阻害作用／血液凝固系阻害作用／血小板凝集抑制作用			ガベキサートメシル酸塩	注-1	注射薬	点滴静注	注射用エフオーワイ	
			酵素阻害作用／蛋白分解酵素阻害作用			ウリナスタチン	注-1	注射薬	1日1～3回点滴静注	ミラクリッド	
			蛋白分解酵素阻害作用／血液凝固系阻害作用／血小板凝集抑制作用			ナファモスタットメシル酸塩	注-1	注射薬	約2時間前後かけて1～2回点滴静注ほか	注射用フサン	
		透析施行中の腎性貧血	造血作用	造血前駆細胞に対するコロニー形成亢進作用		エポエチン α (遺伝子組換え)	注-1	注射薬	緩徐に静注	エスポー注射液	
		透析導入前、透析施行中の腎性貧血	造血作用	造血前駆細胞に対するコロニー形成亢進作用		エポエチン β (遺伝子組換え)	注-1	注射薬	静注、皮下注	エボジン注750	
		慢性特発性血小板減少性紫斑病	トロンボポエチン受容体刺激作用	巨核球系前駆細胞直接作用		ロミブロステム(遺伝子組換え)	注-1	注射薬	週1回皮下注	ロミプレート皮下注250 μ g調製用	

		カルニチン欠乏症	ミトコンドリア機能賦活作用	組織内における慢性的なカルニチン欠乏状態は正作用	過剰蓄積したプロピオニル基をプロピオニルカルニチンとして体外（尿中）へ排泄し、有害なプロピオニル基からミトコンドリア機能を保護し代謝賦活		レボカルニチン	注－１	注射薬	通常、１回３～６時間ごとに点滴静注 血液透析に伴うカルニチン欠乏症に対しては、透析終了時に透析回路静脈側に注入（静注）	エルカルチンFF静注	
		腎、肝、心、肺、膵移植における拒絶反応の抑制、骨髄移植における拒絶反応及び移植片対宿主病の抑制	免疫抑制作用	主にT細胞の分化・増殖を抑制、G0→G1移行期に作用	カルシニューリンの活性化を阻害し、IL-2等のサイトカイン産生を抑制		シクロスポリン	注－１	注射薬	点滴静注	サンディミュン注射液	
		腎移植後の拒絶反応（促進型及び急性）の治療	免疫抑制作用	リンパ球の分化、増殖抑制作用			タクロリムス水和物	注－１	注射薬	点滴静注	プログラフ注射液	
		全身性炎症反応症候群に伴う急性肺障害の改善	好中球エラスターゼ阻害作用				グスベリムス塩酸塩	注－１	注射薬	１日１回点滴静注	スバニジン注射液	
		既存治療で効果不十分な下記疾患 尋常性乾癬、関節症性乾癬	IL-12/23p40阻害作用			ヒトIL-12及びIL-23のp40サブユニットに対する遺伝子組換えヒトIgG1モノクローナル抗体	ウステクスマブ（遺伝子組換え）	注－２	注射薬（キット）	24時間静脈内持続投与	注射用エラスポール100	
			IL-17A阻害作用			ヒトIL-17Aに対する遺伝子組換えヒトIgG1モノクローナル抗体	セクキスマブ（遺伝子組換え）	注－２	キット		コセンティクス皮下注シリンジ コセンティクス皮下注ペン	
			IL-17 受容体A阻害作用			ヒトIL-17Aに対する遺伝子組換えヒトIgG4モノクローナル抗体	イクセキズマブ（遺伝子組換え）	注－２	キット		トルツ皮下注80mgシリンジ トルツ皮下注80mgオートインジェクター	
						ヒトIL-17受容体Aに対する遺伝子組換えヒトIgG2モノクローナル抗体	プロダルマブ（遺伝子組換え）	注－２	キット		ルミセフ皮下注シリンジ	
		以下のクリオピリン関連周期性症候群 ・家族性関連自己炎症症候群 ・マックス・ウェルズ症候群 ・新生児期発症多臓器系炎症性疾患	IL-1β 阻害作用			448 個のアミノ酸残基からなるH鎖（γ 1 鎖）2 分子及び214個のアミノ酸残基からなるL鎖（κ 鎖）2分子で構成される糖タンパク質（分子量：約148, 000）	カナキマブ（遺伝子組換え）	注－１	注射薬		イラリス皮下注用	
		多発性硬化症の再発予防	免疫調節作用				グラチラマー酢酸塩	注－２	キット	1日1回皮下注	コパキソン皮下注シリンジ	
		血液透析下の二次性副甲状腺機能亢進症	カルシウム受容体活性化作用	PTH分泌抑制作用			エテルカルセチド塩酸塩	注－１	注射薬	週3回透析終了時の返血時に投与	バーサビブ静注透析用	

421－429 腫瘍用薬

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き	
1	腫瘍用薬	悪性腫瘍	抗腫瘍作用	核酸合成阻害作用	DNAアルキル化／架橋形成作用	ナイトロジェン・マスタード系	シクロホスファミド	内－1	錠剤		エンドキサン錠		
								内－2	末剤		経口用エンドキサン原本		
							メルファラン	内－1	錠剤		アルケラン錠		
						アルキルスルホネート系	ブスルファン	内－2	散剤		マブリン散		
					イミダゾテトラジン系		テモゾロミド	内－1	カプセル剤	テモダールカプセル			
					葉酸系		メトレキサート	内－1	錠剤	メソトレキサート錠			
					DNAアルキル化／DNA傷害作用 核酸合成過程の代謝阻害（ジヒドロ葉酸還元阻害作用） 核酸合成過程の代謝阻害（DNAポリメラーゼ活性阻害作用） 核酸合成過程の代謝阻害（TMP合成阻害作用）	ピリミジン（シチシンアラビノシド）系	シタラピンオクホスファート	内－1	カプセル剤		スタラシドカプセル		
							ピリミジン（フッ化ピリミジン）系	フルオロウラシル	内－1	錠剤			5－FU錠
									内－3	ドライシロップ剤			フルオロウラシルシロップ用
								ドキシフルリジン	内－1	カプセル剤			フルツロンカプセル
							テガフル	内－1	アセル剤		フトラフルカプセル		
								内－2	顆粒剤		フトラフル腸溶顆粒		
							カベシタピン	内－1	錠剤		ゼローダ錠		
					核酸合成過程の代謝阻害（プリン環生成阻害作用、ヌクレオチド転換阻害作用） 核酸合成過程の代謝阻害（DNA・RNAポリメラーゼ活性阻害作用） 核酸合成過程の代謝阻害（リボヌクレオチドレダクターゼ阻害作用）	プリン系	メルカプトプリン	内－2	散剤		ロイケリン散		
								フルダラビンリン酸エステル	内－1	錠剤			フルダラ錠
							尿素置換体	ヒドロキシカルバミド	内－1	カプセル剤			ハイドレアカプセル
						巨核球の分化・成熟抑制作用			アナグレリド塩酸塩水和物	内－1	カプセル剤		アグリリンカプセル
				配合剤（抗腫瘍作用）	核酸合成阻害作用		核酸合成過程の代謝阻害（TMP合成阻害作用）／5-FU代謝阻害作用	配合剤	テガフル／ウラシル	内－1	カプセル剤		ユーエフティ配合カプセル
			内－2							顆粒		ユーエフティE配合顆粒	
			核酸合成過程の代謝阻害（TMP合成阻害作用）／5-FU代謝阻害作用／消化管粘膜細胞における5-FUリン酸化抑制作用			配合剤	テガフル／ギメラシル／オテラシルカリウム	内－1	カプセル錠剤		ティーエスワン配合カプセル ティーエスワン配合OD錠 ティーエスワン配合顆粒		
								内－1	顆粒剤				
				核酸への取り込みによる抗腫瘍作用／トリフルリジン代謝阻害作用	配合剤	トリフルリジン／チピラシル塩酸塩	内－1	錠剤		ロンサーフ配合錠			
			抗腫瘍作用	核酸合成阻害／ホルモン様作用 殺細胞作用	DNAアルキル化／架橋形成作用、エストロゲン作用 DNA-Ⅱ型トポイソメラーゼ阻害作用	ナイトロジェン・マスタードとエストロゲンの化合物 ビスジオキソビペラジン系	エストラムスチニン酸エステルナトリウム	内－1	カプセル剤		エストラサイトカプセル		
							ソブゾキサン	内－2	細粒剤		ペラプリン細粒		
				核酸及び蛋白合成阻害作用		エビボドフィロトキシニン系	エトボシド	内－1	カプセル剤		ラスデットSカプセル ベブシドカプセル		
											塩酸プロカルバジンカプセル		
				分化誘導作用	PML-RAR-αⅡ融合遺伝子の抑制作用	ビタミンA活性代謝物	トレチノイン	内－1	カプセル剤		ベサノイドカプセル		
				抗腫瘍免疫能賦活作用		放線菌ペプチド 多糖体	タミバロテン	内－1	錠剤		アムノレイク錠		
							ウベニメクス	内－1	カプセル剤		ベスタチンカプセル		
				かわらたけ多糖体	内－2	細粒剤		クレステチン					
ホルモン様作用	抗エストロゲン作用	トリフェニルエチレン系	タモキシフェンクエン酸塩	内－1	錠剤		ノルバデックス錠						

						クエン酸トレミフェン	内ー1	錠剤		フェアストン錠	
					黄体ホルモン	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	内ー1	錠剤		ヒスロンH錠	
					アンドロスタン系	メビチオスタン	内ー1	カプセル剤		チオデロンカプセル	
				アンドロゲンからのエストロゲン生成抑制作用(アロマターゼ阻害作用)	トリアゾール系	アナストロゾール	内ー1	錠剤		アリミデックス錠	
						レトロゾール	内ー1	錠剤		フェマーラ錠	
					ステロイド系	エキセメスタン	内ー1	錠剤		アロマシン錠	
				抗アンドロゲン作用	トリフルオロメチルフェニル	フルタミド	内ー1	錠剤		オダイン錠	
						ピカルタミド	内ー1	錠剤		カソデックス錠	
				抗アンドロゲン作用/アンドロゲン受容体シグナル伝達阻害作用		エンザルタミド	内ー1	カプセル剤		イクスタンジカプセル	
				アンドロゲン合成酵素阻害作用		アピラテロン酢酸エステル	内ー1	錠剤		ザイティガ錠	
				抗アンドロゲン作用	卵胞ホルモン	エチニルエストラジオール	内ー1	錠剤		プロセキソール錠	
					黄体ホルモン	クロルマジノン酢酸エステル	内ー1	錠剤		プロスターール錠	
				脳下垂体性ゴナドトロピン分泌抑制作用	男性ホルモン	メチルテストステロン	内ー1	錠剤		エナルモン錠	
				ステロイド合成阻害作用		ミトタン	内ー1	カプセル剤		オベプリム	
				チロシンキナーゼ阻害作用	Bcr-Ablチロシンキナーゼ阻害	2-フェニルアミドピリジン系	イマチニブメシル酸塩	内ー1	錠剤	グリベック錠	
							ニロチニブ塩酸塩水和物	内ー1	カプセル剤	タシグナカプセル	
							ダサチニブ水和物	内ー1	錠剤	スプリセル錠	
							ボスチニブ水和物	内ー1	錠剤	ボシユリフ錠	
							ボナチニブ塩酸塩	内ー1	錠剤	アイクルシグ錠	
					上皮成長因子受容体(EGFR)チロシンキナーゼ阻害	4-アニリキノゾリン系	ゲフィチニブ	内ー1	錠剤	イレッサ錠	
					不可逆的ErbB受容体チロシンキナーゼ阻害作用		エルロチニブ塩酸塩	内ー1	錠剤	タルセバ錠	
							アフチニブマレイン酸塩	内ー1	錠剤	ジオトリフ錠	
					活性化変異及びT790M変異を有するEGFRチロシンキナーゼ阻害作用		オシメルテニブメシル酸塩	内ー1	錠剤	タグリッソ錠	
					EGFR/HER2デュアルチロシンキナーゼ阻害作用		ラパチニブトシル酸塩水和物	内ー1	錠剤	タイケルブ錠	
				腫瘍細胞増殖抑制作用(Rafキナーゼ阻害)、血管新生抑制作用(VEGFR阻害)	ピアリル尿素系	ソラフェニブトシル酸塩	内ー1	錠剤		ネクサパール錠	
				腫瘍細胞増殖抑制作用、血管新生抑制作用		スニチニブリンゴ酸塩	内ー1	カプセル剤		スーテントカプセル	
				腫瘍細胞増殖抑制作用、血管新生抑制作用(VEGFR阻害)		アキシチニブ	内ー1	錠剤		インライタ錠	
				腫瘍細胞増殖抑制作用(Rafキナーゼ阻害)、血管新生抑制作用(VEGFR阻害)	ピアリル尿素系	ソラフェニブトシル酸塩	内ー1	錠剤		ネクサパール錠	
				腫瘍細胞増殖抑制作用、血管新生抑制作用		レンバチニブメシル酸塩	内ー1	カプセル剤		レンビマカプセル	
						バンデタニブ	内ー1	錠剤		カブレラサ錠	
				血管内皮増殖因子受容体(VEGFR)阻害、血小板由来増殖因子受容体(PDGFR)阻害、幹細胞因子受容体(c-Kit)阻害作用		パゾパニブ塩酸塩	内ー1	錠剤		ヴォトリエント錠	
				血管新生阻害作用、腫瘍細胞増殖抑制作用、間質細胞シグナル伝達阻害作用		レゴラフェニブ水和物	内ー1	錠剤		ステパーガ錠	
				未分化リンパ腫キナーゼ(ALK)阻害作用		クリゾチニブ	内ー1	カプセル剤		ザーコリカプセル	

							アレクチニブ塩酸塩	内ー1	カプセル剤		アレセンサカプセル	
							セリチニブ	内ー1	カプセル剤		ジカディアカプセル	
					ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害作用		ルキシロチニブリン酸塩	内ー1	錠剤		ジャカビ錠	
					フルトン型チロシキナーゼ阻害作用		イブルチニブ	内ー1	カプセル剤		イムブルピカカプセル	
				セリン／スレオニンキナーゼ阻害作用	BRAF阻害作用		ベムラフェニブ	内ー1	錠剤		ゼルボラフ錠	
							ダブラフェニブメシル酸塩	内ー1	カプセル剤		タフィンラーカプセル	
					MEK阻害作用		トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物	内ー1	錠剤		メキニスト錠	
				mTOR阻害作用	腫瘍細胞増殖抑制作用、血管新生抑制作用		エベロリムス	内ー1	錠剤		アフィニートール錠	
								内ー1	錠剤		アフィニートール分散錠	
							シロリムス	内ー1	錠剤		ラバリムス錠	
				骨髄腫細胞増殖抑制作用			サリドマイド	内ー1	カプセル剤		サレドカプセル	
							レナリドミド水和物	内ー1	カプセル剤		レブラミドカプセル	
							ボマリドミド	内ー1	カプセル剤		ボマリストカプセル	
				ヒストン脱アセチル化酵素阻害作用			バノビノスタット乳酸塩	内ー1	カプセル剤		ファリーダックカプセル	
							ボリノスタット	内ー1	カプセル剤		ゾリンザカプセル	
				レチノイドX受容体結合作用	アポトーシス誘導作用、細胞周期停止作用	合成レチノイド	ベキサロテン	内ー1	カプセル剤		タルグレチンカプセル	
2	腫瘍用薬	悪性腫瘍	抗腫瘍作用	核酸合成阻害作用	DNAアルキル化／架橋形成作用	ナイトロジェン・マスタード系	シクロホスファミド	注ー1	注射薬		注射用エンドキサン	
							メルファラン	注ー1	注射薬		アルケラン静注用	
							イホスファミド	注ー1	注射薬		注射用イホマイド	
						アルキルスルホネート系	ブスルファン	注ー1	注射薬		ブスルフェクス点滴静注用	
						ナイトロジェン・マスタード系／ベンゾイミダゾール系	ベンダムスチン塩酸塩	注ー1	注射薬		トレアキシ点静注用	
						ニトロソウレア系	ストレプトゾシン	注ー1	注射薬	点滴静注	ザノサー点滴静注用	
							ニムスチン塩酸塩	注ー1	注射薬		ニドラン注射用	
							ラニムスチン	注ー1	注射薬		注射用サイメリン	
							ダカルバジン	注ー1	注射薬		ダカルバジン注射用	
					DNAアルキル化／DNA傷害作用	イミダゾテトラジン系	テモゾロミド	注ー1	注射薬	点滴静注	テモダール点滴静注用	
				核酸合成過程の代謝阻害(ジヒドロ葉酸還元阻害作用)	葉酸系		メトレキサート	注ー1	注射薬		メトレキサート点滴静注液	
				核酸合成過程の代謝阻害(TMP合成阻害作用)	ピリミジン(フッ化ピリミジン)系		フルオウラシル	注ー1	注射薬		5-FU注	
							テガフル	注ー1	注射薬		フトラフル注	
				核酸合成過程の代謝阻害(DNAポリメラーゼ活性阻害作用)	ピリミジン(シタラビノシド)系		シタラビン	注ー1	注射薬		キロサイド注	
							ゲムシタビン塩酸塩	注ー1	注射薬		ジェムザール注射用	
							エノシタビン	注ー1	注射薬		サンラビン点滴静注	
						プリン系	ネララビン	注ー1	注射薬		アラノンジー静注用	

核酸合成過程の代謝阻害(DNAポリメラーゼ活性阻害作用、リボヌクレオチドレクターゼ阻害作用)	プリン系	クロファラビン	注－1	注射薬		エボルトラ点滴静注
タンパク質合成阻害作用(RNAへの取り込みによる殺細胞作用)		アザシチジン	注－1	注射薬	皮下注、点滴静注	ビダーザ注射用
核酸合成過程の代謝阻害(DNA・RNAポリメラーゼ活性阻害作用)	プリン系	フルダラビンリン酸エステル	注－1	注射薬		フルダラ静注用
核酸合成過程の代謝阻害(アデノシンデアミナーゼ阻害)		ペントスタチン	注－1	注射薬		コホリン静注用
		クラドリビン	注－1	注射薬		ロイスタチン注
核酸合成過程の代謝阻害(ジヒドロ葉酸還元阻害作用、TMP合成阻害作用、グリシンアミド・リボヌクレオチド・ホルミントランスフェラーゼ阻害)		ベメトレキセドナトリウム水和物	注－1	注射薬		アリムタ注射用
DNA-Ⅰ型トポイソメラーゼ阻害作用	カンプトテシン系	イリノテカン塩酸塩水和物	注－1	注射薬		カンプト点滴静注、トポテシン点滴静注
		ノギテカン塩酸塩	注－1	注射薬		ハイカムチン注射用
DNA-Ⅱ型トポイソメラーゼ阻害作用	エポドフィロトキシン系	エトポシド	注－1	注射薬		ベプシド注、ラステット注
DNAと結合	アントラサイクリン系	ダウノルビシン塩酸塩	注－1	注射薬		ダウノマイシン静注
		ドキシルビシン塩酸塩	注－1	注射薬		アドリアシン注用
		ドキシルビシン塩酸塩(リボソーム製剤)	注－1	注射薬		ドキシル注
		アクラルビシン塩酸塩	注－1	注射薬		アクラシン注用
		エビルビシン塩酸塩	注－1	注射薬		ファルモルビシン注射用
		イダルビシン塩酸塩	注－1	注射薬		イダマイシン静注用
		ピラルビシン塩酸塩	注－1	注射薬		テラルビシン注射用
		ピノルビシン塩酸塩	注－1	注射薬		ピノルビン注射用
		アムルビシン塩酸塩	注－1	注射薬		カルセド注射用
DNAグアニンと結合し複合体形成	アクチノマイシン系	アクチノマイシンD	注－1	注射薬		コスメゲン静注用
ホシンの多いDNA部分と結合		ゲムツズマブオソガマイシン(遺伝子組換え)	注－1	注射薬		マイロターグ点滴静注用
DNA傷害作用	プレオマイシン系	プレオマイシン塩酸塩	注－1	注射薬		プレオ注射用
		ベプロマイシン塩酸塩	注－1	注射薬		ベプレオ注射用
DNA/RNAと架橋形成作用	アントラサイクリン系	ミトキサントロン塩酸塩	注－1	注射薬		ノバントロン注
DNAアルキル化／架橋形成作用	マイトマイシン系	マイトマイシンC	注－1	注射薬		マイトマイシン注用
DNA内/DNA間架橋形成作用	白金錯化合物	シスプラチン	注－1	注射薬		プリプラチン注、ランダ注
		カルボプラチン	注－1	注射薬		パラプラチン注射液
		ネダプラチン	注－1	注射薬		アクブラ静注用
		オキサリプラチン	注－1	注射薬		エルプラット点滴静注液
		シスプラチン	注－1	注射薬	肝動注	動注用アイエーコー
		ミリプラチン水和物	注－1	注射剤	肝動注	ミリプラ動注用
ヌクレオチド除去修復機構阻害		トラベクテジン	注－1	注射薬		モンデリス点滴静注用
細胞分裂阻止作用	微小管機能阻害作用	ビンカルカロイド系	硫酸ビンブラステン	注－1	注射薬	エクザール注射用
			ピンクリスチン硫酸塩	注－1	注射薬	オンコピン注射用
			ビンデシン硫酸塩	注－1	注射薬	注射用フィルデシン
			ピノレルピン酒石酸塩	注－1	注射薬	ナベルピン注
			ドセタキセル水和物	注－1	注射薬	タキソテール点滴静注用
	タキソイド系		パクリタキセル	注－1	注射薬	タキソール注射液

							パクリタキセル	注－1	注射薬		アブラキサン点滴静注用	
							カバジタキセル アセトン付加物	注－1	注射薬		ジェブタナ点滴静注	
						チューブリン重合阻害を介した微小管機能阻害作用	エリブリンメシル酸塩	注－1	注射薬		ハラヴェン静注	
						微小管機能阻害作用 (CD30 に選択的に結合)	抗体薬物複合体	注－1	注射薬		アドセトリス点滴静注用	
					アポトーシス誘導作用	PML-RAR- α 蛋白質分解誘導作用		注－1	注射薬		トリセノックス注	
					抗体依存性細胞傷害作用	抗HER2t型モノクローナル抗体	トラスツズマブ (遺伝子組換え)	注－1	注射薬		ハーセプチン注射用	
							ベルツズマブ (遺伝子組換え)	注－1	注射薬		パージェタ点滴静注	
						マウス-ヒキメラ型モノクローナル抗体	リツキシマブ (遺伝子組換え)	注－1	注射薬		リツキサン注	
						ヒト型モノクローナル抗体	オファツムマブ (遺伝子組換え)	注－1	注射薬		アーゼラ点滴静注液	
							アレムツズマブ (遺伝子組換え)	注－1	注射薬		マブキャンパス点滴静注	
							モガムリズマブ (遺伝子組換え)	注－1	注射薬		ボテリジオ点滴静注	
							エロツズマブ (遺伝子組換え)	注－1	注射薬		エムプリシティ点滴静注用	
					ヒト上皮細胞増殖因子受容体 (EGFR) 阻害作用	マウス-ヒキメラ型モノクローナル抗体 (糖タンパク質)	セツキシマブ (遺伝子組換え)	注－1	注射薬		アービタックス注射液	
						ヒト型モノクローナル抗体 (糖タンパク質)	パニツムマブ (遺伝子組換え)	注－1	注射薬		ベクティビックス点滴静注	
					プロテアソーム阻害作用		ボルテゾミブ	注－1	注射薬		ベルケイド注射用	
							カルフィルゾミブ	注－1	注射薬		カイプロリス点滴静注用	
					mTOR阻害作用	腫瘍細胞増殖抑制作用、血管新生抑制作用	テムシロリムス	注－1	注射薬		トーリセル点滴静注	
					細胞分裂阻止作用及び抗体依存性細胞傷害作用	抗体薬物複合体	トラスツズマブ エムタンシン (遺伝子組換え)	注－1	注射薬		カドサイラ点滴静注用	
					PD-1/PD-1リガンド結合阻害作用	がん抗原特異的なT細胞の活性化及びがん細胞に対する細胞傷害活性の増強	ヒト型モノクローナル抗体	注－1	注射薬		オプジーボ点滴静注	
							ペムブロリズマブ (遺伝子組換え)	注－1	注射薬		キイトルーダ点滴静注	
					CTLA-4結合阻害作用		イビリムマブ (遺伝子組換え)	注－1	注射薬		ヤーボイ点滴静注液	
	腫瘍用薬 放射性医薬品	悪性腫瘍	抗腫瘍作用	^{90}Y により標識された抗CD20抗体がCD20陽性のB細胞性腫瘍に集積し、 β 線を放出		マウスモノクローナル抗体	イブリツモマブ チウキセタン (遺伝子組換え)、塩化イットリウム (^{90}Y)	注－1	注射薬		ゼウアリン イットリウム (^{90}Y) 静注用	
				^{223}Ra が骨転移巣に集積し、 α 線を放出			塩化ラジウム (^{223}Ra)	注－1	注射薬		ゾーフィゴ静注	
			その他	免疫強化作用	抗腫瘍免疫能賦活作用	菌体成分	溶連菌抽出物	注－1	注射薬		ピシバニール注射用	
					細胞増殖抑制作用／ヒトNK活性増強作用	天然型インターフェロンアルファ	レンチナン	注－1	注射薬		レンチナン静注用	
							インターフェロンアルファ (NAMALWA)	注－1	注射薬		スミフェロン注	
							インターフェロンアルファ-2b (遺伝子組換え)	注－1	注射薬		イントロンA注射用	
						天然型インターフェロンベータ	インターフェロンベータ	注－1	注射薬		フェロン注射用	
						遺伝子組換え型インターフェロンガンマ	インターフェロンガンマ-1a (遺伝子組換え)	注－1	注射薬		イムノマックス- γ 注	
					細胞障害性キラー細胞誘導作用／免疫賦活作用	遺伝子組換え型インターロイキン-2	テセロイキン (遺伝子組換え)	注－1	注射薬		イムネース注	
							セルモロイキン (遺伝子組換え)	注－1	注射薬		セロイク注射用	

				細胞栄養遮断作用	アスパラギン脱アミノ化作用	酵素系	Ｌ－アスパラギナーゼ	注－１	注射薬		ロイナーゼ注用	
				細胞内呼吸障害作用	レーザー照射による活性酸素生成作用	光感受性物質	ボルフィマーナトリウム	注－１	注射薬		フォトフリン静注用	
							タラボルフィンナトリウム	注－１	注射薬		注射用レザフィリン	
				血管新生阻害作用	血管内皮増殖因子(VEGF)阻害作用	ヒト型モノクローナル抗体	ベパシズマブ(遺伝子組換え)	注－１	注射薬		アバステン点滴静注用	
					血管内皮増殖因子受容体2(VEGFR-2)阻害作用		ラムシルマブ(遺伝子組換え)	注－１	注射薬		サイラムザ点滴静注液	
				抗悪性腫瘍薬作用増強作用	チミジル酸合成酵素の解離遅延作用	葉酸系	レボホリナートカルシウム	注－１	注射薬		アイソポリン点滴静注用	
				ホルモン様作用	抗アンドロゲン作用	LH-RH誘導体(GnRHアゴニスト)	ゴセレリン酢酸塩	注－２	キット		ゾラデックス	
							リュープロレリン酢酸塩	注－１ 注－２	注射薬 キット		リュープリン注射用	
						LH-RH誘導体(GnRHアンタゴニスト)	デガレリクス酢酸塩	注－１	注射薬		ゴナックス皮下注用	
					抗エストロゲン作用		フルベストラント	注－２	キット		フェソロデックス筋注	
				抗がん剤の作用持続作用			ヨード化ケシ油脂脂肪酸エチルエステル	注－１	注射薬		ミリブラ用懸濁用液	
				胸膜の炎症惹起作用・胸膜癒着作用			減菌調整タルク	注－１	注射薬		ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤	
3	腫瘍用薬	悪性腫瘍	抗腫瘍作用	核酸合成阻害作用	核酸合成過程の代謝阻害(TMP合成阻害作用)	ピリミジン(フッ化ピリミジン)系	フルオロウラシル	外－１	軟膏剤		5-FU軟膏	
							テガフル	外－６	坐剤		フトラフル坐剤	
					DNA傷害作用	ブレオマイシン系	ブレオマイシン	外－１	軟膏剤		ブレオS軟膏	
					DNAアルキル化作用	ニトロソウレア系	カルムスチン	外－５	貼付剤		ギリアデル脳内留置用剤	
			その他	細胞障害作用			乾燥BCG膀胱内用(日本乾燥BCG膀胱内用(コンノート株))	外－１ 外－１	液剤 液剤		イムノブラダー膀胱注 イムシスト膀胱注用	

430 放射性医薬品

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤型区分	剤型	用法	主な製品名	線引き
1	放射性医薬品	甲状腺の診断、検査	甲状腺ホルモン合成作用	甲状腺への取り込み作用		¹²³ I	ヨウ化ナトリウム(¹²³ I)	内-1	カプセル剤		ヨードカプセル-123	
						¹³¹ I	ヨウ化ナトリウム(¹³¹ I)	内-1	カプセル剤		ラジオカプ	
		甲状腺機能亢進症の治療、甲状腺癌の治療	甲状腺ホルモン合成作用	甲状腺への取り込み作用		¹³¹ I	ヨウ化ナトリウム(¹³¹ I)	内-1	カプセル剤		・ヨウ化ナトリウムカプセル	
2	放射性医薬品	甲状腺疾患の診断				^{99m} Tc	過テクネチウム酸ナトリウム(^{99m} Tc)注射液ジェネレータ	注-1	注射薬(ジェネレータ)		・ウルトラテクネカウ ・メジテック ・エルマティックⅢ	
						^{99m} Tc	過テクネチウム酸ナトリウム(^{99m} Tc)注射液	注-1	注射薬	静注	・テクネシンチ注-10M ・テクネシンチ注-20M ・テクネゾール	
		局所脳血流診断				¹²³ I	N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミン(¹²³ I)塩酸塩	注-1	注射液	静注	パービューザミン注	
						^{99m} Tc	エチレンジスチネートオキソテクネチウム(^{99m} Tc)シエチルエステル注射液	注-2	キット	静注	ニューロライト注射液 第一	
						^{99m} Tc	エチレンジスチネートオキソテクネチウム(^{99m} Tc)シエチルエステル注射液(調製用)	注-1	注射薬	静注	ニューロライト 第一	
						^{99m} Tc	エキサメタジウムテクネチウム(^{99m} Tc)注射液(調製用)	注-1	注射薬	静注	セレブロテックキット	
		外科的治療が考慮される部分でんがん患者におけるでんがん焦点の診断	中枢性ベンゾジアゼピン受容体結合作用(選択性)			¹²³ I	イオマゼニル(¹²³ I)注射液	注-2	キット	静注	ベンゾダイン注	
		パーキンソン症候群、レビー小体型認知症診断におけるドパミントランスポーターシンチグラフィ	ドパミントランスポータ結合作用(選択性)			¹²³ I	イオフルバン(¹²³ I)	注-2	キット	静注	ダットスキャン静注	
		脳脊髄液腔病変診断				¹¹¹ In	ジエチレントリアミン五酢酸インジウム(¹¹¹ In)	注-1	注射薬	脳脊髄液腔内投与	インジウムDTPA(¹¹¹ In)注	
		腎疾患診断	腎静態シンチグラフィ			^{99m} Tc	ジメルカプトコハク酸テクネチウム(^{99m} Tc)注射液	注-1	注射薬	静注	キドニーシンチTc-99m注	
						^{99m} Tc	ジメルカプトコハク酸テクネチウム(^{99m} Tc)注射液(調製用)	注-1	注射薬	静注	・キドニーシンチキット ・テクネDMSAキット	
			腎動態シンチグラフィ			^{99m} Tc	ジエチレントリアミン五酢酸テクネチウム(^{99m} Tc)注射液(調製用)	注-1	注射薬	静注	テクネDTPAキット	
		腎・尿路疾患診断				^{99m} Tc	メルカプトアセチルグリシルグリシルリンテクネチウム(^{99m} Tc)注射液	注-2	キット	静注	テクネMAG ₃ 注射液	
						^{99m} Tc	メルカプトアセチルグリシルグリシルリンテクネチウム(^{99m} Tc)注射液(調製用)	注-1	注射薬	静注	テクネMAG ₃ キット	
		副腎疾患部位診断				¹³¹ I	ヨウ化メチルノルコステロール(¹³¹ I)注射液	注-1	注射薬	静注	アドステロール-I131注射液	
		心臓疾患診断(心筋病変の診断)	交感神経シンチグラフィ			¹²³ I	メタヨードベンジルグアニジン(¹²³ I)	注-1	注射薬	静注	ミオMIBG-I123注射液	
			脂肪酸代謝シンチグラフィ			¹²³ I	ヨードフェニルメチルヘンタデカン酸	注-2	キット	静注	カルディオダイン注	
			心筋血流イメージング			²⁰¹ Tl	塩化タリウム(²⁰¹ Tl)	注-1	注射薬	静注	・塩化タリウム(²⁰¹ Tl)注NMP ・塩化タリウム-Tl201注射液	
						^{99m} Tc	テトロホスミンテクネチウム(^{99m} Tc)注射液	注-2	キット	静注	マイオビュー注シリンジ	

			^{99m}Tc	ヘキサキスチキソフチルイソトリ ルテクネチウム(^{99m}Tc)注射液	注-2	キット	静注	カーディオライト注射液 第一	
			^{99m}Tc	テトロホスミンテクネチウム(^{99m}Tc)注 射液 (調製用)	注-1	注射薬	静注	マイオビュー「注射用」	
			^{99m}Tc	ヘキサキスチキソフチルイソトリ ルテクネチウム(^{99m}Tc)注射液(調 製用)	注-1	注射薬	静注	カーディオライト 第一	
心臓疾患診断 (血管病変の診断)			^{99m}Tc	人血清アルブミンジエチレントリアミ ン五酢酸テクネチウム(^{99m}Tc)注射 液	注-1	注射薬	静注	プールシンチ注	
			^{99m}Tc	テクネチウム人血清アルブミン注射 液(調製用)	注-1	注射薬	静注	テクネアルブミンキット	
			^{99m}Tc	ピロリン酸テクネチウム(^{99m}Tc)注 射液 (調製用)	注-1	注射薬	静注	テクネピロリン酸キット	
肺血流診断			^{99m}Tc	テクネチウム大凝集人血清アルブ ミン(^{99m}Tc)注射液	注-1	注射薬	静注	ラングシンチ Tc - 99m 注	
			^{99m}Tc	テクネチウム大凝集人血清アルブ ミン(^{99m}Tc)注射液(調製用)	注-1	注射薬	静注	テクネMAAキット	
肺・脳血流診断			^{81m}Kr	クリプトン(^{81m}Kr)	注-1	注射薬		クリプトン(^{81m}Kr)ジェネレータ	
骨疾患診断			^{99m}Tc	ヒドロキシメチレンジホスホン酸テク ネチウム(^{99m}Tc)注射液	注-1	注射薬	静注	クリアボーン注	
					注-2	キット			
			^{99m}Tc	メチレンジホスホン酸テクネチウム (^{99m}Tc)注射液	注-2	キット	静注	テクネMDP注射液	
			^{99m}Tc	ヒドロキシメチレンジホスホン酸テク ネチウム(^{99m}Tc)注射液(調製用)	注-1	注射薬	静注	クリアボーンキット	
			^{99m}Tc	メチレンジホスホン酸テクネチウム (^{99m}Tc)注射液 (調製用)	注-1	注射薬	静注	テクネMDPキット	
肝機能診断			^{99m}Tc	ガラクトシル人血清アルブミンジエ レントリアミン五酢酸テクネチウム (^{99m}Tc)注射液	注-1	注射薬	静注	アシアロシンチ注	
肝胆道系機能診断			^{99m}Tc	N-ヒドリキシル-5-メチルトリプトフ アンテクネチウム(^{99m}Tc)注射液	注-1	注射薬	静注	ヘパティメージ注	
肝脾疾患診断			^{99m}Tc	テクネチウムスズコロイド(^{99m}Tc)注 射液	注-1	注射薬	静注	スズコロイド Tc - 99m 注	
			^{99m}Tc	テクネチウムスズコロイド(^{99m}Tc)注 射液	注-1	注射薬	静注	スズコロイド Tc - 99m 注 セット	
			^{99m}Tc	テクネチウムスズコロイド(^{99m}Tc)注 射液 (調製用)	注-1	注射薬	静注	スズコロイド Tc - 99m 注 調製用キット	
			^{99m}Tc	フィチン酸テクネチウム(^{99m}Tc)注射 液	注-1	注射薬	静注	テクネフチン酸キット	
悪性腫瘍診断 (全腫瘍が適応)			^{67}Ga	クエン酸ガリウム(^{67}Ga)	注-1	注射薬	静注	・クエン酸ガリウム(^{67}Ga)注 NMP ・クエン酸ガリウム-Ga 67 注 射液	
					注-2	キット			
固形癌患者における骨シンチグラ フィで陽性像を呈する骨転移部位 の疼痛緩和	電離放射線による骨疼痛緩和		^{89}Sr	塩化ストロンチウム(^{89}Sr)注射液	注-1	注射薬		メタストロン注	

		イブリツモマブ チウキセタン(遺伝子組換え)の集積部位の確認	γ線放出格種である ¹¹¹ Inで標識した抗CD20抗体(イブリツモマブチウキセタン(遺伝子組換え))を用いたシンチグラフィ		¹¹¹ In	イブリツモマブ チウキセタン(遺伝子組換え)、塩化インジウム(¹¹¹ In)	注-1	注射薬	静注	ゼヴァリン インジウム(¹¹¹ In)静注用セット	
		造血骨髄の診断			¹¹¹ In	塩化インジウム(¹¹¹ In)	注-1	注射薬	静注	塩化インジウム(¹¹¹ In)注	
		循環血液、血漿量測定 (画像を伴わない検査)			⁵¹ Cr	クロム酸ナトリウム(⁵¹ Cr)注射液	注-1	注射薬	静注	放射性クロム酸ナトリウム注射液	
					¹³¹ I	ヨウ化人血清アルブミン(¹³¹ I)	注-1	注射薬	静注	放射性ヨウ化人血清アルブミン注射液	
		神経内分泌腫瘍の診断	ソマトスタチン受容体結合作用		¹¹¹ In	ペンテトレオチド、塩化インジウム(¹¹¹ In)	注-1	注射薬	静注	オクトレオスキャン静注用セット	

441-449 アレルギー用薬

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分名	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	アレルギー用 薬	アレルギー性鼻炎、アレルギー性 皮膚疾患	ケミカルメディエータ受容体 拮抗作用	抗ヒスタミン作用			ジフェンヒドラミン塩酸塩	内-1	錠剤		ベナ錠 レスタミンコーワ錠	
							クレマスチンフマル酸塩	内-2 内-1 内-4 内-4	散剤 錠剤 シロップ剤 ドライシロップ 剤		タベジール散 タベジール錠 タベジールシロップ	
							ホモクロルシクリジン塩酸塩	内-1	錠剤		ホモクロミン錠	
							ヒドロキシジン塩酸塩	内-1	錠剤		アタラックス錠	
							ヒドロキシジnPアモ酸塩	内-1 内-2 内-3	錠剤 散剤 シロップ剤		アタラックス-P散	
							シプロヘブタジン塩酸塩	内-2 内-1 内-4	散剤 錠剤 シロップ剤		ペリアクチン散 ペリアクチン錠 ペリアクチンシロップ	
							プロメタジン塩酸塩	内-1	錠剤		ヒベルナ糖衣錠 ピレチア錠	
							アリメマジン酒石酸塩	内-4	シロップ剤		アリメジンシロップ	
							d-クロルフェニラミンマレイン酸 塩	内-2 内-1 内-4 内-3	散剤 錠剤 シロップ剤 ドライシロップ 剤		ボララミン散 ボララミン錠 ボララミンシロップ ボララミンドライシ ロップ	
							クロルフェニラミンマレイン酸塩	内-2 内-2 内-1	末剤 散剤 錠剤		プロダミン アレルギーン散 ヒスタール錠	
							オキサトミド	内-1 内-4	錠剤 ドライシロップ 剤		セルテクト錠 セルテクトドライシ ロップ	
							ベボタスチンベシル酸塩	内-1	錠剤		タリオン錠	
							オロパタジン塩酸塩	内-1 内-2	錠剤 顆粒剤		アレロック錠 アレロック顆粒	
							メキタジン	内-2 内-1 内-4 内-3	細粒剤 錠剤 シロップ剤 ドライシロップ 剤		ゼスラン小児用細粒 ゼスラン錠 ゼスラン小児用シ ロップ	
							フマル酸エメダスチン	内-1	カプセル剤		ダレンカプセル	
							フェキソフェナジン塩酸塩	内-1 内-3, 4	錠剤 ドライシロッ プ剤		アレグラ錠 アレグラドライシロッ プ	
							アゼラスチン塩酸塩	内-2 内-1	顆粒剤 錠剤		アゼブチン顆粒 アゼブチン錠	
							エピナスチン塩酸塩	内-1 内-4	錠剤 ドライシロップ 剤		アレジオン錠 アレジオンドライシ ロップ	
							セチリジン塩酸塩	内-1 内-4	錠剤 ドライシロップ 剤		ジルテック錠 ジルテックドライシ ロップ	

						レボセチリジン塩酸塩	内ー1 内ー3, 4	錠剤 シロップ剤		ザイザル錠 ザイザルシロップ	
						ケトチフェン fumarate 塩酸塩	内ー1 内ー1 内ー3 内ー4	錠剤 カプセル剤 シロップ剤 ドライシロップ		ザジデンカプセル ザジデンシロップ ザジデンドライシロップ	
						エバステチン	内ー1	錠剤		エバステル錠	
						ロラタジン	内ー1 内ー3, 4	錠剤 ドライシロップ 剤		クラリチン錠 クラリチンドライシロップ	
						デスロラタジン	内ー1	錠剤		デザレックス錠	
						ピラスチン	内ー1	錠剤		ピラノア錠	
						配合剤				ディレグラ配合錠	
			配合剤(ケミカルメディエータ受容体拮抗作用)	抗ヒスタミン作用/α交感神経刺激作用		フェキソフェナジン塩酸塩/塩酸プソイドエフェドリン	内ー1	錠剤		ディレグラ配合錠	
		アレルギー性鼻炎, アレルギー性皮膚疾患/気管支喘息	ケミカルメディエータ遊離抑制作用	ヒスタミン遊離抑制作用/ロイコトリエン遊離抑制作用		トラニラスト	内ー2 内ー1 内ー4	細粒剤 カプセル剤 ドライシロップ		リザベン細粒 リザベンカプセル リザベンドライシロップ	
						ベミロラストカリウム	内ー1 内ー4	錠剤 ドライシロップ 剤		アレギサル錠 アレギサルドライシロップ	
						アンレキサノクス	内ー1	錠剤		ソルファ錠	
				ロイコトリエン遊離抑制作用		イブジラスト	内ー1	カプセル剤		ケタスカプセル	
		食物アレルギーに基づくアトピー性皮膚炎	ケミカルメディエータ遊離抑制作用	腸管内ヒスタミン遊離抑制作用/腸管内ロイコトリエン遊離抑制作用		クロモグリク酸ナトリウム	内ー2	細粒剤		インタール細粒	
		アレルギー性鼻炎, アレルギー性皮膚疾患, 気管支喘息	ケミカルメディエータ遊離抑制作用	インターロイキン産生抑制作用		スプラタストトシル酸塩	内ー1 内ー4	カプセル剤 ドライシロップ 剤		アイビーディカプセル アイビーディドライシロップ	
		アレルギー性鼻炎/気管支喘息	ケミカルメディエータ拮抗作用	ロイコトリエン受容体拮抗作用		ブランドカスト水和物	内ー1 内ー1 内ー4	カプセル剤 錠剤 ドライシロップ		オノンカプセル ブランドカスト錠 オノンドライシロップ	
						モンテルカストナトリウム	内ー1 内ー5 内ー2	錠剤 チュアブル 細粒剤		シングレア錠 シングレアチュアブル錠 シングレア細粒	
				トロンボキサンA2受容体拮抗作用		ラマトロバン	内ー1	錠剤		バイナス錠	
						セラトロダスト	内ー2 内ー1	顆粒剤 錠剤		プロニカ顆粒 プロニカ錠	
		気管支喘息	ケミカルメディエータ合成阻害作用	トロンボキサンA2合成酵素阻害作用		オザゲレル塩酸塩水和物	内ー1	錠剤		ベガ錠 ドメナン錠	
		アレルギー性皮膚疾患	ケミカルメディエータ遊離抑制作用	抗プラスミン作用		トラネキサム酸	内ー2 内ー2 内ー1 内ー1 内ー3, 4	細粒剤 散剤 錠剤 カプセル剤 シロップ剤		プレタスミン細粒 トランサミン散 トランサミン錠 トランサミンカプセル トランサミンシロップ	
		スギ花粉症(減感作療法)	特異的減感作作用			標準化スギ花粉エキス	内ー5	舌下液		シダトレンスギ花粉舌下液	
		ダニ抗原によるアレルギー性鼻炎(減感作療法)				コナヒョウヒダニエキス原末及びヤケヒョウヒダニエキス原末	内ー5	舌下錠		アシテアダニ舌下錠	
						コナヒョウヒダニ抽出エキス及びヤケヒョウヒダニ抽出エキス	内ー5	舌下錠		ミティキュアダニ舌下錠	
2	アレルギー用薬	アレルギー性鼻炎/アレルギー性皮膚炎/慢性蕁麻疹	ケミカルメディエータ拮抗作用			ジフェニルピラリン塩酸塩	注ー1	注射薬		ハイスタミン注	
						ジフェニヒドラミン塩酸塩	注ー1	注射薬		レスミン注射液	

						プロメタジン塩酸塩	注－1	注射薬		ヒベルナ注	
						クロルフェニラミンマレイン酸塩	注－1	注射薬		ボラミン注	
					配合剤	ジフェンヒドラミン塩酸塩/臭化カルシウム	注－1	注射薬		レスカルミン注	
		アレルギー性皮膚炎／薬疹	ケミカルメディエータ遊離抑制作用	ホスホリパーゼA2阻害作用		グリチルリチン、グリシン、システイン配合剤	注－1	注射薬		強カネオミノファーゲンシー静注	
		蕁麻疹、薬疹	抗プラスミン作用			トラネキサム酸	注－1	注射薬		トランサミン注	
		アレルギー性鼻炎、アレルギー性皮膚炎	ケミカルメディエータ受容体調節作用	好酸球浸潤抑制作用		ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液	注－1	注射薬		ノイロトロピン注射液	
		気管支喘息	抗IgE作用			オマリズマブ(遺伝子組換え)	注－1	注射薬		ソレア皮下注用	
			抗IL-5作用			メボリズマブ(遺伝子組換え)	注－1	注射薬		ヌーカラ皮下注用	
		スギ花粉症(減感作療法)	特異的減感作作用			標準化スギ花粉エキス	注－1	注射薬		治療用標準化アレルギーンエキス皮下注「トリイ」	
		気管支喘息(減感作療法)(ブタクサ花粉)アレルギー性鼻炎				アレルギーン治療エキス	注－1	注射薬		治療用アレルギーンエキス皮下注「トリイ」	
		ダニ抗原によるアレルギー性鼻炎、気管支喘息(減感作療法)				コナヒョウヒダニエキス及びヤケヒョウヒダニエキス	注－1	注射薬		治療用ダニアレルギーンエキス皮下注「トリイ」	

611-615・619・621-624・629 主として一般細菌に作用するもの

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
I	主として一般細菌に作用するもの	主としてグラム陽性菌 (G(+)) に作用	細胞壁合成阻害作用			ペニシリン系	ベンジルペンシリンナトリウム	内-2	顆粒剤		バイシリンG	
						ゲルゴベフタイト系	バンコマイシン塩酸塩	内-2	散剤		塩酸バンコマイシン	
			蛋白合成阻害作用			リソマイシン系	クリンダマイシン塩酸塩	内-1	カプセル剤		ダラシン	
						リソマイシン塩酸塩		内-1	カプセル剤		リンコシン	
		VREに作用 主としてグラム陰性菌 (G(-)) に作用	蛋白合成阻害作用			オキサリジン系	リネゾリド	内-1	錠剤		ザイボックス	
						ホリヘフタイト系	コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム	内-2	散剤		コリマイシンS	
								内-2	顆粒剤		メタコリマイシン	
							ホリミキシンB硫酸塩	内-1	錠剤		硫酸ポリミキシン	
			蛋白合成阻害作用			アミノグリコチド系	カナマイシン-硫酸塩	内-1	カプセル剤		カナマイシン	
								内-4	シロップ剤			
								内-4	ドライシロップ剤			
			核酸 (DNA) 合成阻害作用			キノロン系	ナリジクス酸	内-1	錠剤		ウイントマイロン	
								内-4	シロップ剤			
							ヒドミト酸三水合物	内-1	錠剤		ドルコール	
		主としてグラム陽性菌 (G(+)) / グラム陰性菌 (G(-)) に作用	細胞壁合成阻害作用			ペニシリン系 (1)	アンピシリン	内-1	カプセル剤		ピクシリン	
								内-4	ドライシロップ剤			
							アモキシシリン水和物	内-1	錠剤		アモリン	
								内-1	カプセル剤			
								内-2	細粒剤			
						ペニシリン系 (2)	ベンカンビシリン塩酸塩	内-1	錠剤		ベングローブ	
						セフェム系 (1)	スルタミシリン硫酸塩	内-1	錠剤		ユナシン	
							スルタミシリン硫酸塩 (小)	内-2	細粒剤			
						セフェム系 (1)	セファレキシン	内-1	錠剤		ケフレックス	
								内-2	顆粒剤			
								内-1	カプセル剤			
								内-3	シロップ剤			
								内-4	ドライシロップ剤			
							セファレキシン (小)	内-4	ドライシロップ剤			
						セフェム系 (1)	セファクロル	内-1	カプセル剤		ケフラルール	
								内-2	顆粒剤			
							セファクロル (小)	内-2	細粒剤			
						セフェム系 (1)	セフトロキサム (小)	内-4	ドライシロップ剤		オラスポア	
						セフェム系 (2)	セフトキシムアセチル	内-1	錠剤		オラセフ	
							セフトキシムアセチル塩酸塩	内-1	錠剤		パンスポリン	
						セフェム系 (3)	セフトキシムプロキシム	内-1	錠剤		パナン	
							セフトキシムプロキシム (小)	内-4	ドライシロップ剤			
							セフトキシム	内-1	カプセル剤		セフスパン	
							セフトキシム (小)	内-2	細粒剤			
							セフトキシムプロキシム	内-1	錠剤		トミロン	
							セフトキシムプロキシム (小)	内-2	細粒剤			
						セフェム系 (3)	セフトキシム	内-1	カプセル剤		セフゾン	

					セフシニル(小)	内ー2	細粒剤		
					セフゾテン	内ー1	カプセル剤		セフテム
					セフトレニホキシル	内ー1	錠剤		メイアクト
					セフトレニホキシル(小)	内ー2	細粒剤		
					セフカヘンビホキシル塩酸塩	内ー1	錠剤		フロモックス
					セフカヘンビホキシル塩酸塩(小)	内ー2	細粒剤		
				ペニシム系	ファロヘンムナトリウム	内ー1	錠剤		ファロム
					ファロヘンムナトリウム(小)	内ー4	ドライシロップ剤		
				カルハペニシム系	デビヘンムビホキシル	内ー2	細粒剤		オラベナム
				ホスホマイシン系	ホスホマイシンカルシウム	内ー1	錠剤		ホスミシン
						内ー1	カプセル剤		
					ホスホマイシンカルシウム(小)	内ー4	ドライシロップ剤		
	配合剤(細胞壁合成阻害作用)			配合剤	アモキシシリン/クラファン酸カリウム	内ー1	錠剤		オーグメンチン
					アモキシシリン/クラファン酸カリウム(小)	内ー4	ドライシロップ剤		クラバモックス
					アンピシリン/クロキサシリンナトリウム	内ー1	錠剤		ピクシリン
	葉酸合成阻害作用			サルファ剤	スルファメトキサゾール	内ー2	末剤		シノミン
					スルファメチゾール	内ー2	末剤		
	配合剤(葉酸合成阻害作用+葉酸活性阻害作用)			配合剤	スルファメトキサゾール/トリメトプリム	内ー1	錠剤		バクタ
						内ー2	顆粒剤		
主としてグラム陽性菌(G+)/マコプラズマに作用	蛋白合成阻害作用			マクロライド系(1)	エリスロマイシン	内ー1	錠剤		アイロタイシン
					エリスロマイシンエチルコハク酸エステル	内ー2	顆粒剤		エリスロシン
						内ー4	ドライシロップ剤		
					エリスロマイシンステアリン酸塩	内ー1	錠剤		エリスロシン
				マクロライド系(2)	クラリスロマイシン	内ー1	錠剤		クラリシッド
					クラリスロマイシン(小)	内ー1	錠剤		
						内ー4	ドライシロップ剤		
					ロキシロマイシン	内ー1	錠剤		ルリッド
				マクロライド系(3)	アジスロマイシン水和物	内ー1	錠剤		ジスロマック
						内ー3	ドライシロップ剤		
					アジスロマイシン水和物(小)	内ー1	カプセル剤		
						内ー2	細粒剤		
				マクロライド系(4)	ジョサマイシン	内ー1	錠剤		ジョサマイシン
					ジョサマイシンプロピオン酸エステル(小)	内ー4	シロップ剤		ジョサマイ
						内ー4	ドライシロップ剤		
主としてグラム陽性菌(G+)/グラム陰性菌(G-)/リネチア/クラミジアに作用	蛋白合成阻害作用			クロラムフェニコール系	クロラムフェニコール	内ー1	錠剤		クロロマイセチン
				テトラサイクリン系(1)	テトラサイクリン塩酸塩	内ー1	カプセル剤		アクロマイシン
					デメチルクロルテトラサイクリン塩酸塩	内ー1	カプセル剤		レダマイシン
				テトラサイクリン系(2)	ミノサイクリン塩酸塩	内ー1	錠剤		ミノマイシン
						内ー1	カプセル剤		
					ミノサイクリン塩酸塩(小)	内ー2	顆粒剤		
					ドキシサイクリン塩酸塩	内ー1	錠剤		ビブラマイシン
	核酸(DNA)合成阻害作用			キノロン系	ノルフロキサシン	内ー1	錠剤		バクシダール
					ノルフロキサシン(小)	内ー1	錠剤		
					ロメフロキサシン塩酸塩	内ー1	錠剤		ロメバクト
						内ー1	カプセル剤		
					オフロキサシン	内ー1	錠剤		タリビット

							シブ [®] フロキサシン塩酸塩	内－１	錠剤		シプロキササン	
							フルフロキサシン	内－１	錠剤		スオード	
							レボ [®] フロキサシン水和物	内－１	錠剤		クラビット	
								内－２	細粒剤			
							トスフロキサシトシル酸塩水和物	内－１	錠剤		オゼックス	
								内－２	細粒剤			
							モキシフロキサシン塩酸塩	内－１	錠剤		アベロックス	
							ガレノキサシナシル酸塩水和物	内－１	錠剤		ジェニナック	
							シタフロキサシン水和物	内－１	錠剤		グレースビット	
								内－２	細粒剤			
2	主として一般細菌に作用するもの	主としてグラム陽性菌 (G(+)) に作用	細胞壁合成阻害作用				ペニシリン系	ベンジ [®] ルペニシリンカリウム	注－１	注射薬	ペニシリン G カリウム	
			蛋白合成阻害作用				リンコマイシン系	リンコマイシン塩酸塩	注－１	注射薬	リンコシン	
								グリナ [®] マイシンリン酸エステル	注－１	注射薬	ダラシン	
								注－２	キット			
		M R S A に作用	細胞壁合成阻害作用				ゲルコペ [®] フライト [®] 系	テコゾ [®] ラン	注－１	注射薬	タゴシッド	
			蛋白合成阻害作用					バンコマイシン塩酸塩	注－１	注射薬	塩酸バンコマイシ	
			細胞膜脱分極作用				アミノ [®] グリコシド [®] 系	フルベ [®] カシン硫酸塩	注－１	注射薬	ハベカシン	
							環状リポペプチド系	ダブトマイシン	注－１	注射薬	キュピシン静注用	
		V R E に作用	蛋白合成阻害作用				オキサザ [®] リゾ [®] ン系	リネゾ [®] リト [®]	注－１	注射薬	ザイボックス	
			配合剤（蛋白合成阻害作用）				配合剤	キヌ [®] リスチン/タ [®] ルホ [®] リスチン	注－１	注射薬	注射用シナシッド	
		主としてグラム陰性菌 (G(-)) に作用	細胞壁合成阻害作用				モノバ [®] クタム系	アズ [®] トレオナム	注－１	注射薬	アザクタム	
			細胞膜機能障害作用				ポリペプチド系	コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム	注－１	注射薬	オールドレブ点滴静注用	
			蛋白合成阻害作用				アミノ [®] グリコシド [®] 系	トゾ [®] ラマイシン	注－１	注射薬	トブラシン	
								アミカシン硫酸塩	注－１	注射薬	硫酸アミカシン	
								イセハ [®] マイシン硫酸塩	注－１	注射薬	エクサシン	
							(アミノサイクリトール系)	スベ [®] クチノマイシン塩酸塩	注－１	注射薬	トロビシン	
							ゲ [®] リシルサイクリン系	チゲ [®] サイクリン	注－１	注射薬	タイガシル点滴静注用	
			蛋白変性作用				ヘキサミン系	ヘキサミン	注－１	注射薬	ヘキサミン	
		主としてグラム陽性菌 (G(+)) / グラム陰性菌 (G(-)) に作用	細胞壁合成阻害作用				ペニシリン系 (１)	アンピ [®] シリンナトリウム	注－１	注射薬	ピクシリン	
			配合剤（細胞壁合成阻害作用）				配合剤	アンピ [®] シリン/クロキサリン	注－１	注射薬	ピクシリン S	
								ビ [®] ベ [®] ラシリンナトリウム	注－１	注射薬	ベントシリン	
								注－２	キット			
							セフェム系 (１)	セファゾ [®] リンナトリウム	注－１	注射薬	セファメジン α	
								注－２	キット			
								セファロチンナトリウム	注－１	注射薬	ケフリン	
							セフェム系 (２)	セフト [®] アム塩酸塩	注－１	注射薬	パンスポリン	
								注－２	キット			
							セフェム系 (３)	セフト [®] キシム塩酸塩	注－１	注射薬	ベストコール	
								セフト [®] キシムナトリウム	注－１	注射薬	クラフォラン	
								セフト [®] リアキソナトリウム	注－１	注射薬	ロセフィン静注用	
								注－２	キット		ロセフィン点滴静注用バッグ	

3	主として一般細菌に作用するもの	主としてグラム陽性菌(G(+))/グラム陰性菌(G(-))に作用	細胞壁合成阻害作用			セフェム系(4)	セフェピム塩酸塩	注-1	注射薬		注射用マキシペー ム			
							セフトゾラン塩酸塩	注-1 注-2	注射薬 キット		ファーストシン			
							セフトヘラゾナトリウム	注-1	注射薬		セフトペラジン			
							セフトジシム	注-1	注射薬		モダシン			
							セフトロム硫酸塩	注-1	注射薬		ケイテン			
								セフトミノキサナトリウム	注-1	注射薬		メイセリン		
								セフトメゾールナトリウム	注-1 注-2	注射薬 キット		セフトメタゾン		
							セフェム系(6)	フロモセフトナトリウム	注-1 注-2	注射薬 キット		フルマリリン		
								ラタモセフトナトリウム	注-1	注射薬				
							ホスホマイシン系	ホスホマイシンナトリウム	注-1 注-2	注射薬 キット		ホスミシン		
								カルバペム系	メロペム三水和物	注-1 注-2	注射薬 キット		メロペン	
							ピペラペム		注-1	注射薬		オメガシン点滴用 0.3g オメガシン点滴用 0.3gパック		
									注-2	キット				
							トリペム水和物		注-1 注-2	注射薬 キット		フィニバックス点滴用0.25% フィニバックス キット点滴用0.25%		
							配合剤(細胞壁合成阻害作用+不活性化阻害作用)		配合剤	イミペム/シラスチン	注-1 注-2	注射薬 キット	チエナム	
						パニペム/ヘタミフロ				注-1	注射薬	カルベニン		
						配合剤(細胞壁合成阻害作用+βラクタマーゼ阻害作用)		配合剤	スルバクタム/アンピシリン	注-1 注-2	注射薬 キット	ユナシン-S ユナシン-S キット静注用		
									スルバクタム/セフトヘラゾン	注-1 注-2	注射薬 キット	スルベラゾン		
									タゾバクタムナトリウム/ピペラリンナトリウム	注-1 注-2	注射薬 キット	ゾシン		
						核酸(DNA)合成阻害作用		キノロン系	シプロフロキサシン	注-1	注射薬	シプロキサ		
									パシフロキサシメシル酸塩	注-2	キット	パシルノバズクロ		
						蛋白合成阻害作用			レボフロキサシン水和物	注-1 注-2	注射薬 キット	クラビット		
									ゲンタマイシン硫酸塩	注-1	注射薬	ゲンタシン		
						主としてグラム陽性菌(G(+))/マイコプラズマに作用	蛋白合成阻害作用		アミノグリコシド系	ジベカシン硫酸塩	注-1	注射薬	パニマイシン	
										エリスロマイシンラクトビオン酸塩	注-1	注射薬	エリスロシン	
						主としてグラム陽性菌(G(+))/グラム陰性菌(G(-))/リネン/クラミジアに作用	蛋白合成阻害作用			アジスロマイシン水和物	注-1	注射薬	ジスロマック点滴 静注用	
											クロラムフェニコール系	クロラムフェニコール酢酸エステルナトリウム	注-1	注射薬
									テトラサイクリン系	ミノサイクリン塩酸塩	注-1	注射薬	ミノマイシン	
セフェム系	セフトリキムナトリウム	外-6	坐剤	エボセリン										

	嚢胞性線維症における緑膿菌による呼吸器感染に伴う症状の改	蛋白合成阻害作用		アミカ [®] リコソ [®] 系	トブラマイシン	外ー2	吸入液		トービイ吸入液	
--	------------------------------	----------	--	-------------------------------------	---------	-----	-----	--	---------	--

6 1 6 主として抗酸菌に作用するもの

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	主として抗酸菌に作用するもの	結核菌	細胞壁合成阻害作用				サイクロセリン	内ー1	加 ⁺ 錠剤		サイクロセリン	
			葉酸合成阻害作用				アルミノ ⁺ ラアミノサリチル酸カルシウム	内ー2	顆粒剤		アルミノニッパスカルシウム	
							ハ ⁺ ラアミノサリチル酸カルシウム	内ー1 内ー2	錠剤 顆粒剤		ニッパスカルシウム	
			ニコル酸合成阻害作用				イソニアジド ⁺	内ー1 内ー2	錠剤 末剤		イスコチン	
							イソニアジド ⁺ メタンスルホン酸ナトリウム	内ー2	末剤		ネオイスコチン	
								内ー1	錠剤			
							エチオナミド ⁺	内ー1	錠剤		ツベルミン	
			核酸 (RNA) 合成阻害作用				デラマニド	内ー1	錠剤		デルティバ錠	
		肺結核及びその他の結核症、MAC症を含む非結核性抗酸菌症、ハンセン病結核症、MAC症を含む非結核性抗酸菌症、HIV感染者における播種性MAC症の発症抑制	細胞内pH低下作用				エタンブトール塩酸塩	内ー1	錠剤		エサンブトール	
			核酸 (RNA) 合成阻害作用				ピラジナミド ⁺	内ー2	末剤		ピラマイド	
							リファンビ ⁺ シ	内ー1	加 ⁺ 錠剤		リファジン	
				リファンピシン耐性結核菌のDNAへのチミジン取り込み阻害作用			リファブ ⁺ チン	内ー1	加 ⁺ 錠剤		ミコブティン	
2	主として抗酸菌に作用するもの	結核菌	核酸 (DNA) 合成阻害作用				クロファジミン	内ー1	加 ⁺ 錠剤		ランブレン	
			蛋白合成阻害作用			アミノグリコシド系	ストレプトマイシン硫酸塩	注ー1	注射薬		硫酸ストレプトマイシン	
							カナマイシン硫酸塩	注ー1	注射薬		硫酸カナマイシン	
						ペプチド系	エンテロマイシン硫酸塩	注ー1	注射薬		ツベラクチン	
			ニコル酸合成阻害作用				イソニアジド ⁺	注ー1	注射薬		イスコチン	

6 1 7 主として真菌に作用するもの

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	主として真菌 に作用するもの	カンジダ*	細胞膜機能障害作用			ホリエン系	ナスタチン	内ー1	錠剤		ナイスタチン	
			細胞膜合成阻害作用				アムホテリシンB アムホテリシンB(小)	内ー1 内ー4	錠剤 シロップ剤		ファンギジン	
						イミダゾール系	ミコナゾール	内ー4	ゲル		フロリード	
		カンジダ*、真菌	細胞膜合成阻害作用			トリアゾール系	フルコナゾール	内ー1 内ー3、4	カプセル剤 ドライシロップ剤		ジフルカン ジフルカンドライシロップ	
							ホリコナゾール	内ー1 内ー3、4	錠剤 ドライシロップ剤		ブイフェンド錠 ブイフェンドドライシロップ	
			核酸(DNA)合成阻害作用			ピリミジン系	フルシトシン	内ー1	錠剤		アンコチル	
		カンジダ*、皮膚糸状菌	細胞膜合成阻害作用			アリルアミン系	テルビナフィン塩酸塩	内ー1	錠剤		ラミシール	
		カンジダ*、真菌、皮膚糸状菌	細胞膜合成阻害作用			トリアゾール系	イトラコナゾール	内ー1 内ー3	カプセル剤 錠剤 液剤		イトリゾール	
		ニューモシスチス・イロペチー	ミトコンドリア電子伝達系阻害作用				アトハコン	内ー3	液剤		サムチレール内用懸濁液	
2	主として真菌 に作用するもの	カンジダ*、真菌	細胞膜機能障害作用			ホリエン系	アムホテリシンB	注ー1	注射薬		ファンギゾン	
			細胞膜合成阻害作用				アムホテリシンB(リホソーム製剤)	注ー1	注射薬		アムビゾーム点滴静注用	
						イミダゾール系	ミコナゾール	注ー1	注射薬		フロリード	
						トリアゾール系	フルコナゾール	注ー1	注射薬		ジフルカン静注液	
							ホスフルコナゾール	注ー1	注射薬		プロジフ注射液100	
							ホリコナゾール	注ー1	注射薬		ブイフェンド	
							イトラコナゾール	注ー1	注射薬		イトリゾール	
							ミカファンギンナトリウム	注ー1	注射薬		ファンガード点滴	
							カスホファンギン酢酸塩	注ー1	注射薬		カンサイダス点滴静注用	
			細胞壁合成阻害作用			キャンデイン系						

625 ウイルスに作用するもの

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	ウイルスに作用するもの	ヘルペスウイルス	核酸（DNA）合成阻害作用				アシクロビル	内ー1 内ー2 内ー3 内ー4	錠剤 顆粒剤 シロップ剤 トランスロップ剤		ゾピラックス	
							バラシクロビル塩酸塩	内ー1 内ー2	錠剤 顆粒剤		バルトレックス	
							ファムシクロビル	内ー1	錠剤		ファムビル錠	
		サイトメガロウイルス	核酸（DNA）合成阻害作用				バルガニシクロビル塩酸塩	内ー1	錠剤		バリキサ錠	
		B型肝炎ウイルス	HBV逆転写酵素阻害/HBV DNA鎖伸長阻止作用			ヌレオント系	ラミブジン	内ー1	錠剤		ゼフィックス錠	
			HBV DNA 合成阻害作用			ヌレオント系	アデホビルホキシル	内ー1	錠剤		ヘブセラ錠	
							エンテカビル水和物	内ー1	錠剤		バラクルード錠	
							テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩	内ー1	錠剤		テノゼット錠	
							テノホビル アラフェナミドフマル酸塩	内ー1	錠剤		ベムリディ錠	
		C型肝炎ウイルス	抗HCV作用				リパビリン	内ー1	カプセル剤		レベトールカプセル	
							リパビリン	内ー1	錠剤		コペガス錠	
			抗HCV作用	HCV NS3-4Aプロテアーゼ選択的阻害作用			テラプレビル	内ー1	錠剤		テラビック錠	
							シメプレビルナトリウム	内ー1	カプセル剤		ソブリアードカプセル	
							パニプレビル	内ー1	カプセル剤		パニヘップカプセル	
							アスナプレビル	内ー1	カプセル剤		スンベブラカプセル	
							グラソプレビル水和物	内ー1	錠剤		グラジナ錠	
			配合剤（HCV NS5A複製複合体阻害作用+HCV NS3-4Aプロテアーゼ選択的阻害作用+活性物質代謝拮抗作用）			配合剤	オムビタスビル水和物／パリタプレビル水和物／リトナビル	内ー1	錠剤		ヴィキラックス配合錠	

			抗HCV作用	HCV NS5A複製複合体阻害作用			ダクラタスビル塩酸塩	内ー1	錠剤		ダクルインザ錠	
							エルバスビル	内ー1	錠剤		エレルサ錠	
			配合剤（HCV NS5A複製複合体阻害作用+HCV NS5Bポリメラーゼ阻害作用）			配合剤	レジパスビル アセトン付加物／ソホスブビル	内ー1	錠剤		ハーボニー配合錠	
			配合剤（HCV NS5A複製複合体阻害作用+HCV NS3-4Aプロテアーゼ選択的阻害作用+HCV NS5Bポリメラーゼ阻害作用）			配合剤	ダクラタスビル塩酸塩／アスナプレビル／ベクラブビル塩酸塩	内ー1	錠剤		ジメンシー配合錠	
			抗HCV作用	HCV NS5Bポリメラーゼ阻害作用			ソホスブビル	内ー1	錠剤		ソバルディ錠	
		インフルエンザウイルス	M2蛋白機能阻害作用				アマンタジン塩酸塩	内ー1	錠剤		シンメトレル	
			ノイラミナーゼ阻害作用				オセルタミビルリン酸塩	内ー1 内ー4	カプセル剤 ドライシロップ剤		タミフル タミフルドライシロップ	
		ヒト免疫不全ウイルス	HIV逆転写酵素阻害作用			ヌクレオシド系	ジドブジン	内ー1	カプセル剤		レトロビル	
							ザニルブジン	内ー1	カプセル剤		ゼリット	
							ジダノシン	内ー1	カプセル剤		ウーアイデックス	
							ラミブジン	内ー1	錠剤		エビビル	
							アバカビル硫酸塩	内ー1	錠剤		ザイアジェン	
							テノホビルジソプロキシルマラ酸塩	内ー1	錠剤		ピリアード錠300mg	
							エムトリシタビン	内ー1	カプセル剤		エムトリバカブセル200mg	
			配合剤（HIV逆転写酵素阻害作用）			配合剤	ジドブジン／ラミブジン	内ー1	錠剤		コンビビル	
							ラミブジン／アバカビル硫酸	内ー1	錠剤		エブジコム錠	
							テノホビルジソプロキシルマラ酸塩／エムトリシタビン	内ー1	錠剤		ツルバダ錠	
							エムトリシタビン／テノホビル アラフェナミドマラ酸塩	内ー1	錠剤		デシコビ配合錠	
							リルビピリン塩酸塩／エムトリシタビン／テノホビル ジンプロキシルマラ酸塩	内ー1	錠剤		コムブレラ配合錠	
			HIV逆転写酵素阻害作用			非ヌクレオシド系	レバレン	内ー1	錠剤		ビラミューン	
							エファビレンツ	内ー1	錠剤		ストックリン	
							エトラビル	内ー1	錠剤		インテレンス錠	
							リルビピリン塩酸塩	内ー1	錠剤		エジュラント錠	
			HIV7'プロテアーゼ阻害作用				インジナビル硫酸塩イノール付加物	内ー1	カプセル剤		クリキシバン	
							サキナビルマラ酸塩	内ー1	錠剤 カプセル剤		インビラーゼ	
							リトナビル	内ー1 内ー3	錠剤 液剤		ノービア	

							ネルフィナビル硫酸塩	内ー1	錠剤		ビラセプト	
							ホスアノプリナビルカルシウム水和物	内ー1	錠剤		レクシウァ錠700	
							ダルナビルエタノール付加物	内ー1	錠剤		ブリジスタ錠	
							ダルナビルエタノール付加物	内ー1	錠剤		ブリジスタナイーブ錠	
							アタザナビル硫酸塩	内ー1	カプセル剤		レイアタツツカプセル150mg	
			配合剤（HIVマテラーゼ阻害作用）	HIVマテラーゼ阻害作用＋活性物質代謝拮抗作用		配合剤	ロビナビル/リトナビル	内ー1 内ー3	錠剤 液剤		カレトラ	
							ダルナビルエタノール付加物／コビシスタット	内ー1	錠剤		プレジコビックス配合錠	
			HIVインテグラーゼ阻害作用				ラルテグラビルカリウム	内ー1	錠剤		アイセントレス錠	
							ドルテグラビルナトリウム	内ー1	錠剤		デビケイ錠	
			配合剤（HIVインテグラーゼ阻害作用＋ヌクレオシド系HIV逆転写酵素阻害作用）			配合剤	ドルテグラビルナトリウム／アバカビル硫酸塩／ラミブジン	内ー1	錠剤		トリーメク配合錠	
			配合剤（HIVインテグラーゼ阻害作用＋活性物質代謝拮抗作用＋ヌクレオシド系HIV逆転写酵素阻害作用）			配合剤	エルビテグラビル／コビシスタット／エムトリシタビン／テノホビルジソプロキシル fumarate 塩	内ー1	錠剤		スタリビルド配合錠	
							エルビテグラビル／コビシスタット／エムトリシタビン／テノホビルアラフィナミド fumarate 塩	内ー1	錠剤		ゲンボイヤ配合錠	
		SSPEウイルス	核酸（RNA）合成阻害作用				イシゾプラナベクス	内ー1	錠剤		イソプリノシン	
		CCR5指向性HIV－1	CCR5受容体5（CCR5）阻害作用				マラビロク	内ー1	錠剤		シーエルセントリ錠	
2	ウイルスに作用するもの	ヘルペスウイルス	核酸（DNA）合成阻害作用				アシクロベル	注ー1 注ー2	注射薬 キット		ゾビラックス	
		サイトメガロウイルス	核酸（DNA）合成阻害作用				ビダラビシン	注ー1	注射薬		アラセナーA	
		RSウイルス	タンパク質合成阻害作用				ガンシクロビル塩酸塩	注ー1	注射薬		デノシン	
							ホスカルネットナトリウム水和物	注ー1	注射薬		ホスカビル	
		RSウイルス	タンパク質合成阻害作用			ヒト/マウスメラ型モノクローナル抗体	バリンビスマブ（遺伝子組換え）	注ー1	注射薬		シナジス筋注用50mg	
		A型又はB型インフルエンザウイルス感染症	ノイラミニダーゼ阻害作用				ペラミビル水和物	注ー1	注射薬		ラビアクタ点滴用バイアル ラビアクタ点滴用バッグ	
3	ウイルスに作用するもの	インフルエンザウイルス	ノイラミニダーゼ阻害作用				サナミビル水和物	外ー2	吸入剤		リレンザ	
							ラニナミビルオクタノ酸エステル水和物	外ー9	吸入剤（キット）		イナビル	

631-633 ワクチン類、毒素及びトキソイド類、抗毒素類

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
2	ワクチン類	肺炎球菌感染症の予防	抗肺炎球菌抗体産生作用				肺炎球菌ワクチン	注-1	注射薬		ニューモバックス	
		狂犬病の予防	抗狂犬病ウイルス抗体産生作用				乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン	注-1	注射薬		組織培養不活性化狂犬病ワクチン	
		B型肝炎の予防	抗HBs抗体産生作用				組換え沈降B型肝炎ワクチン（酵母由来）	注-1	注射薬		エッチビーワイ	
							組換え沈降B型肝炎ワクチン（チャイニーズ・ハムスター卵巣細胞由来）	注-1	注射薬		r-HBワクチン	
	毒素及びトキソイド類	破傷風の予防	抗破傷風菌抗体産生作用				沈降破傷風トキソイド	注-1	注射薬		沈降破傷風トキソイド	
								注-2	キット		沈降破傷風トキソイドキット	
	抗毒素類	ジフテリアの治療	ジフテリア毒素の中和作用				乾燥ジフテリアウマ抗毒素	注-1	注射薬		乾燥ジフテリア抗毒素	
		破傷風の治療・予防	破傷風毒素の中和作用				乾燥破傷風ウマ抗毒素	注-1	注射薬		乾燥破傷風ウマ抗毒素	
		ボツリヌス感染症の治療・予防	ボツリヌス毒素の中和作用				乾燥ボツリヌスウマ抗毒素	注-1	注射薬		乾燥A、B、E、Fボツリヌスウマ抗毒素	
		はぶ咬傷治療	はぶ毒素の中和作用				乾燥はぶウマ抗毒素	注-1	注射薬		乾燥はぶウマ抗毒素	
		まむし咬傷治療	まむし毒素の中和作用				乾燥まむしウマ抗毒素	注-1	注射薬		乾燥まむしウマ抗毒素	

6 3 4 輸血用血液製剤・血漿分画製剤・血球由来製剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
2	輸血用血液製	輸血適応症	全血液成分の補充			全血製剤	人全血液	注－1	注射薬		人全血液-LR「日赤」	
							人全血液(放射線照射)	注－1	注射薬		照射人全血液-LR「日赤」	
		血中赤血球不足 (貧血症等)	赤血球の補充			赤血球製剤	人赤血球濃厚液	注－1	注射薬		赤血球濃厚液-LR「日赤」	
							解凍人赤血球濃厚液	注－1	注射薬		解凍赤血球-LR「日赤」	
							人赤血球濃厚液(放射線照射)	注－1	注射薬		照射赤血球濃厚液-LR「日赤」	
							解凍人赤血球濃厚液(放射線照射)	注－1	注射薬		照射解凍赤血球-LR「日赤」	
		血漿成分による副作用を避ける場合の輸血	赤血球の補充			赤血球製剤	洗浄人赤血球浮遊液	注－1	注射薬		洗浄赤血球-LR「日赤」	
							洗浄人赤血球浮遊液(放射線照射)	注－1	注射薬		照射洗浄赤血球-LR「日赤」	
		ABO型血液型不適合による新生児溶血性疾患	赤血球の補充			合成血製剤	合成血	注－1	注射薬		合成血-LR「日赤」	
							合成血(放射線照射)	注－1	注射薬		照射合成血-LR「日赤」	
		血小板減少症	血小板の補充			血小板製剤	人血小板濃厚液	注－1	注射薬		濃厚血小板	
							人血小板濃厚液(放射線照射)	注－1	注射薬		照射濃厚血小板	
		抗HLA抗体陽性血小板減少症	血小板の補充			血小板製剤	人血小板濃厚液HLA	注－1	注射薬		濃厚血小板HLA	
							人血小板濃厚液HLA(放射線照射)	注－1	注射薬		照射濃厚血小板HLA	
		循環血漿量減少の改善				血漿製剤	新鮮凍結人血漿	注－1	注射薬		新鮮凍結血漿-LA「日赤」	
	血漿分画製剤	低アルブミン血症	循環血漿量の確保			アルブミン製剤	加熱人血漿たん白	注－1	注射薬		プラスマネート／プラスマプロテインフラクション	
							人血清アルブミン	注－1	注射薬		アルブミン	
							人血清アルブミン(遺伝子組換え)	注－1	注射薬		メドウェイ	
							人免疫グロブリン	注－1	注射薬		ガンマグロブリン	
		ウイルス性疾患の予防	抗体活性	抗原中和作用		グロブリン製剤	人免疫グロブリン	注－1	注射薬		ガンマグロブリン	
		重症感染症における抗生物質との併用	抗体活性	抗原中和作用/食食増強作用/免疫調整作用		グロブリン製剤	乾燥ペプシン処理人免疫グロブリン	注－1	注射薬		献血グロブリン注射用	
							乾燥スルホ化人免疫グロブリン	注－1	注射薬		献血ベニロン-I静注用	
							乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	注－1	注射薬		献血グロベニン-I静注用	
							ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	注－1	注射薬		献血ヴェノグロブリンIH静注	
							乾燥pH4処理人免疫グロブリン	注－1	注射薬		サングロボール点滴静注用	
							pH4処理酸性人免疫グロブリン	注－1	注射薬		日赤ポリグロピンN静注	
							乾燥イオン交換樹脂処理人免疫グロブリン	注－1	注射薬		ガンマガード静注用	
							pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)	注－1	注射薬		ハイゼントラ皮下注	
		破傷風の発症予防・症状軽減	抗破傷風抗体活性	破傷風毒素中和作用		抗破傷風グロブリン製剤	乾燥抗破傷風人免疫グロブリン	注－1	注射薬			
							抗破傷風人免疫グロブリン	注－1 注－2	注射薬 キット		テタガムP筋注シリンジ	

					ポリエチレングリコール 処理抗破傷風人免疫グ ロブリン	注－１	注射薬		テタノブリン－IH	
B型肝炎発症予防	抗HBs抗体活性	HBV中和作用		抗HBsグロブリン製剤	乾燥抗HBs人免疫グロ ブリン	注－１	注射薬		ヘプスブリン/乾燥HBグ ロブリン	
					抗HBs人免疫グロブリン	注－１	注射薬		ヘパトセーラ/抗HBs人免 疫グロブリン	
					乾燥ポリエチレングリ コール処理抗HBs人免 疫グロブリン	注－１	注射薬		ヘプスブリン－I	
母体血中での抗D抗体の産生抑制	抗D抗体抑制作用	抗D抗体産生抑制作用		抗Dグロブリン製剤	乾燥抗D(Rho)人免疫 グロブリン	注－１	注射薬		乾燥抗D人免疫グロブリン	
血液凝固因子障害に基づく出血	止血作用	血液凝固第VIII因子の補充		血液凝固第VIII因子	乾燥濃縮人血液凝固第 VIII因子	注－１	注射薬		クロスエイトMC静注用 コンコエイト-HT コンファクトF注射用	
				血液凝固第VIII因子(遺 伝子組換え)	オクトコグ アルファ(遺 伝子組換え)	注－２	キット		コージネイトFSバイオセッ ト注	
					ルリオクトコグ アルファ (遺伝子組換え)	注－１	注射薬		アドベイト注射用	
					ツロクトコグ アルファ(遺 伝子組換え)	注－１	注射薬		ノボエイト静注用	
					エフラロクトコグ アル ファ(遺伝子組換え)	注－１	注射薬		イロクテイト静注用	
					オクトコグ ベータ(遺伝 子組換え)	注－１	注射薬		コパールトリイ静注用	
					ルリオクトコグ アルファ ベゴル(遺伝子組換え)	注－１	注射薬		アディノベイト静注用	
		血液凝固第VIII、IX因子迂回 作用		血液凝固抗体迂回活性 複合体製剤	乾燥人血液凝固因子抗 体迂回活性複合体	注－１	注射薬		ファイバ「イムノ」	
				活性化人血液凝固第VII 因子、人血液凝固第X因 子	乾燥濃縮人血液凝固第 X因子加活性化第VII因 子	注－１	注射薬		バイクロット配合静注用	
		血液凝固第IX因子の補充		血液凝固第VII因子製剤 (遺伝子組換え)	エプタコグ アルファ(活 性型)(遺伝子組換え)	注－１	注射薬		注射用ノボセフン	
				血液凝固第IX因子製剤	乾燥濃縮人血液凝固第I X因子	注－１	注射薬		ノバクト－M/クリスマシン－ M	
					ノナコグアルファ(遺伝子 組換え)	注－１	注射薬		ベネフィクス	
					エフトレノナコグ アル ファ(遺伝子組換え)	注－１	注射薬		オルプロリクス静注用	
					ノナコグ ガンマ(遺伝子 組換え)	注－１	注射薬		リクスビス静注用	
					アルブトレノナコグ アル ファ(遺伝子組換え)	注－１	注射薬		イデルピオン静注用	
				血液凝固第IX因子複合 体製剤	乾燥人血液凝固第IX因 子複合体	注－１	注射薬		PPSB-HT	
				血液凝固第XIII因子	ヒト血漿由来乾燥血液凝 固第XIII因子	注－１	注射薬		フィブロガミンP	
		血液凝固第XIII因子Aサブ ユニットの補充		血液凝固第XIII因子Aサ ブユニット	カトリデカコグ(遺伝子組 換え)	注－１	注射薬		ノボサーティーン静注用	
		フィブリノーゲンの補充		フィブリノーゲン製剤	乾燥人フィブリノーゲン	注－１	注射薬		フィブリノーゲン-HT	
アンチトロンビン欠乏・低下症	血栓形成抑制作用	トロンビン活性阻害作用		アンチトロンビン製剤	乾燥濃縮人アンチトロン ビンIII	注－１	注射薬		アンスロビンP	
					アンチトロンビン ガンマ (遺伝子組換え)	注－１	注射薬		アコアラン静注用	
先天性プロテインC欠乏症による深部 静脈血栓症等	血栓形成局所で抗凝固作 用、線溶亢進作用	活性化プロテインCの補充		活性化プロテインC製剤	乾燥濃縮人活性化プロ テインC	注－１	注射薬		注射用アナクトC	
遺伝性血管神経性浮腫	血管透過性亢進の抑制作用	活性化補体第1成分阻止作 用		C1インアクチベータ製剤	乾燥濃縮人C1－インアク チベーター	注－１	注射薬		ベリナートP	
ヘモグロビン血症・尿症	遊離ヘモグロビンの処理作用	ハプトグロビン－ヘモグロビン 複合体の生成		ハプトグロビン製剤	人ハプトグロビン	注－１	注射薬		ハプトグロビン	
気管支喘息、アレルギー性鼻炎、ア レルギー性皮膚疾患	配合剤(好酸球浸潤抑制作 用)	ヒスタミン耐性獲得作用+ヒス タミン遊離抑制作用		配合剤	ヒスタミン加入免疫グロ ブリン(乾燥)	注－１	注射薬		ヒスタグロビン	

	血球由来製剤	急性ポルフィリン症患者における急性発作症状の改善	δ-アミノレブリン酸合成酵素活性阻害作用		ヒトヘミン製剤	ヘミン	注-1	注射薬		ノーマサング点滴静注	
--	--------	--------------------------	----------------------	--	---------	-----	-----	-----	--	------------	--

639 インターフェロン類

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
2	インターフェロン類	ウイルス性肝炎	抗ウイルス作用	ウイルス蛋白合成阻害作用、免疫賦活作用		天然型インターフェロンアルファ	インターフェロン アルファ(NAMALWA)	注-1	注射薬		スミフェロン	
						遺伝子組換え型インターフェロンアルファ	インターフェロン アルファ-2b(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		イントロンA	
						遺伝子組換え型ベグインターフェロンアルファ	ベグインターフェロン アルファ-2a(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		ペガシス皮下注90μg	
							ベグインターフェロン アルファ-2b(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		ベグイントロン皮下注用	
		多発性硬化症の再発予防	症状進行抑制作用	T細胞サプレッサー機能改善/インターフェロンγ産生抑制作用		天然型インターフェロンベータ	インターフェロン ベータ	注-1	注射薬		フェロン/IFNβ	
						遺伝子組換え型インターフェロンベータ	インターフェロン ベータ-1b(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		ベタフェロン皮下注	
							インターフェロン ベータ-1a(遺伝子組換え)	注-2	キット		アボネックス筋注用	
		悪性腫瘍	抗腫瘍作用	腫瘍細胞増殖抑制作用、免疫賦活作用		遺伝子組換え型インターフェロンガンマ	インターフェロン ガンマ-1a(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		イムノマックスγ/ピオガンマ	
						インターロイキン2製剤	テセロイキン(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		イムネース	
							セルモロイキン(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		セロイク	

639 その他の生物学的製剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
2	その他の生物 学的製剤	再生不良性貧血	免疫抑制作用	T細胞抑制作用		ウサギ免疫グロブリン製剤	抗ヒトリンパ球ウサギ免疫グロブ リン	注－1	注射薬		ゼットブリン	
							抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン	注－1	注射薬		サイモグロブリン点 滴静注用	
		腎移植に伴う拒否反応	腎移植に伴う拒否反応	T細胞抑制作用		ヒト／マウスキメラ型モノクローナル 抗体	バシリキシマブ（遺伝子組換え）	注－1	注射薬		シムレクト静注用 20mg	
								注－1	注射薬		シムレクト小児用静 注用10mg	
		発作性夜間ヘモグロビン尿症に おける溶血	ヒト補体蛋白（hc5）と結合する ことによりC5の開裂を阻害し、 C5b-9の生成を抑制（溶血抑制）				エクリズマブ（遺伝子組換え）	注－1	注射薬		ソリリス点滴静注	

6 4 1 原虫に作用するもの

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	原虫に作用するもの	マラリア原虫	核酸 (DNA) 障害作用			キニーネ製剤	キニーネエチル炭酸エステル	内ー2	末剤		エチル炭酸キニーネ	
							キニーネ塩酸塩	内ー2	末剤		塩酸キニーネ	
			ヘム重合阻害作用				キニーネ硫酸塩	内ー2	末剤		硫酸キニーネ	
	配合剤 (原虫に作用するもの)	マラリア原虫				配合剤	メフロキン塩酸塩	内ー1	錠剤		メファキン「エスエス」錠275	
			ミトコンドリア電子伝達系阻害作用+ジヒドロ葉酸レダクターゼ阻害作用				アトパコン/プログアニル塩酸塩	内ー1	錠剤		マラロン配合錠	
								内ー1	錠剤		マラロン小児用配合錠	
			反応性代謝物産生+ヘム重合阻害作用			配合剤	アルテメテル/ルメファントリン	内ー1	錠剤		リアメット配合錠	
	原虫に作用するもの	トリコモナス原虫	核酸 (DNA) 障害作用				メトロニダゾール	内ー1	錠剤		フラジール	
							チニダゾール	内ー1	錠剤		ハイシジン	
		腸管アメーバ	蛋白合成阻害作用				パロモマイシン硫酸塩	内ー1	カプセル剤		アメバロモカプセ	
		三日熱マラリア及び卵形マラリア	休眠体原虫に対するミトコンドリア電子伝達系阻害作用、活性酸素による酸化的損傷作用				ブリマキンリン酸塩	内ー1	錠剤		ブリマキン錠15mg「サノフィ」	
2	原虫に作用するもの	ニューモシスチス・カリニ	グルコース代謝抑制作用				ペンタミジンイセチオン酸塩	注ー1	注射薬		ベナンボックス	
		偏性嫌気性菌/アメーバ赤痢	核酸 (DNA) 障害作用				メトロニダゾール	注ー1	注射薬		アネメトロ点滴静注液	
	配合剤 (原虫に作用するもの)	ニューモシスチス・カリニ	葉酸合成阻害作用+葉酸活性抑制作用			配合剤	スルファメトキサゾール/トリメトプリム	注ー1	注射薬		バクトラミン	

6 4 2 寄生虫に作用するもの

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	寄生虫に作用 するもの	吸虫	膜構造不安定化作用				ブ ⁺ ラジ ⁺ カンテル	内ー1	錠剤		ピルトリシド錠	
		回虫	運動性消失作用			サントニン系	サントニン	内ー2	末剤		サントニン原末	
		フィラリア	酸素消費抑制作用			ピ ⁺ ペ ⁺ ラジ ⁺ ン	ジ ⁺ エチルカルバ ⁺ マジ ⁺ ンクエン 酸塩	内ー1	錠剤		スパトニン錠	
		包虫	微小管形成阻害作用			ベンズ ⁺ イミダ ⁺ ゾール系	アルベ ⁺ ンダ ⁺ ゾール	内ー1	錠剤		エスカゾール錠	
		糞線虫	細胞膜過分極作用			アベ ⁺ ルメクチン系	イベ ⁺ ルメクチン	内ー1	錠剤		ストロメクトール錠	
		鞭虫	微小管形成阻害作用			ベンズ ⁺ イミダ ⁺ ゾール系	メベンダ ⁺ ゾール	内ー1	錠剤		メベンダゾール錠	
		蟯虫、回虫、鉤虫、条虫	蛋白凝固作用			チモール系	チモール	内ー2	末剤		チモール	
		蟯虫、回虫、鉤虫、東洋 毛様線虫	神経-筋伝達遮断作用				ピ ⁺ ラシテルバ ⁺ モ酸塩	内ー1	錠剤		コンバントリン錠	
								内ー4	ドライシロップ ⁺ 剤		コンバントリン ドライシロップ	
3	寄生虫に作用 するもの	疥癬虫	神経遮断作用	細胞膜脱分極作用		ピレスロイド系	フェノトリリン	外ー1	ローション剤		スミスリンロー ション	

721・729・799 造影用剤 (放射性医薬品を除く)

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	造影用剤	消化管造影					アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	内-3	液剤	経口投与又は注腸	ガストログラフィン	
							硫酸バリウム	内-2	散剤	経口投与又は注腸	ウムブラゾルーA	
							配合剤 硫酸バリウム／炭酸ガス	内-3	液剤	経口投与又は注腸	バリトッソル	
							クエン酸鉄アンモニウム	内-2	散剤	溶解し服用	フェリセルツ	
							塩化マンガン四水和物	内-3	液剤	経口投与	ボースデル	
		消化管造影補助	発泡作用			糖類	D-ソルビトール	内-3	液剤	X線造影剤に添加し服用	D-ソルビトール液	
		配合剤(消化管造影補助)					配合剤 炭酸水素ナトリウム／酒石酸プロナーゼ	内-2	散剤	経口投与	D-ソルビトール	
		胃内視鏡検査における胃内粘液の溶解除去	蛋白分解作用					内-2	散剤	水に溶かし経口投与	ガストラストK	
		大腸コンピューター断層撮像の補助	X線吸収作用				硫酸バリウム	内-3	液剤	経口投与	プロナーゼMS	
											コロنفォート内用懸濁液	
2	造影用剤	尿路・血管造影				イオン性	アミドトリゾ酸メグルミン	注-1	注射薬	適宜点滴静注	アンギオグラフィン	
							イオタラム酸ナトリウム	注-1	注射薬		コンレイ400注	
							イオタラム酸メグルミン	注-1	注射薬		DIPコンレイ注	
							アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	注-1	注射薬	適宜点滴静注など	ウログラフィン60%	
							イオキサグル酸	注-1	注射薬	(一部点滴)	ヘキサブリックス32	
						非イオン性	イオバミドール	注-1 注-2	注射薬 キット		イオバミロン150 モイオバミン300シリンジ	
							イオヘキソール	注-1 注-2	注射薬 キット		オムニパーク140 オムニパーク240シリンジ	
							イオベルソール	注-1 注-2	注射薬 キット		オブチレイ160 オブチレイ240シリンジ	
							イオメブロール	注-1 注-2	注射薬 キット		イオメロン300 イオメロン300シリン	
							イオプロミド	注-1 注-2	注射薬 キット		プロスコープ150 プロスコープ300シリンジ	
							イオジキサノール	注-1	注射薬		ビジパーク	
		子宮卵管、関節、脊髓撮影				非イオン性	イオトロラン	注-1	注射薬	撮影部位に投与	インビスト	
		胆のう・胆管造影				イオン性	イオトロクス酸メグルミン	注-1	注射薬	点滴静注	ピリスコピンDIC50	
		リンパ、子宮卵管撮影				油性	ヨード化ケシ油脂脂肪酸エチルエステル	注-1	注射薬	末梢リンパ管内に注入ほか	リビオドールウルトラフルイド	
		脳・脊髓、躯幹部・四肢の造影				イオン性	ガドベンテド酸メグルミン	注-1	注射薬	静注	マグネビスト	
							ガドテル酸メグルミン	注-2	キット		マグネビストシリンジ	
						非イオン性	ガドジアミド水和物	注-1 注-2	注射薬 キット	静注	オムニスキャン オムニスキャンシリンジ	
							ガドテリドール	注-1	注射薬	静注	プロハンス注	
								注-2	キット		プロハンス静注シリンジ	
		肝臓造影				超常磁性酸化鉄コロイド	フェルカルボトラン	注-1	注射薬	静注	ガドピスト静注 1.0mol/Lシリンジ	
							ガドキセト酸ナトリウム	注-1	注射薬	静注	リゾビスト	
		肝腫瘍性病変の造影	共振作用				ベルフルプタン	注-1	注射薬	静注	EOB・ブリモビスト	
											ソナゾイド	

		心エコー図検査における造影	配合剤(消失作用)			配合剤	ガラクトース／パルミチン酸	注-1	注射薬	静注	レボピスト	
3	造影用剤	脳血流の測定					キセノン吸入剤(非放射性)	外-2	吸入剤	専用吸入装置に装着し使用。吸	ゼノンコールド	
		注腸消化管造影	配合剤				アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミ	外-7	液剤	注腸	ガストログラフィン	
							硫酸バリウム	外-7	液剤	注腸	バリエネマLC	
						配合剤	硫酸バリウム／炭酸ガス	外-7	液剤	注腸	バリトッブ	

722 検査用試薬 ・ 729診断用薬

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	検査用試薬・ 診断用薬	膵外分泌機能検査					ベンチロミド	内ー3	液剤		膵外分泌機能検査用PFD 内服液	
		下垂体ACTH分泌予備能の測定	ACTH分泌作用				メチラボン	内ー1	カプセル剤		メトピロンカプセル	
		糖尿病診断時の糖負荷試験	インスリン分泌作用				デンブン部分加水分解物液	内ー3	液剤		トレーランG液	
		ヘリコバクター・ピロリの感染診断					尿素(13C)	内ー1	錠剤		ユービット錠	
		悪性神経腫の腫瘍摘出術中における腫瘍 組織の可視化	腫瘍細胞内への蓄積				アミノレプリン酸塩塩	内ー2	末剤		アラベル内用剤 アラグリオ内用剤	
2	検査用試薬・ 診断用薬	下垂体LH分泌機能検査	視床下部作用	ゴナドトロピン分泌作用			ゴナドレリン酢酸塩	注ー1	注射薬		LH-RH注射液タナベ	
		下垂体TSH分泌機能検査／下垂体プロラクチ ン分泌機能検査		TSH、プロラクチン分泌作用			酒石酸プロチレリン	注ー1	注射薬		ヒルトニン注射液	
							プロチレリン	注ー1	注射薬		TRH注射液タナベ	
		副腎皮質機能検査	ACTH分泌作用				テトラコサクチド酢酸塩	注ー1	注射薬			
							テトラコサクチド酢酸亜鉛	注ー1	注射薬			
		下垂体機能検査	視床下部作用	成長ホルモン分泌刺激作用			アルギニン塩酸塩	注ー1	注射薬		アルギニン注「モリシタ」	
		下垂体成長ホルモン分泌機能検査					ソマトレリン酢酸塩	注ー1	注射薬		注射用GRF住友50	
		成長ホルモン分泌不全症の診断					ブラルモレリン塩酸塩	注ー1	注射薬		注射用GHRP科研100	
		成長ホルモン分泌機能検査、インスリノーマ診 断、肝糖原検査		グリコーゲン分解および糖新 生作用	アデニル酸シクラーゼ活性化 作用		グルカゴン	注ー1	注射薬			
		視床下部・下垂体・副腎皮質系ホルモン分泌 機能検査	ACTH分泌作用	ACTHおよび副腎皮質糖質ス テロイドホルモン分泌作用			コルチコレリン(ヒト)	注ー1	注射薬		ヒトCRH注「ミツビシ」	
		結核診断検査	ツベルクリン反応				精製ツベルクリン	注ー1	注射薬		一般／確認診断用精製ツ ベルクリン(PPD)	
		Ellsworth-Howard試験(副甲状腺機能検 査)					テリバラチド酢酸塩	注ー1	注射薬		ヒトPTH注(旭化成)	
		肝機能検査	肝排泄作用				インドシアニングリーン	注ー1	注射薬		ジアグノグリーン注	
		腎機能検査	尿中排泄作用				インジゴカルミン	注ー1	注射薬		インジゴカルミン注第一	
							パラアミノ馬尿酸ナトリウム	注ー1	注射薬		パラアミノ馬尿酸ソーダ注 射液10%	
							フェノールスルホンフタレイ ン	注ー1	注射薬		フェノールスルホンフタレイ ン注第一	
			糸球体ろ過作用				イヌリン	注ー1	注射薬		イヌリード注	
		重症筋無力症の診断、筋弛緩剤投与後の遷 延性呼吸抑制の作用機序の鑑別診断	コリンエステラーゼ阻害作用				エドロホニウム塩化物	注ー1	注射薬		アンチレクス	
		アレルギー性疾患のアレルゲンの確認	アレルギー反応				診断用アレルゲンエキス	注ー1	注射薬		診断用アレルゲンエキス 「トリキ」	
							診断用コナヒョウヒダニエキ ス及びヤケヒョウヒダニエキ ス	注ー1	注射薬		スクラッチダニアレルゲン エキス「トリイ」	
		アレルゲンによる皮膚反応の陽性対照					ヒスタミン二塩酸塩	注ー1	注射薬		アレルゲンスクラッチエキ ス陽性対照液「トリイ」ヒス タミン二塩酸塩	
		ぶどう膜・網膜・視神経等の疾患の診断					フルオレセイン	注ー1	注射薬		フルオレサイト注射液1号	
		網脈絡膜血管の造影					インドシアニングリーン	注ー1	注射薬		オフサグリーン静注用	
		褐色細胞腫の診断	エピネフリンによる昇圧遮断 作用	α 受容体遮断作用			フェントラミンメシル酸塩	注ー1	注射薬		レギチーン注射液	
		コンピューター断層撮影による冠動脈造影にお ける高心拍数時の冠動脈描出能の改善		選択的 β 1 受容体遮断作用			ランジオロール塩酸塩	注ー1	注射薬		コアベータ静注用	

3	検査用試薬・ 診断用薬	アレルギー性鼻炎及び気管支喘息のアレルゲンの確認	アレルギー反応				ハウスダストアレルゲン	外			アレルゲンディスク「トリイ」 ハウスダスト	
		アレルギー性鼻炎及び気管支喘息のアレルゲンの確認	アレルギー反応				ブタクサアレルゲン	外			アレルゲンディスク「トリイ」 ブタクサ花粉	
		アレルギー性皮膚疾患のアレルゲンの確認	アレルギー反応				パッチテスト用アレルゲン	外			パッチテスト試薬、パッチ テストパネル(S)	
		外眼部・前眼部及び涙器疾患の検査					フルオレセインナトリウム	外			フルオル試験紙	
		気道過敏性検査	アセチルコリン受容体刺激作用				メタコリン塩化物	外			プロボコリン吸入粉末溶解 用 ケンブラン吸入粉末溶解 用	

229・799 その他に分類されない治療を主目的としない医薬品

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品	線引き
1	その他に分類 されない治療を 主目的としない 医薬品	ニコチン依存症の喫煙者に対する禁煙の補助	$\alpha 4 \beta 2$ ニコチン受容体部分 作動作用				バレニクリン酒石酸塩	内－1	錠剤		チャンピックス	
		上部消化管内視鏡検査における胃蠕動運動 の抑制	胃の蠕動運動抑制作用				l-メントール	内－3	液剤		ミンクリア内用散布 液0.8%	
2	その他に分類 されない治療を 主目的としない 医薬品	心臓外科手術時心筋保護	配合剤(心筋保護作用)			配合剤	塩化ナトリウム・塩化カリウ ム配合剤	注－1	注射薬		ミオテクター	
		心筋血流シンチグラフィによる心臓疾患の診 断を行う場合の負荷誘導	血管拡張作用				アデノシン	注－1	注射薬		アデノスキャン注60 mg	
		分化型甲状腺癌で甲状腺全摘又は準全摘術 を施行された患者における、放射性ヨウ素シン チグラフィと血清サイログロブリン(Tg)試験 の併用又はTg試験単独による診断の補助	甲状腺由来細胞へのヨウ素 摂取促進作用並びに甲状腺 ホルモン及びTg産生促進作 用				ヒトチロトロピン アルファ (遺伝子組換え)	注－1	注射薬		タイロゲン筋注用	
3	その他に分類 されない治療を 主目的としない 医薬品	外科用接着	重合硬化作用				シアノアクリレート液	外－1	液剤		アロンアルファA「三 共」	
		癒着防止	癒着防止作用				ゼラチン	外－5	貼付剤		ゼルフィルム	
		組織接着	配合剤(フィブリン塊生成作 用)			配合剤	フィブリノゲン加第XIII因子	外－9	キット		ペリプラストP コン ビセット	
							フィブリノゲン配合剤	外－5	貼付剤		タコシール	
		吸入用呼吸器官用剤の溶解剤	界面活性作用				チロキサポール	外－2	吸入剤		アレパール	
		禁煙の補助	ニコチン経皮吸収による禁煙 時の離脱症状軽減作用				ニコテン	外－5	貼付剤		ニコチネル	

811 あへんアルカロイド系製剤 ・ 812 コカアルカロイド系製剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	アヘンアルカロイド系製剤	激しい下痢症状の改善及び手術後等の腸管ぜん動運動の抑制	鎮痛作用	消化管平滑筋を収縮、胃及び腸管運動抑制作用			アヘン	内-2 内-2 内-3	末剤 散剤 液剤		アヘン末 アヘン散 アヘンチンキ	
		激しい咳嗽発作における鎮咳／肺結核、急・慢性気管支炎、肺がん、塵肺時等の鎮咳	鎮咳作用	咳嗽中枢に対する抑制作用			コデインリン酸塩	内-2 内-2 内-1	末剤 散剤 錠剤		リン酸コデイン リン酸コデイン10倍散 リン酸コデイン錠	
							ジヒドロコデインリン酸塩	内-2 内-2	末剤 散剤		リン酸ジヒドロコデイン	
							オキシメタノール	内-1	錠剤		メタニール錠	
		癌性疼痛	鎮痛作用	求心性痛覚伝導路抑制作用／下行性痛覚抑制系賦活による鎮痛作用			モルヒネ塩酸塩	内-2 内-1 内-1 内-3 内-1 内-3	末剤 錠剤 カプセル剤 液剤 カプセル剤 液剤		塩酸モルヒネ	
							アヘンアルカロイド塩酸塩（モルヒネ47～52%、他のアルカロイド33～38.5%）	内-2	末剤		バンオピン「タケダ」	
							エチルモルヒネ塩酸塩	内-2	末剤		塩酸エチルモルヒネ	
							モルヒネ硫酸塩	内-1 内-1 内-2 内-2	錠剤 カプセル剤 顆粒剤 細粒剤		MSコンチン錠 カディアンカプセル カディアンスティック	
							オキシコドン塩酸塩	内-1 内-2	錠剤 散剤		オキシコンチン錠5mg オキノーム散	
		次の呼吸器疾患に伴う咳嗽：肺結核、急・慢性気管支炎、肺がん、塵肺、感冒	鎮痛作用	求心性痛覚伝導路抑制作用／下行性痛覚抑制系賦活による鎮痛作用			オキシメタノール	内-1	錠剤		メタニール錠	
2	アヘンアルカロイド系製剤	激しい疼痛時における鎮痛・鎮静、激しい咳嗽発作における鎮咳、激しい下痢症状の改善及び手術後等の腸管ぜん動運動の抑制	配合剤（鎮痛作用）	求心性痛覚伝導路抑制作用／下行性痛覚抑制系賦活による鎮痛作用		配合剤	アヘン／トコン	内-2	散剤		ドーフル散	
		激しい疼痛時における鎮痛・鎮静・鎮けい、中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛	鎮痛作用	求心性痛覚伝導路抑制作用／下行性痛覚抑制系賦活による鎮痛作用			モルヒネ塩酸塩	注-1 注-2	注射薬 キット		塩酸モルヒネ注射液	
							アヘンアルカロイド塩酸塩	注-1	注射薬		オピアル注射液	
							オキシコドン塩酸塩水和物	注-1	注射薬		オキファスト注	
		激しい疼痛時における鎮痛・鎮静・鎮けい	配合剤（鎮痛作用＋鎮咳作用）	求心性痛覚伝導路抑制作用／下行性痛覚抑制系賦活による鎮痛作用＋副交感神経抑制作用		配合剤	アヘンアルカロイド／スコボラミン臭化水素酸塩	注-1	注射薬		オビスコ注射液	
						配合剤	アヘンアルカロイド／硫酸アトロピン	注-1	注射薬		オピアト注射液	
						配合剤	モルヒネ塩酸塩／アトロピン硫酸塩	注-1	注射薬		モヒアト注射液	
		激しい疼痛時における鎮痛・鎮静・鎮けい	配合剤（鎮痛作用＋鎮咳作用）	求心性痛覚伝導路抑制作用／下行性痛覚抑制系賦活による鎮痛作用＋鎮咳作用		配合剤	オキシコドン塩酸塩／ヒドロコタルニン塩酸塩	注-1	注射薬		パピナール注「タケダ」	


		激しい疼痛時における鎮痛・鎮静・鎮けい	配合剤(鎮痛作用＋鎮咳作用)	求心性痛覚伝導路抑制作用／下行性痛覚抑制系賦活による鎮痛作用＋副交感神経抑制作用＋鎮咳作用		配合剤	オキシコドン塩酸塩／ヒドロコタルニン塩酸塩／アトロピン硫酸塩	注－1	注射薬		バビナール・アトロピン注	
3	アヘンアルカロイド系製剤	癌性疼痛	鎮痛作用	求心性痛覚伝導路抑制作用／下行性痛覚抑制系賦活による鎮痛作用			モルヒネ塩酸塩	外－6	坐剤		アンベック坐剤	
	コカアルカロイド系製剤	表面麻酔	局所麻酔作用	神経における活動電位の伝導抑制作用			コカイン塩酸塩	外－1	末剤		塩酸コカイン「シオノギ」	

821 合成麻薬

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分名	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	合成麻薬	激しい疼痛時における鎮痛・鎮静・鎮けい	鎮痛・鎮けい作用	求心性痛覚伝導路抑制作用 ／下行性痛覚抑制系賦活による鎮痛作用		フェニルピペリジン系	ベチジン塩酸塩	内－2	末剤		オピスタン原末	
		強オピオイド鎮痛剤を定時投与中の癌患者における突出痛の鎮痛	鎮痛作用	求心性痛覚伝導路抑制作用 ／下行性痛覚抑制系賦活による鎮痛作用		ピペリジン系	フェンタニルクエン酸塩	内－5	パッカル		イーフェンパッカル錠	
		他の強オピオイド鎮痛剤で治療困難な下記疾患における鎮痛 中等度から高度の疼痛を伴う各種癌	鎮痛作用	求心性痛覚伝導路抑制作用 ／下行性痛覚抑制系賦活による鎮痛作用			メサドン塩酸塩	内－1	錠剤		メサベイン錠	
							タベンタール塩酸塩	内－1	錠剤		タベンタ錠	
2	合成麻薬	激しい疼痛時における鎮痛・鎮静・鎮けい／麻酔前投薬、麻酔の補助	鎮痛・鎮けい作用	求心性痛覚伝導路抑制作用 ／下行性痛覚抑制系賦活による鎮痛作用		フェニルピペリジン系	ベチジン塩酸塩	注－1	注射薬		オピスタン注射液	
			鎮痛作用	求心性痛覚伝導路抑制作用 ／下行性痛覚抑制系賦活による鎮痛作用		ピペリジン系	フェンタニルクエン酸塩	注－1	注射薬		フェンタネスト	
		全身麻酔の導入及び維持における鎮痛	鎮痛作用	求心性痛覚伝導路抑制作用 ／下行性痛覚抑制系賦活による鎮痛作用		ピペリジン系	レミフェンタニル塩酸塩	注－1	注射薬		アルチバ	
		(1)激しい疼痛時における鎮痛・鎮静・鎮けい (2)麻酔前投薬 (3)麻酔の補助	配合剤(鎮痛・鎮けい作用＋呼吸抑制防止作用)	求心性痛覚伝導路抑制作用 ／下行性痛覚抑制系賦活による鎮痛作用		配合剤	ベチジン塩酸塩／レパ ロルファン酒石酸塩	注－1	注射薬		ベチロルファン注射液	
		手術、検査及び処置時の全身麻酔、 並びに局所麻酔の補助	配合剤(鎮痛作用＋鎮静作用)	求心性痛覚伝導路抑制作用 ／下行性痛覚抑制系賦活による鎮痛作用		配合剤	ドロペリドール／フェン タニルクエン酸塩	注－1	注射薬		タラモナール	
3	合成麻薬	癌性疼痛	鎮痛作用	求心性痛覚伝導路抑制作用 ／下行性痛覚抑制系賦活による鎮痛作用		ピペリジン系	フェンタニル	外－5	貼付剤		デュロテップパッチ	
								外－5	貼付剤		ワンデュロパッチ	
							フェンタニルクエン酸塩	外－5	貼付剤		フェントステーブ	

リウマチ治療用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	リウマチ治療 用剤	慢性関節リウマチ	免疫調節作用				アクタリット	内ー1	錠剤		オークル錠、モーバー錠	
							ブシラミン	内ー1	錠剤		リマチル	
							Dーベニシラミン	内ー1	カプセル剤		メタルカプターゼ	
							ロベンザリットニナトリウム	内ー1	錠剤		カルフェニール錠	
							オーラノフィン	内ー1	錠剤		リドーラ錠	
							メトレキサート	内ー1 内ー1	カプセル剤 錠剤		リウマトレックスカプセル	
							サラゾスルファピリジン	内ー1	錠剤		アザルフィジンEN	
							ミソリピン	内ー1	錠剤		フレディニン錠	
				ジヒドロオレートデヒドロゲナーゼ 阻害作用		イソキサゾール系	レフルノミド	内ー1	錠剤		アラバ錠10mg	
							イグラチモド	内ー1	錠剤		コルベット錠、ケアラム	
				チロシンキナーゼ阻害作用	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害 作用		トファシチニブクエン 酸塩	内ー1	錠剤		ゼルヤンツ錠	
2	リウマチ治療 用剤	関節リウマチ	免疫調節作用				金チオリンゴ酸ナトリ ウム	注ー1	注射薬		シオソール	
		関節リウマチ(既存治療で効果不 十分な場合に限る)	免疫調節作用	TNF阻害作用	TNF α 阻害作用	ヒト/マウスキメラ型抗ヒト TNF αモノクローナル抗 体(糖タンパク質)	インフリキシマブ(遺 伝子組換え)	注ー1	注射薬		レミケード点滴静注用 100	
						ヒト型抗ヒトTNF αモノク ローナル抗体(糖タンパ ク質)	アダリムマブ(遺伝 子組換え)	注ー2	キット	皮下注	ヒュミラ皮下注40mgシリ ンジ0.8mL、同20mgシリ ンジ0.4mL	
						ヒト型ヒトTNF αIgG1モ ノクローナル抗体	ゴリムマブ(遺伝子 組換え)	注ー2	キット	皮下注	シンボニー皮下注	
						ヒト型抗ヒトTNF αモノ クローナル抗体の Fab断片の誘導体	セルトリズマブ ペゴ ル(遺伝子組換え)	注ー2	キット	皮下注	シムジア皮下注シリンジ	
				TNF α及びLT α阻害作用		ヒト型可溶性TNFレセ プター融合蛋白	エタネルセプト(遺伝 子組換え)	注ー1 注ー2	注射薬 キット		エンブレル皮下注用 10mg、25mg、25mgシリ ンジ0.5mL、50mgシリ ンジ1.0mL	
				IL-6シグナル伝達阻害作用		ヒト型抗ヒトIL-6レセ プターモノクローナ ル抗体	トシリズマブ(遺伝子 組換え)	注ー1 注ー2	注射薬 キット		アクテムラ点滴静注用 200mg アクテムラ皮下注(シリ ンジ、オートインジェク ター)	
				T細胞選択的共刺激調節作 用		ヒト型可溶性 CTLA4-IgG1融合蛋	アバタセプト(遺伝子 組換え)	注ー1 注ー2	注射薬 キット		オレンシア点滴静注用 オレンシア皮下注シリ ンジ	
3	リウマチ治療 用剤	慢性関節リウマチによる指、手、肘関 節の腫脹・疼痛の緩解	プロスタグランジン産生抑制 作用				ブレドニゾンファル ネシル酸エステル	外ー1	ゲル剤		フェルネラートゲル	



D P Cにおける高額な新規の医薬品等への対応について

1 新規に薬価収載された医薬品等については、DPC/PDPSにおける診療報酬点数表に反映されないことから、一定の基準に該当する医薬品等を使用した患者については、包括評価の対象外とし、次期診療報酬改定までの間、出来高算定することとしている。

- 前年度に使用実績のない医薬品等は、当該医薬品等の標準的な使用における薬剤費（併用する医薬品を含む）の見込み額が、使用していない症例の薬剤費の84%tileを超えること。
○ 包括評価の対象外とするか否かは、個別DPC（診断群分類）毎に判定するものとする。

2 平成29年3月2日、3月24日及び3月30日に新たに効能が追加された医薬品、平成29年3月2日に公知申請が受理された医薬品並びに平成29年5月24日に薬価収載を予定している医薬品等のうち以下に掲げるものは、上記基準に該当する。よって、これらの薬剤を使用した患者であって当該薬剤に対応する出来高算定対象診断群分類に該当するものについては、次期診療報酬改定までの間、出来高算定することとしてはどうか。

銘柄名	成分名	規格単位	薬価	効能効果	用法用量	1回投与当たりの 標準的な費用 (A)	出来高算定対象		平均在院日数を加味した 1入院当たり標準的費用		包括範囲薬剤 の 84%tile値
							診断群分類番号	(告示) 番号	仮想投与回数 (日数) (B)	標準的費用 (A×B)	
マキユエイド硝子体内 注用40mg	トリアムシノ ロンアセトニ ド	40mg1瓶	8,296円	下記の疾患に伴う黄 斑浮腫の軽減 糖尿病性黄斑浮腫 網膜静脈閉塞症 非感染性ぶどう膜炎	通常、本剤1 バイアルに1 mLの 生理食塩液又は眼灌流液を注入 してトリアムシノロンアセトニ ド濃度が40mg/mLになるように用 時懸濁し、トリアムシノロンア セトニドとして20mg（懸濁液と して0.5mL）をテノン嚢下に投与 する。	8,296円/回	020180 糖尿病性増殖性網膜症 020210 網膜血管閉塞症				
							020180xx99x0xx	1804	1.00回	8,296円	7,477円
							020210xx97x0xx	1824	1.00回	8,296円	6,919円
レブラミドカプセル 2.5mg レブラミドカプセル 5mg	レナリドミド 水和物	2.5mg1カプセル 5mg1カプセル	7,647.1円 9,114.2円	再発又は難治性の成人T細胞白血病リン パ腫	通常、成人にはレナリドミドと して1 日1 回25mgを連日経口投 与する。 なお、患者の状態により適宜減 量する。	45,571円/日	130030 非ホジキンリンパ腫				
							130030xx99x30x	3817	20.00回	911,420円	297,594円
							130030xx99x31x	3818	36.00回	1,640,556円	667,364円
							130030xx97x3xx	3830	44.00回	2,005,124円	940,709円
リツキサン注10mg/mL	リツキシマブ （遺伝子組換 え）	100mg10mL 1 瓶 500mg50mL 1 瓶	43,641円 213,815円	慢性特発性血小板減 少性紫斑病	通常、成人には、リツキシマブ （遺伝子組換え）として1回量 375mg／m2を 1 週間間隔で 4 回点 滴静注する。	257,456円/回	130110 出血性疾患（その他）				
							130110x0xxx00x	3889	3.00回	772,368円	67,702円
							130110x0xxx01x	3890	4.00回	1,029,824円	278,242円
							130110x0xxx1xx	3891	4.00回	1,029,824円	667,102円
							130110x1xxx0xx	3895	1.00回	257,456円	6,040円
ゾレア皮下注用75 mg ゾレア皮下注用150 mg	オマリズマブ （遺伝子組換 え）	75mg1瓶 150mg1瓶	23,128円 45,578円	特発性の慢性蕁麻疹 食物、物理的刺激等 の蕁麻疹の症状を誘 発する原因が特定さ れず、ヒスタミンH1 受容体拮抗薬の増量 等の適切な治療を 行っても、日常生活 に支障をきたすほど の痒みを伴う膨疹が 繰り返して継続的に 認められる場合に本 剤を追加して投与す ること。	通常、成人及び12歳以上の小児 にはオマリズマブ（遺伝子組換 え）として1 回300mgを4 週間毎 に皮下に注射する。	91,156円/回	080080 痒疹、蕁麻疹				
							080080xxxxxxxx	3188	1.00回	91,156円	12,008円
ソバルディ錠400mg	ソホスブビル	400mg1錠	42,239.6円	C型慢性肝炎又はC型 代償性肝硬変におけ るウイルス血症の改 善 セログループ1 （ジェノタイプ1） 又はセログループ2 （ジェノタイプ2） のいずれにも該当し ない患者	セログループ1（ジェノタイプ 1）又はセログループ2（ジェノ タイプ2）のいずれにも該当しない 場合：リバビリンとの併用にお いて、通常、成人にはソホス ブビルとして400mgを1日1回、24 週間経口投与する。	42,239.6円/日 このほかに併用薬の費 用がかかる。	060295 慢性C型肝炎				
							060295xx99x0xx	2880	11.00回	483,779円	50,726円
							060295xx97x0xx	2885	26.00回	1,143,477円	169,896円

銘 柄 名	成分名	規格単位	薬 価	効能効果	用 法 用 量	1 回投与当たりの 標準的な費用 (A)	出来高算定対象		平均在院日数を加味した 1 入院当たり標準的費用		包括範囲薬剤 の 84%tile値
							診断群分類番号	(告示) 番号	仮想投与回数 (日数) (B)	標準的費用 (A×B)	
レベトールカプセル 200mg	リバビリン	200mg1カプセル	580.1円	ソホスブビルとの併用による次のいずれかのC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善 (1) セログループ2 (ジェノタイプ2) の患者 (2) セログループ1 (ジェノタイプ1) 又はセログループ2 (ジェノタイプ2) のいずれにも該当しない患者	インターフェロン アルファ-2b (遺伝子組換え)、インターフェロン ベータ、ソホスブビル又はオムビタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナビル配合剤との併用の場合 患者の体重 リバビリンの投与量 1 日の投与量朝食後夕食後 60kg以下 600mg 200mg 400mg 60kgを超え80kg以下 800mg 400mg 400mg 80kgを超える 1, 000mg 400mg 600mg	1, 740. 3円/日 このほかに併用薬の費用がかかる。	060295 慢性C型肝炎				
							060295xx99x0xx	2880	11. 00回	483, 779円	50, 726円
							060295xx97x0xx	2885	26. 00回	1, 143, 477円	169, 896円
コペガス錠200mg	リバビリン	200mg1錠	789. 2円	ソホスブビルとの併用による以下のいずれかのC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善 (1)セログループ2 (ジェノタイプ2) の患者 (2)セログループ1 (ジェノタイプ1) 又はセログループ2 (ジェノタイプ2) のいずれにも該当しない患者	ペグインターフェロン アルファ-2a (遺伝子組換え) 又はソホスブビルと併用すること。 通常、成人には、下記の用法・用量のリバビリンを経口投与する。 本剤の投与に際しては、患者の状態を考慮し、減量、中止等の適切な処置を行うこと。 1 日の投与量朝食後夕食後 60kg以下600mg 200mg 400mg 60kgを超え80kg以下 800mg 400mg 400mg 80kgを超える 1, 000mg 400mg 600mg	2, 367. 6円/日 このほかに併用薬の費用がかかる。	060295 慢性C型肝炎				
							060295xx99x0xx	2880	11. 00回	483, 779円	50, 726円
							060295xx97x0xx	2885	26. 00回	1, 143, 477円	169, 896円
ステラール皮下注45 mg シリンジ	ウステキヌマブ (遺伝子組換え)	45mg0. 5mL1筒	438, 739円	中等症から重症の活動期クローン病の維持療法 (既存治療で効果不十分な場合に限る)	ウステキヌマブ (遺伝子組換え) の点滴静注製剤を投与8週後に、通常、成人にはウステキヌマブ (遺伝子組換え) として90mgを皮下投与し、以降は12週間隔で90mgを皮下投与する。なお、効果が減弱した場合には、投与間隔を8週間に短縮できる。	877, 478円/回	060180 クローン病等 070560 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患				
							060180xx0104xx	2824	1. 00回	877, 478円	811, 114円
							070560xx99x7xx	3135	1. 00回	877, 478円	360, 564円
シンボニー皮下注50 mg シリンジ	ゴリムマブ (遺伝子組換え)	50mg0. 5mL1筒	126, 622円	中等症から重症の潰瘍性大腸炎の改善及び維持療法 (既存治療で効果不十分な場合に限る)	通常、成人にはゴリムマブ (遺伝子組換え) として初回投与時に200mg、初回投与2週後に100mgを皮下注射する。初回投与6週目以降は100mgを4週に1回、皮下注射する。	初回506, 488円/回、 2 回目以降253, 244円/回	060185 潰瘍性大腸炎 070560 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患				
							060185xx99x0xx	2825	1. 00回	506, 488円	47, 205円
							060185xx99x1xx	2826	2. 00回	759, 732円	216, 242円
							060185xx97x0xx	2830	2. 00回	759, 732円	89, 768円
							060185xx97x1xx	2831	3. 00回	1, 012, 976円	487, 080円
							060185xx0100xx	2835	2. 00回	759, 732円	51, 320円
							060185xx0101xx	2836	2. 00回	759, 732円	307, 265円
							060185xx0110xx	2837	2. 00回	759, 732円	96, 522円
							060185xx0111xx	2838	3. 00回	1, 012, 976円	438, 350円
							070560xx99x0xx	3130	2. 00回	759, 732円	65, 821円
							070560xx99x1xx	3131	2. 00回	759, 732円	321, 303円
							070560xx97x0xx	3137	2. 00回	759, 732円	177, 448円
							070560xx97x1xx	3138	4. 00回	1, 266, 220円	655, 381円
ニンラーロカプセル 2. 3mg ニンラーロカプセル3mg ニンラーロカプセル4mg	イキサゾミブクエン酸エステル	2. 3mg1カプセル 3mg1カプセル 4mg1カプセル	96, 519円 123, 355. 6円 160, 886円	再発又は難治性の多発性骨髄腫	レナリドミド及びデキサメタゾンとの併用において、通常、成人にはイキサゾミブとして1日1回4mgを空腹時に週1回、3週間 (1、8及び15日目) 経口投与した後、13日間休薬 (16～28日目) する。この4週間を1サイクルとし、投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。	160, 886円/回 このほかに併用薬の費用がかかる。	130040 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物				
							130040xx99x5xx	3842	4. 00回	1, 647, 896円	1, 001, 428円
							130040xx97x5xx	3848	6. 00回	2, 882, 162円	1, 937, 666円

銘 柄 名	成分名	規格単位	薬 価	効能効果	用 法 用 量	1 回投与当たりの 標準的な費用 (A)	出来高算定対象		平均在院日数を加味した 1 入院当たり標準的費用		包括範囲薬剤 の 84%tile値
							診断群分類番号	(告示) 番号	仮想投与回数 (日数) (B)	標準的費用 (A×B)	
ステラーラ点滴静注 130mg	ウステキヌマ ブ（遺伝子組 換え）	130mg26mL1瓶	189,612円	中等症から重症の活 動期クローン病の導 入療法（既存治療で 効果不十分な場合に 限る）	通常、成人にはウステキヌマブ （遺伝子組換え）として、導入 療法の初回に、以下に示す用量 を単回点滴静注する。 患者体重／投与量 55kg以下／260mg 55kgを超える85kg以下／390mg 85kgを超える／520mg	379,224円/回	070560 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患				
							070560xx99x7xx	3135	1.00回	379,224円	360,564円
ザルトラップ点滴静注 100mg ザルトラップ点滴静注 200mg	アフリベルセ プト ベータ （遺伝子組換 え）	100mg4mL1瓶 200mg8mL1瓶	78,614円 153,409円	治癒切除不能な進 行・再発の結腸・直 腸癌	イリノテカン塩酸塩水和物、レ ボホリナート及びフルオロウラ シルとの併用において、通常、 成人には2週間に1回、アフリベ ルセプト ベータ（遺伝子組換 え）として1回4mg/kg（体重）を 60分かけて点滴静注する。な お、患者の状態により適宜減量 する。	153,409円/回 このほかに併用薬の費 用がかかる。	060040 直腸肛門（直腸S状部から肛門）の悪性腫瘍				
							060040xx97161x	2641	4.00回	713,200円	694,778円

3 平成29年5月24日に薬価収載を予定している医薬品のうち、類似薬効比較方式により薬価が設定され、かつ、当該類似薬に特化した診断群分類が既に設定されている以下に掲げるものは、当該診断群分類に反映させることとしてどうか。

銘 柄 名	成分名	規格単位	薬 価	効能効果	用 法 用 量	1 回投与当たりの 標準的な費用 (A)	反映させる診断群分類
ニンラーロカプセル 2.3mg ニンラーロカプセル3mg ニンラーロカプセル4mg	イキサゾミブ クエン酸エス テル	2.3mg1カプセル 3mg1カプセル 4mg1カプセル	96,519円 123,355.6円 160,886円	再発又は難治性の多発性骨髄腫	レナリドミド及びデキサメタゾンとの併用において、通常、成人にはイキサゾミブとして1日1回4mgを空腹時に週1回、3週間（1、8及び15日目）経口投与した後、13日間休薬（16～28日目）する。この4週間を1サイクルとし、投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。	160,886円/回 このほかに併用薬の費用がかかる。	130040 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物
							本剤は類似薬効比較方式（Ⅰ）により薬価が算定され、類似薬が「カルフィルゾミブ」であったことから、130040 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物の「カルフィルゾミブ」による分岐に反映させる。
ムンデシンカプセル 100mg	フォロデシン 塩酸塩	100mg1カプセル	2,617.6円	再発又は難治性の末梢性T細胞リンパ腫	通常、成人にはフォロデシンとして1回300mgを1日2回経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。	15,705.6円/日	130030 非ホジキンリンパ腫
							本剤は類似薬効比較方式（Ⅰ）により薬価が算定され、類似薬が「モガムリズマブ」であったことから、130030 非ホジキンリンパ腫の「モガムリズマブ」による分岐に反映させる。
ステラーラ点滴静注 130mg	ウステキヌマ ブ（遺伝子組 換え）	130mg26mL1瓶	189,612円	中等症から重症の活動期クローン病の導入療法（既存治療で効果不十分な場合に限る）	通常、成人にはウステキヌマブ（遺伝子組換え）として、導入療法の初回に、以下に示す用量を単回点滴静注する。 患者体重／投与量 55kg以下／260mg 55kgを超える85kg以下／390mg 85kgを超える／520mg	379,224円/回	060180 クローン病等 070560 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患
							本剤は類似薬効比較方式（Ⅰ）により薬価が算定され、類似薬が「インフリキシマブ」であったことから、060180 クローン病等及び070560 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患の「インフリキシマブ」による分岐に反映させる。
ザルトラップ点滴静注 100mg ザルトラップ点滴静注 200mg	アフリベルセ プト ベータ （遺伝子組換 え）	100mg4mL1瓶 200mg8mL1瓶	78,614円 153,409円	治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌	イリノテカン塩酸塩水和物、レボホリナート及びフルオロウラシルとの併用において、通常、成人には2週間に1回、アフリベルセプト ベータ（遺伝子組換え）として1回4mg/kg（体重）を60分かけて点滴静注する。なお、患者の状態により適宜減量する。	153,409円/回 このほかに併用薬の費用がかかる。	060035 結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 060040 直腸肛門（直腸S状部から肛門）の悪性腫瘍
							本剤は類似薬効比較方式（Ⅰ）により薬価が算定され、類似薬が「ペバシズマブ」であったことから、060035 結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍及び060040 直腸肛門（直腸S状部から肛門）の悪性腫瘍の「ペバシズマブ」による分岐に反映させる。

※（参考）現行のいわゆる「高額薬剤判定」の運用方法について

- 新たに保険収載・効能追加となった高額薬剤については、医療の技術革新の導入が阻害されないよう、一定の基準に該当する薬剤を使用した患者については、当該薬剤の十分な使用実績データが収集されDPC包括評価が可能となるまでの期間、包括評価の対象外としている（以下、当該対応を「高額薬剤判定」という。）。
- 「高額薬剤判定」は、包括評価の対象外となる薬剤および当該薬剤が使用される診断群分類を告示するいわゆる「高額薬剤告示」への追加および診断群分類の定義（傷病名・手術・処置等）を定める「定義告示」への追加の2つの作業からなり、新薬の薬価収載に合わせ、年4回実施している（なお、緊急に薬価収載された新薬については、必要に応じて追加的な判定作業を実施する）。
- 高額薬剤判定の具体的な作業は次の通り。

【高額薬剤告示への追加】

- 新たに保険適用される以下の医薬品について、その効能・効果から当該医薬品を使用する可能性のある 診断群分類（14桁コード）を抽出する。
 - ① 新薬
 - ② 効能効果・用法用量の一部変更（薬事・食品衛生審議会で審査・報告されたもの）
 - ③ 事前評価済公知申請
- 各診断群分類について、該当医薬品を入院初日から退院まで添付文書に記載された用法・用量に従って投与した場合の投与回数（仮想投与回数）から、当該医薬品の1入院あたり薬剤費を算出する。
- 当該1入院あたりの薬剤費が、各診断群分類で使用されている1入院あたり薬剤費の84%tile値を超えている場合、当該医薬品を高額薬剤として指定する。

【定義告示への追加】

- 類似薬効比較方式で算定された新薬であり、当該算定の際の比較薬が該当する診断群分類の定義テーブルにおいて分岐として定義されている場合は、当該新薬を定義テーブルに追加する。